

H. S. August Renauw

PHARMACOPOEIAS Sweden



PHARMACOPOEA

SUECICA.

EDITIO SEXTA.

STOCKHOLMIÆ, 1845.
P. A. NORSTEDT & FILII,
TYPOGR. REG.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

LECTORI.

Anni octo et viginti jam elapsi sunt, postquam Pharmacopoeæ Suecicæ editionem quintam in publicum emisit Regium Collegium Sanitatis. Magni per illud temporis spatium progressus in arte chemica et pharmaceutica facti sunt, qui, quo magis universæ naturæ cognitioni profuerunt, uberioraque et certiora in usum Medicinæ subsidia suppeditarunt, eo magis etiam desideratum ac necessarium reddiderunt novum Pharmacopoeæ codicem et emendatum.

His de causis, satis illis quidem gravibus atque idoneis, veniam **Sacræ Regiæ Majestatis** et petiit et impetravit Collegium, ut delectis viris, in quibus fuit Professor Lib. Baro Berzelius operis moderator, additique Collegæ Professores P. F. Wahlberg, C. G. Mosander, C. W. H. Ronander, M. Huss, J. S. Billing, atque Pharmacopolæ A. Pripp et C. Åkerström, et cooptatus denique adjutor Medicinæ ac Philosophiæ Doctor N. J. Berlin, qui consulta delectorum et placita litteris mandavit, negotium committeretur, ut Pharmacopoeæ denuo conscribendæ curam agerent, conscriptamque ad Collegium deferrent cognoscendam et percensendam.

Quod ab his viris confectum est propositumque opus, postquam primæ totius lineæ et argumenta non solum cum Societate Medicorum Suecica, sed etiam cum ceteris Medicis, quotquot

vel in Regiis Universitatibus vel in reliqua patria medendi munere funguntur, communicata sunt, eorumque tum monitis tum desideriis, qua par erat fide ac diligentia, consultum, Collegii denique judicio ac recognitioni est subjectum et, comprobante **Sacra Regia Majestate**, jam typis expressum in lucem emittitur, ut Sexta hæc veteris in locum succedat editio Pharmacopoeæ.

Si hæc cum iis, quæ ante editæ sunt, Pharmacopoeis comparatur, facile apparet, multa vel simplicia medicamina in materia pharmaceutica, vel composita pharmaca ac præparanda, exclusa abesse, atque eorum in locum partim nova alia inserta, partim veterum et scribendorum accuratiores formulas et præparandorum sollertiores vias rationesque esse inventas. Neque tamen tot tantasque res simul complecti atque perficere licuisset, nisi pharmaceutica studia adeo crevissent, ut arti medicæ operam, quæ major hodie et exquisitior flagitatur, possent præstare.

Collegium itaque, quum, quantum consilio, arte rerumque usu provideri potuit, codicem paravit locupletem, ubi omnia, quæcumque res tempusque postulet, pharmaca litteris consignata habeantur, sperat fore, ut justis exspectationibus quum omnium omnino civium, tum imprimis Medicorum, ægris operam navantium, satisfactum summa cum fide et industria esse videatur.

Datum Stockholmiæ Cal. Julii MDCCCXLV.

REGIUM COLLEGIUM SANITATIS.

PONDERA ET MENSURÆ.

1. Mensura PEDIS SUECICI talis est, ut simplex in Observatorio Holmiensi pendulum quodcumque, subductis rationibus revocatum ad spatium aëre vacuum atque mediam quæ dicitur superficiei marinæ altitudinem, ad temperaturam +15° C., in nycthemero medio solari 86400 oscillationes facit vel in minuti medii solaris sexagesima parte semel oscillat, sit 3.350649 ejusmodi pedes *).

2. Est CONGIUS LIQUIDORUM (suetice Kanna) parti decimæ cubi hujus pedis æqualis.

3. Pondus LIBRÆ CIVILIS (suetice Mark vel Skålpund) tali ratione determinatum est, ut congius aquæ destillatæ, aëre atmosphærico saturatæ, ad temperaturam +4° C. et aquæ et aëris, quum hy-

---

*) 3.350649 pedis suecici = 0.9948 metri gallici = 440.99 lineis parisiensibus.

1 pes suec. = 0.29690 metr. gall. = 131.61 lin. par.

1 metr. gall. = 3.36815 ped. suec. = 443.296 lin. par.

1 pollex decimalis suecicus = 0.029690 metr. gall. = 13.161 lin. par.

Duodecima pedis pars (1 werktum) = 0.024742 metr. gall. = 10.968 lin. par.

drargyrum barometri ad temperaturam 0° C. altitudinem 25.6 pollicum decimalium habet, ejusmodi libris 6.15221 pondere æqualis sit *).

4. Est LIBRA MEDICINALIS $\frac{7416}{8848}$ vel 0.838155 libræ civilis; ideo grammata gallica 356.2470 æquat.

LIBRA uncias duodecim continet.

UNCIA drachmas octo continet; libræ civilis 0.0698463 vel grammatis gallicis 29.68725 æqualis.

DRACHMA scrupulos tres continet; libræ civilis 0.00873078 vel grammatis gallicis 3.710906 æqualis.

SCRUPULUS grana viginti continet; libræ civilis 0.002910262 vel grammati gallico 1.236969 æqualis.

GRANUM libræ civilis 0.0001455131 vel grammatis gallici 0.0618484 æquale est.

5. LIBRA MEDICINALIS NORVEGICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.004486 vel gram. gall. 357.8452 æqualis. Granum = 0.062 gram. gall.

Mensura norvegica Pot = 2.71 libr. med. suec. vel 0.369 cong. suec. **)

6. LIBRA MEDICINALIS DANICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est 1.003977 libr. med.

---

*) Libra civilis suecica = 425.0369 grammatis gallicis.
Congius aquæ, circumstantiis supra indicatis, = 7.34018 libris suec. med. = 2614.915 gram. gall.
Pollex decimalis cubicus aquæ = 0.0615221 libræ civilis = 0.0734018 libræ med. = 26.14915 gram. gall.

**) Libra mercatoria norvegica (= 32 Lod) = 498.1137 gram. gall. = 1.17193 libr. civil. suec.
Pes norvegicus (= 12 pollices) = 0.31374 metr. gall. = 139.0808 lin. paris. = 1.0567 ped. suec.

[illegible] = 14 [illegible]

suec. vel gram. gall. 357.6639 æqualis *). Granum = 0.062 gram. gall.

Mensura danica Pot = 2.67 libr. med. suec. = 0.363 cong. suec.

7. LIBRA MEDICINALIS GALLICA (*livre métrique*) continet uncias (*onces*) sedecim; uncia drachmas (*gros*) octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti quattuor. Est libr. med. suec. 1.40352 vel gram. gall. 500.000 æqualis. Granum = 0.054 gram. gall.

Mensura gallica *Litre* = 2.80 libr. med. suec. = 0.382 cong. suec.

8. LIBRA MEDICINALIS BORUSSICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 0.984664 vel 350.7835 gram. gall. æqualis **). Granum = 0.0609 gram. gall.

Mensura borussica Quart = 3.21 libr. med. suec. = 0.437 cong. suec. ***).

9. LIBRA MEDICINALIS BAVARICA continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.010535 vel 360.000 gram. gall. æqualis. Granum = 0.0625 gram. gall.

Mensura bavarica Maaß = 2.99 libr. med. suec. = 0.408 cong. suec.

---

*) Eandem omnino habent libram *Hamburgenses*, quorum mensura medicinalis = 2.00 libr. med. suec. = 0.272 cong. suec., et *Schlesvigo-Holsati*, hac, quæ dicitur libra norimbergensis, parum inter se discrepantes utuntur etiam *Fenni*, *Hannoverani* et *Russi*.

**) Eadem utuntur *Saxones*.

***) Mensura olim usitata Berliner-Quart = 2.95 libr. med. suec. = 0.402 cong. suec.

10. Libra medicinalis austriaca continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libræ med. suec. 1.178980 vel gram. gall. 420.009 æqualis. Granum = 0.073 gram. gall.

Mensura Viennensis Maaß = 3.96 libr. med. suec. = 0.540 cong. suec.

11. Libra medicinalis anglica (*Troy Pound*) continet uncias duodecim; uncia drachmas octo; drachma scrupulos tres; scrupulus grana viginti. Est libr. med. suec. 1.047617 vel gram. gall. 373.2103 æqualis. Granum = 0.065 gram. gall.

Mensura anglica *Imperial Gallon* (= 8 Octariis vel *Pints* = 160 Fluidunciis) = 12.72 libr. med. suec. = 1.736 cong. suec. *)

---

*) Alia mensura, in Anglia olim usitata, *Wine-Gallon* erat, cujus octava pars *Pint* vel Octarius = 1.32 libr. med. suec. = 0.180 cong. suec.



Absinthium

Amaro excitans.–

Verkan. I mindre doser invärtes retande på underlifvets ganglie-systemet lösande förslemningar ökande gallsecretion.

Anv. Vid atoni i ganglia-systemet, förslemningar i barnaåldern i dyspepsi cardialgi med svedningar under bröstet & vatten i mun om morgnarne. Stabus pituitosus med maskar hos barn med minskad gallsecretion med trögt lif och hvita excrementer Hos supare om morgnarne att ställa magen i ordning (bra i fattig praktik)

Contraindic. af Erethism.

Dos. ó form. pulv gr. X–XXX–XL 3–4. d. d.

Rp. Summitat. Absinthii gr X–XX.
Eleosach. Carvi
Rad. Calami āa gr V.
Sr. 1 p. 3–4 dd. (mot mask och slem hos barn.

#

Rec Summitat. Absinth. ℥ß
(Rad. Calami ℥ij
– Galangæ ℥j – iß).
infund per hor. dimid c. Aqua.
℥viij
Sr. En jumfru på nyktert mage ó en före middag l. 4–6 m. dd.
(vid syrebildning)
adde
Bicarbon. Kalic ℥ij
/ Carbon. naatrici, ℥ij
Sr. 2 m. 4 dd.

#

Rp. Summitat. Absinth. ℥j
coque c. Aqu. ℔ij ad remanentiam ℥viij
Aether. Spirituos ℥ij / i
Tinct. Aromatic ℥iij – iv
Sr. 1–2 m. 4 dd. Efter frossor febr. etc.

Cerevisia Rp. Summitat Absinthii
Bacc. Juniperi aa ℥j (℥j)
Rad. Calami ℥ij Kokhett dricka ℔iij, som får stå att draga och drickes kallt ett dricksglas mot middag och qväll.

Utv. Haverwang mot maskar.

Enema Rp. Summitat. Absinth.
Tanaceti āa ℥ß
coque c. Aqu. ℔j ad remanent ℥viij adde
Ol. Ricin ℥j
Sr. till lavement.

Brukas och till bad, kryddpåsar med lika delar Kamomill och Humla. I pulver med krita och campfert att lägga på kompr på erysipelatösa ben hos slappa personer. Får ej som dekokt förenas med metallsalter som decomponeras deraf.

CANONES.

Vegetabilia indigena et *adventitia culta* quotannis recentia, tempore sereno, a rore vacua colliguntur, indigena vero spontanea, nec usquam culta; collecta mundantur; mundata loco aëri pervio, aut filis suspensa aut linteo papyrove subjecto tenuibus stratis diffusa, diligenter siccantur, et quidem succulenta modici caloris ope, cetera aëris temperaturâ, ita tamen, ut colore mutabilia nullo sole afficiantur; perfecte siccata cum ceteris vegetabilibus, loco sicco frigidoque, vel in scriniis ligneis vel in vasis vitreis, murrhinis metallicisve bene clausis, servantur, ut et lux atque humiditas partesque pulverulentæ, quæ aëri insunt, quantum fieri possit, defendantur, et suus cuique color, suus odor et sapor melius ac diutius constet. Pharmaca aromatica, narcotica et alia, materie volatili prædita, in vasis vel scriniis ita servantur, ut nulla aëris mutandi fiat occasio.

E ***Pharmacis exoticis***, quorum plures inveniantur species, prima quæque et præstantissima comparantur.

Radices perennes e plantis bimis trimisve, tempore autumnali, herbâ jam marcidâ vel foliis delapsis, optime colliguntur, quod idem vernali tempore ante foliorum evolutionem fieri licet; celeriter lotæ et mundatæ vel in aëre, vel, si crassiores sunt atque succulentæ, incisæ filisque suspensæ, modici caloris ope siccantur. Radices spongiosæ, cavæ et, si fruticum arborumque excipias, lignosæ rejiciuntur.

Bulbi itidem ut radices collecti, in retibus suspensi vel sabulo probe sicco immissi, recentes servantur.

Cortices et ***Ligna*** tempore vernali ante frondescentiam colliguntur, cortices autem plerumque e ramulis fruticum arborumque bimis, trimis, quadrimis.

Herbæ et ***Folia*** bene explicata, paullo ante florescentiam, vel, si aromatica sunt, eo ipso tempore, quo florent, colliguntur, plantarum tamen biennium etiam sub finem æstatis primæ. Folia succosiora et narcotica, ut Digitalis, Belladonnæ, cet., singula a se disjuncta, herbæ vero in parvos fasciculos colligatæ, filis suspenduntur et siccantur.

Flores et ***Summitates florentes***, ut primum explicantur, colliguntur et, quum citius quam ceteræ plantarum partes mutentur, summâ diligentiâ siccantur et conservantur.

Fructus et ***Semina***, matura plerumque, eliguntur, fructus tantum succulenti paullo ante summam

Acetum

Verkan i små doser, kylande törstsläckande i större doser framkallas större lifligheet åkad motus peristalticus hvadan den användes till hårdsmält mat.
Vid länge fortsatt bruk chron. förgiftning.

Anv. Invertes ss refrigerans i febrar, st. oxymel som blandas i drycker. Bra om sommaren i enkla gastries(?)

Rp. Acet. Vin ℥j
Dec. Althea ℥viij
Syrup. Althea f. Mellis ℥ij
Gr. 2 m. 2t

Vid aton. blödningar till starkare medel erhålles, opfres 1th. f. 1 m. 2t. mot biliösa diarrheer. Vid Opii förgiftn. 1 m. afvenson mot förgiftn. af Bella donna f. Nicotiana mot Rus- Sugarer lukta på ättika bra i scorbutus.

Utv. Enema Acet. ℥j till klistiret hos personer som föra stillasittande lif o lida af congestioner till hufvudet - mot oxyuris vermicular - mot convulsioner under dentitionen hos barn i små doser: klistir. Kramp i lifmodern, dröppel (Eretheim). Blandadt i brännvin o vatten till omslag å hufvudet till tvättningar i febrar i prurigo, i gubbklåda ss. tindrande st. gargarism mot pollutiones noct. en svamp blötes i ättika och lägges öfver perineum öfver natten.
I sjukrum på heta stenar ej jernplåt

Acetum Pyroxalicum.

Har verkan ss väl af ättika som af brännhartz. Förvaras i mörk flaska o tappt(?) [illegible]. Bör ej förenas med mineral syror t. salter.
Verkan utv. beror på desicken(?) inverkan på albumen. Torkar huden.
Inv. i stor dos ℥i-ij svåra plågor, nerv. symptom. svindel. tetanus o död. bör begagnas med stor försigtighet.

Anv. I Sphacelus. den hindrar branden fortgång o förtar stanken. Antingen penslas ytan med syran oblandad, eller doppas l. doppas lappar i en blandning af 1 del syra o 6 delar ℔.

Gargarism. 1 del syra + 12 del. ℔ mot leggsår(?) I Noma ss cataplasm af syra o mjöl, mot angina gangraenosa. I den salivation som kommer af sphacelerat tandkötte 1 del till 12 delar ℔. Mot tandvärk på bomull i tanden. Mot Metrorrhagier af Cancer.
St. lavemant mot blödning från Rectum (obs. att [illegible] kan åstadkomma allmänna sympt., hvad. stor försigtighet.

Invertes Mot upplösnings tillstånd. I gangraena pulmonum utan inflamat. i lungan (rek. af Prof. Hass. alla bröstsjukdomar då uppkastn. o stinkande ss. hos gamla personer med utvidgade bronchier. Vid vomica. diengest. scorbut. aton. haemorrhag.
dos. 5-10 dr. p.d.

Rp. Inf. rad. Calami f. Polygal ℥vj
Aceti Pyroxalic. ℥j
Syrup f. Mellis ℥ij
Gr. 1-2 m. 2t. mot gangraena pulmonum och Chron. catarrh. med Malakl. sputum)

#

Rp. Acet. Pyroxal. ℥iß
Mell. rosat. ℥j
St. Penselsaft. mot noma o angin gangren.

#

Rp. Acet. Pyroxal. ℥j-iij
Aqu. Sambuc. f. Inf. Salviae ℥iv
Syrup. Mellis ℥ij
Mr. St. Att flera ggr. om dagen gargla(?) [illegible] tandköttet.

Rp. Acet Pyroxalic. ℥ß
Aqu. flor. Aurant. ℥ij
Syrup. Amygdalar. ℥j
Sr. 1 th. 2t. (mot gastromalacia infantum).

Acidum Citricum

Användes s. refrigerans i febrar der resol. sanguinis är för handen. Fräspulver o Limonadpulver

Rp. Bicarbon. Kalic. f. Natric ℥j
Acid. Citric gr. XVj
Sacch. alb. ℨß
Sr. Fräspulver.

#

Rp. Acid. Citric. ℨj
Sacchar. alb. ℥ij
Mucilag. Gmi Tragag. q. s.
ut f. Massa ex qua formatur Trochisci № LX Sr. godt törst släckande medel.

#

Rp. Acid. Citric. ℨß
Tr. Canthand ℨiß
Axung. curat. ℥j
Mr Sr. Till hårvextens befrämjande.

Acidum Succinicum

Anv. s. nervenum i svaghet o s. calmerande medel i retningstillstånd. Svaghet och darrning hos gamla personer i hysteriens alla former. I chron. catarrh. s. expectorans o stimulerande nerfsystemet äfven i kikhosta i spasmod. st. dos. gr. v–x 4. 6 dd.

Rp. Acid. Succin gr v.
Camphor. gr ß
Sacchar. gr x.
Sr. 1 p. 2 t. (: Tyfus)

#

Rp. Acid. Succin ℨj
Aqu. Cinnamom ℥iij
Sr. Matskedtal. Tyfus.

#

Rp. Acid. Succin. ℨj
Extract. Hyoscyam. ℨj
Emulsion oleos. ℥iij
Sr. 1 th. 6. 8. dd. mot kikhosta

#

Rp. Acid. Succin.
Asae Foetid.
Extract. Chamomill
ãa ℨj
M. f. pil. № L. Sr 5-6 eller mera 4 ggr. dd. (mot Hysteri)

maturitatem. Hi integri vel incisi, caloris modici ope, celeriter siccantur. Semina quædam in pericarpiis conservare præstat. Aromatica et oleosa citius, farinosa serius depravantur.

Medicaminum quantitates pondere tantum æstimandæ, non mensurâ aut guttulis. (Excipe Aetherolea in Elæosaccharis parandis).

Pondera liquidorum specifica ad temperaturam +15° thermometri centigradui vel Celsiani exploranda sunt.

Inter ceteras libras, in officina necessarias, semper sit libra, non manibus habilis, sed apto suspensa firmamento tamque mollis, ut eâ possit grani pars octava ponderari accuratissime. Pondera hujus libræ potissimum platinica sint (aliud granorum decem, aliud quinque, aliud duorum, aliud geminum grani unius, aliud dimidii (gr. $\frac{1}{2}$), aliud quartæ (gr. $\frac{1}{4}$), aliud sextæ (gr. $\frac{1}{6}$), aliud denique octavæ grani partis (gr. $\frac{1}{8}$)) et in theca, ne mutentur, sollicite servanda.

Bina singularum librarum bracchia ne sint in tenues producta hamulos, quibus adfigantur lances; eaque adeo sint ad æquum exacta, ut utracumque lancula rem ponderandam acceperit, idem omnino pondus significetur.

Signorum Explicatio.

* Materiem denotat, cujus sufficientem usui officinarum copiam patria præbere facile potest.

☿ Materiem denotat non nisi Medico jubente vel permissu Superiorum distribuendam.



Aconitum.

Physik verkn. vid tuggning deraf erfares en stickning i tungan som domnar.

Inv. i små doser gr. vj - viij - x, torrhet med sammansnörpning i halsen, åkal, tyngd i hufvudet, kryppningar i extrem. i huden samt domning. Pulsen långsam, hjertverksamheten svagare, pupillen contraherad. I stora dos ℈j - ʒj häftiga kräkningar med kolikplågor, swindel, konvulsioner, bröstbeklämning, coma och död. Efter död blodet uppstod ej coagulerad.

Anv. i sjukdomar, der sensibiliteten är sjukl. förändrad s. Rheum. då den användes, får ej finnas febertillstånd eller någon inflammation. Passar: Rheum. först då febern och svettningen om nätterna upphört. Äfven: Arthrit. smärtor. I Neuralgier isynhet af Rheumat orsak. Neuralgia faciei i stora doser. äfven Neuralg. ischiadica o Intercostal. I spinal irrit vid smärta i ryggen med minskad sensibiliteten ej i dess sednare stadeim. Mot dolores osteocopi Nodi o Tophi har gifvit då hjertverksamheten är stegrad i stället för digitalis. Hos personer med nervös hjertklappning af spinal irritation dock är Lactucarium bättre.

Rp. Fol. aconit gr iv - viij - x
Pulv. Sacchar. gr X - v.
Ds. 4 p. dd.

#

Rp. Fol. aconit
Pulv. Jacobi āā gr v - x.
Sacch. alb. gr X.
Ds. 3-4. p. dd. Efter feberns slut. Rheumat.

#

Rp. Fol. aconit. gr v.
Resin. Guajac. gr XV - ℈j
Elaeosacchar. Foenic. gr X.
M. f. pulv. Ds. 3-4-5. p. dd. (mot Gikt

Rp. Fol. aconit. ʒj
Sulph. aurat. antimon ℈β
Extract. Betul. ʒij
M. f. pil No LX. Ds (5-8) p. 4 dd. (chron. Rheum)

#

Rp. Fol. aconit.
Semin. Colchic. āā ʒj
Extr. Betulae ʒij
f. Pil. No LX. Ds. 4-5 p. d. dolores Rheumatica.

#

Rp. Fol. aconit.
Sulph. Stib praepar. āā ʒj
Extr. Mezerei ℈β
M. f. c. Syrup. Sacch. q. s. pil No 120. Dolores osteocopi Ds. 8-10 p. 3ggr dd.

#

Rp. Fol. aconit. ʒj
infund. per hor. dimid. ad ℥vij adde
Vin. Semin. Colchic. ʒij - iij.
Syrup. Sambuci ℥j
Ds. 1 m. 3-4 dd. at lax verkan orsakar

MATERIA
PHARMACEUTICA.



Aerugo.

Verkan I små doser gr j–iij dyspept. symptom, smärta i ryggen. Stingar och domning i händer och fötter.
I större doser häftig kräkning utan äckel, häftiga kolikplågor och diarrhé. Hos de döda inga förändringar i tarmkanalen men i bladet.
Motgift Sockervatten, äggehvita o. äggula samanblandade kokdroppar.
Användn. I nervsystemets sjukdomar o. åtskilliga dyscrasier. Mot Syfilis då Merc. preparater varit overksamma.
dos. gr 6 – j. 2-3 dd.

Rp. Aerugin. gr XV.
solv. in
Aqu. foeniculi q.s. sat.
adde
Micae panis ℥j
Mfp. N: XXX S: 1-4 p. 4 dd.
(mot Psoriasis, lepra)

Rp. Acetat. Cupric. gr XXIV
solv. in
Aqu. destill. ℥6 +
adde
Syrup. Sacchar. ℥6 +
Sr.

Rp. Aerugin gr ij–v.
solv. in
Aqu. destill ℥j
D. till injection (mot slapp dröppel)

Rp. Aerugin ℥ij
solv in
Ammon. caustic ℥j
Sr. 6 drop. till en pannfu vatten (Injection mot slapp dröppel.

Rp. Aerugin. ℥j
solv in
Aqu. destill. ℥v.
adde
Mellis ℥j
Mr. Sr. Gurgelvatten mot syfilit. sår i halsen. 1 à 2. dd.

Rp. Aerugin gr j–4.
Aqu. destill ℥j.
Sr. Ögonvatten.

Agaricus Albus.

Består af ett harts, som utgör ⅗ af dess vigt o. gör verksamheten. Då den bultas och sykas, så retar den näsan.
Verkn. I stor dos. gr XV drastiskt beklämning. Cardia. Kräkningar.
Antidiaphoretiskt medel på ålderstobrokt då hudverksamheten är stegrad. Vid sjukdom af svedning (utom något annat sjukdomstillstånd). Svedning i Phthisis tuberculosa. Acet. Plumb o. syror ensamt. Den förra hindrar expectoration. den sednare retar.
dos gr ij 3-4 dd. Mer gr vj–viij till natten. Länge brukad ger den tillfället ger diarrhé och knipningar hvarom den förenas med Opium. Efter Rheumatiska Asthma anfall med svedning mot svedning efter nerv. febrar. Lordonnes Stomachicum o. Elenkonde. Ingår i Elixir ad longam vitam gifves med något Elaeosaccher. dos gr ij + opii gr ¼. – gr vj – viij + opii gr j med Mucilg. Gumi Arab. till piller.

Rp. Agarici ℥j
Semin. Cardam. min ℥ß +
Rad. Gentian ℥ij
Vini hispanici ℥iv
digere per triduum
Sr. 40 dr. 1 th. 2 dd.

Allium sativum

Gammalt husmedel. Håller ett eteriskt vattenlöst Aetherol. Retar mage o tarmkanal befordrar digestion. I stor dos gör beklämning: Epigastr, äckel, flatulens, diarrhee, ökar bronchiernas, hudens och njurarnes secretion.

Anv. Int. Stomachicum anv. med barna åldern att befordra expectoration hos barn i Chron. catarrh. med torr hosta; i kikhosta bör kokad med mjölk 1-2 m. hackad lök med 1 qv. mjölk som kokas silas och förtäres i små portioner; äfven utpressade saften blandad med mjölk på samma sätt, äfven mot maskar eller [illegible] med mjölk eller små hela bitar hvilka sväljes af barn.

Utv. lindr. retmedel brukas [illegible] och i öronen mot tandvärk [illegible] den; äfven i lavement mot maskar då den äfven ger invertes (Lavem om qväll) I alla dessa fall mot [illegible] Scrophula mesaraica.

Rp. Bulbi allii
Semin anisi āā ℥6.
Rad Inula ℥iij
infund c. aqu. ℔ij stat per horam
loco tepido
Colat. adde
Succi Liquirit. ℥6
f. Syrupi Allii compos.
Ds: Catarrh. kikhosta

#.

Rp. Allii incis No. iij
Spirit. Vini ℔ij
Macera per horas duas
adde
Decoct Bardana.
Ds. Att tvätta hufvudet med 2 gg dd.

Aloë Lucida

Består af harts 20 proc. o bitert Extractivämne 75 %. Ett [illegible] medel.

Verkan I små doser gr 1/3 - 1/2 lindrigt retande på magen o tarmkanalen ökar gallsecretion, löses [illegible], dess verkan inträder först 2-3 dagar sedan medlet gifvits. I dos af gr j-iij mera lösande, värme i magen o rörelse i tjocktarmen ymniga eller [illegible] öppningar verkan först 8-12 timmar efter intagningen [illegible] fortsatt: denna dos ökadt [illegible] till ändtarmen o uterus ända till blödning.

Större dos gr vj - viij drasticum, knip i tarmarne, lösa vattenaktiga uppningar. blödn från Uterus och njurar.

Bör ej användas som purgans och stora doser med [illegible] framkalla

Användning: Anv. vid Atoni o torpor i gangl systemet. dyspept. symptom. habituell förstoppning. Understyckta blödningar från bäckenets organer.

Passar ej för retliga personer med fallenhet för congestioner till hufvud och bäcken, [illegible] menstruation, o kritiska åldern, ej i feber o Inflamationer, ej för retliga nervösa personer, ej för barn för hvilka det bör undvikas, bör efter 40 året för gamla slappa personer.

Therap. använd Hämorrhoidalsjukdom hvaremot Aloë är godt. Det tillstånd som andra kalla plethora abdominalis, venös blodfullhet i vena porta systemet, så att lefvern ej kan upptaga all bloden, hvarigenom uppkommer stasis sanguinis. Uti dessa fall är aloë ett hufvudmedel. vid dyspeptiska tillfälligheter tyngd under bröstet efter maten, högt lif. status gastricus. (denna sympt. träffas hos hysterica hypochondriaci).

Att framkalla blödning från ändtarmen o lindra molimina hos morrhoidelas ~~på de~~ Emmenagogum Att framkalla menses - Om en qvinna har öfvergått den vanliga åldern utan molimina menstr. då ges aloë förgäfves men om molimina märkbarligen kännas då aloë

*ABSINTHIUM. Malört. *Artemisia Absinthium* Lin.
Summitates florentes.

*ACETUM. Ättika.

Acetum commune. Wanlig Ättika. E spiritu frumenti.

Acetum vini. Winättika. E vino.

Sint tantæ aciditatis, ut unciæ duæ sufficiant ad carbonatis kalici puri et sicci drachmam perfecte saturandam.

Acetum pyroxylicum. Trädättika Destillatione ligni arboris cujusdam frondiferæ.

ACIDUM CITRICUM. Citronsyra.

ACIDUM MURIATICUM CRUDUM. Saltsyra. *Acidum hydrochloricum commune.*

Pond. spec. circiter 1. 18 erit.

ACIDUM SUCCINICUM, quod dicitur SUBLIMATUM, vel SAL SUCCINI. Bernstenssyra.

ACIDUM TARTARICUM vel SAL ESSENTIALE TARTARI. Winsyra.

ACIDUM VITRIOLI vel OLEUM VITRIOLI. Swafwelsyra. Vitriololja. *Acidum sulphuricum commune.*
Pond. spec. 1. 85 erit.

*ACONITUM. Stormhatt. *Aconitum Napellus* Lin. et *A. Cammarum* Lin. In Europæ, præsertim Helvetiæ, montosis.

Folia recentia et siccata.

ADEPS vide AXUNGIA.

AERUGO vel VIRIDE ÆRIS. Spanskgröna. *Subacetas cupricus.*

AGARICUS. Lärkträdsswamp. *Polyporus officinalis* Fries. In Larice Europæ australioris parasiticus. *Fungus* epidermide liberatus.

*AGARICUS CHIRURGORUM vide FUNGUS QUERCINUS.

ALCANNA. *Anchusa tinctoria* Lin. Europa australis. *Radix.*

ALKALI MINERALE vide SODA.

ALKALI VEGETABILE vide POTASSA.

*ALLIUM. Hwitlök. *Allium sativum* Lin. Apud nos cultum.
Bulbus recens.

ALOË HEPATICA. *Aloë vulgaris* De Cand., *cet.* India occidentalis (Barbadoës), cet. Optima ex India orientali obtinetur.
Succus foliorum inspissatus.

ALOË LUCIDA. *Aloë arborescens* De Cand., *A. spicata* Thunb. et *A. linguæformis* Thunb. Caput bonæ spei, cet.
Succus foliorum inspissatus.

ALTHÆA. *Althæa officinalis* Lin. Europa media et australis.
Radix decorticata.

*ALUMEN CRUDUM vel VULGARE. Alun. *Sulphas aluminico-kalicus.*

AMMONIACUM CARBONICUM vel SAL VOLATILE. Kolsyrad Ammoniak. *Sesquicarbonas ammonicus.*

AMYGDALÆ AMARÆ. Bittermandlar. *Amygdalus communis* Lin. var. *amara.* Regio mediterranea, cet.
Nuclei integri.

Passar ej för upphörd menstruation, då orsaken varit svaghet, inådighet chlorosis etc. Passar då den uppkommit af styrka och temlig hälsa. Mis fall af en eller par m. Tinct Aloës croc. (farligt).

Dos. S. Tonicum. gr ½–j 3-4 dd.
S. lösande gr ij–iij 3-4. dd.
S. framkallande Hemorrhojder ö Menstruation gr vj p. d. Aloë kan äfven tal användas utan skada. Verkar ofta ej förr än efter 2-3 dagar - dock bör vid längre tids begagnande ej ökas, emedan då stundom uppkommer torpor. Man bör då hellre hvila någon tid.

Rp. Aloës lucid
Extract Gentian. āā ℈j
M f. pil. №. XX. S. 1-2 vid middagsmåltiden. (böra förniljas). Mot tyngd efter maten för hypochondr. i kyrkor.

#

Rp. Limatur. Ferri
Aloës lucid āā ℈j
f. c. Mucilag. Gumi Arab. q. s. ut pil №. XX S. 2. 3 piller vid middagen.

#

Rp. Aloes lucid ℈ij
Extr. Coloq. ℈j
Ferri pulv. gr X.
Mucilag. G^m Arab. q. s. ut. f. pil aequal. №. XL. S. 2 st. morgon ö afton mot habituell förstoppning hos stillasittande personer.
(Stahls piller)

#

Rp. Aloës lucid.
Myrrha
Croci āā ʒj
Extr. Taraxaci q. s. ut. f. pil aequal. №. CXX. S. 4-6. p 3 ggr dd.
(Emmenagogum Bladiglar. Ljunrk.)

#

Rp. Aloës
Sapon. Medicat. āā ʒj
Bilis bovin inspissat. q. s. ut. f. pill. aeq. №. LX. S. 2 p.

#

Rp. Gumi Ammoniac ʒj
Aloes
Ferri pulver. āā ʒß
Bilis bovin insp. q. s. ut f. pil
№. LX. S.

#

Rp. Aloes gr. XV.
Extr. Taraxaci
Bilis bovin inspiss āā ʒß
Aqu. Cinnamomi ʒvj
S. 1 m. 3-4 dd. för Hypochondri

#

Rp. Extr. Card. Bened.
Gumi Galbani āā ʒij
Rad. Rhei ʒj
Aloes lucid ʒß
f. pil. №. CXX. S. 4 piller några ggr dd.

Alumen.

Verkn. minskar alla secretioner, nedstämmer hjertverkets amheten o puls passar aldrig i febrila tillstånd då irritation är för handen ej i activa blödningar.

dos. grij–v. 3–4 gg dd. med aromatica l. andra styptica.

Anv.: Slemhinnans atoni, chron. diarrhé (obs. om acut retning finnes så ökas den uttömningarne) i slappa dysenterier, chron. catarrh. hos gamla personer eller lungsigtige, atoni leucorrhé l. slapp dröppel, diabetes (palliativ) hectisk svettning, blödningar (atoniska) haemorrhagia uteri atonica, utvidgning af hjertat med förtunning. Typhösa febrar med öfvervägande diarrhé, scorbutus (med blödningar) äs. alternans mot Cancer, ätsk. lefversjukdomar, fettlefver, ätsk nervsjukdomar, ct. blykolik.

utv. gurgelvatten. pulv. form på sår. i vagina mot leucorrhé, mot tonsillernas chron. inflam. i uppdrifning. H. pulv. (1 p. alum + 2 p. Saccharum.) att inblåsa, katarr. Alun med ägg hvita mot rinnande ögon. Fänkelsaft mot Torsk, ögonsjukdom. Får aldrig förenas med garfämne kolsyrade alkalier!

Serum lactis Aluminat

Alum. ℥j–ij kokas med 1 qv. Mjölk och har afskiljes och vasslan utdrickes på dagen mot chron. diarrh. och catarrhal. + ngt Elaeosacchar.

#

Rec. Opii depur. grij
Emuls. amygdalin. ℥vj
Alumin ℨj
S. 2 m. 2 t. (mot chron diarrhé

#

Rec. Alumin. ℨj
Mell. Rosar. ℨj
S. Till penslning mot torsk

#

Rec. Alumin
Succi Catechu aa ℨj
Extr. Gentianae f. Absinthii q.s.
ut f. pil. N:o LX. S. 4–5 p. dd.
(mot Leucorrhé)

#

Rec. Opii depur. grj
Cort. Cinnamom.
Alumin aa gr. v. viij
Sacch. alb. gr. X. S. 1 p. 4 dd.
(mot aton. Lifmoderblödning)

#

Rec. Rad. Ipecacuanh. grj–ij
Alumin grij–iv.
Sacchar. gr. X.
S. Ed p. 2–3 t. (mot blödning från lungorna.)

#

Rec. Alumin. ℨj
Inf. Salviae f. Rosae ℥vj
Mell. Rosar. ℨj
S. Gurgelvatten mot angina.

#

Rec. Alumin ℨβ
Opii dep. ℨβ
Ungv. Plumb. ℨβ
M. f. Ad stryka s. m. som en ärt morg. o aft. på haemorrh. knappar

#

Rec. Alumin. ℨj
Conserv. Rosar q. s. ut f. pil N:o XXX. S. 2–8 p. 3 dd. mot Carcinoma uteri

#

AMYGDALÆ DULCES. Sötmandlar. *Amygdalus communis* LIN. var. *dulcis*. Regio mediterranea, cet.
Nuclei integri.

*AMYLUM. Stärkelse. E seminibus *Tritici vulgaris*, cet. vel e tuberibus *Solani tuberosi* LIN.

ANGELICA. *Archangelica sativa* FRIES. (*Angelica Archangelica* var. *sativa* LIN., *A. sativa* MILL.) Europa media et australis.
Radix.

*ANISUM. Anis. *Pimpinella Anisum* LIN. Europa meridionalis, apud nos culta.
Semina (achenia).

ANISUM STELLATUM. Stjernanis. *Illicium anisatum* LIN. Japonia, China, cet.
Pericarpia cum seminibus.

ANTIMONIUM CRUDUM. Nativ Swafwelantimon. Spetsglans. *Sulphuretum stibicum nativum*.

*AQUA FORTIS. Skedwatten. *Acidum nitricum commune*. Pond. spec. 1. 23 erit.

*ARGENTUM. Silfwer.

*ARGENTUM FOLIATUM. Äkta Bladsilfwer.

*ARMORACIA. Pepparrot. *Nasturtium Armoracia* FRIES. (*Cochlearia Armoracia* LIN.) Europa media, apud nos cultum.
Radix recens.

*ARNICA. Hästfibler. *Arnica montana* LIN.
Flores vix explicati.
Radix.

ARROW ROOT. *Maranta arundinacea* LIN. et *M. indica* TUSS. India occidentalis et orientalis.
Amylum, Arrowmjöl, e rhizomatibus tuberosis paratum.

☿ ARSENICUM ALBUM. Hwit Arsenik. Hwitt Råttgift. *Acidum arsenicosum.*

*ARTEMISIA. Gråbo. *Artemisia vulgaris* Lin.

Fibrillæ radicis sero autumno colligendæ et, sine lotione mundatæ, in vase bene clauso servandæ.

ARUM. Dansk Ingefära. *Arum maculatum* Lin.

Radix recens vel siccata in vase diligenter clauso servanda.

ASSA-FOETIDA. Dyfwelsträck. *Ferula Assa foetida* Lin. Persia.

Gummi-resina e radice sauciata effluens. In massis vel frustulis durioribus, homogeneis, extus roseis vel dilute testaceis, intus albis sæpe roseo-venosis, odore fortiori.

*AVENA. Hafre. *Avena sativa* Lin.

Crimna. Hafregryn.

AURANTIUM. Pomerans. *Citrus vulgaris* Risso. (*Citrus Aurantium* var. *amara* Lin.) Arbor Orientis, in zonis calidis culta.

Flores (ol. *Flores Naphæ*) saliti.

Folia.

Fructus immaturi (ol. *Poma Aurantii*). Pomeransknopp.

Cortex fructus maturi siccatus. Pomeransskal. Cortices Aurantiorum Curassavienses, parte spongiosa tenuiori, optimi.

AURUM. Guld.

AURUM FOLIATUM. Äkta Bladguld.

*AXUNGIA PHOCÆ. Skälspäck. *Phocæ* et *Halichœri* species (*Phoca variegata* Nils., *Ph. annellata* Nils., *Halichœrus griseus* Nils., *cet.*)

Pinguedo subcutanea.

Ammoniac. Carbonicum.

Verkn: i små doser gr v – x. känsla af värma, ökad verksamhet i ganglisyst. känsla afsur urin äfven äfven alkaliskt i doser af gr XX – XXX. retning på hjertan. magplågor, diarrhé.

Anv. Att öka nervsystemets i huden verksamhet, att öka urin o. s. w. arbeiden Begagnas i vissa tillstånd af nervfebern då efter 11 dygnet krafterna äro så djupt sjunkna o. camfert. passar. (då jemte är mycket irriterad och hastig o. stark katarrh.)

dos. gr v – viij – x 4 – 6 ggr dd. Då en nervös tendens är för handen. Febr. catarrhal. Scarlatina.

Antispasmod. vid hyster. Convulsioner (bättre i S. C. C.)

Rec. Ammon. Carbon. ℨij
solv. in
Inf. Valerianæ f. Arn. f. Serpent. ℥viij
S. 1 m. 2 – 3 t. Arthritis.

Utv. Till ingnidn. mot chron. rheumatism Tamar. alb. Ammon. Carbon. ℨij + Axungiæ ℨj –
Till omslag å tortlar. ℨij på lbj. #.

Rec. Ammon. carbon. ℨß
Ol. Menth. Pyres.
— Cajeput. aa gtt XIj
Dr. in lagenâ c. Epistomio vitreo.
(Mot dåningar o. luktsalt)

Amygdalæ Amaræ.

Anv. Att tugga några morgon och middag för den som lida af dyspepsie.

Fräknar och solbränna.

Rec. Benzoës pulv. ℨj
Am. Amar. ℥j
f. lege art. c. aqu. Rosar. ℥viij Emulsio cui adde
Borac. Natric. ℨj
Dr. Att tvätta morgon och afton.

Angelica.

Hör till tonico-nervina f. Excitantia Etheroleosa (obrukadt förr använd s. nervinum, nu ersatt af Valeriana och Serpentaria).

Verkn: i små doser lindr. excitans i väderbildning och flatulens.

#

Rec. Rad. Angelic. ℥ß
infunde aqu. bull. q. s. per hor. dimid ut f. Colat. ℥viij
adde
Æther. spirit ℨij
S. 1 m. 2 t. (Nervfebern efter krisen o. 12 dygnet.)

#

Rec. Infus. Angelic. ℥viij
Oxymell. Scillæ ℨij
Liqu. Amon. Anis ℨij
S. 1 m. 5 – 6. dd. (mot chron. catarrh. hos gamla personer.

Aqua Fortis

Anv. gjenvertes - till bad ℨj – iv och bör den sjuke ligga i badet 15 – 20 m. tills han känner stickningar i huden begagnas så i svåra hudsjukdomar. I chron. Rheumatismer då ledgångs utsvedning svullnat. bra i lefversjukdomar, uppdrifning med förtätning af lefvern.

Till fotbad. ℨj – ij bra som afledande vid chron. hufvudvärk. till framkallande af fotsvett och menstruation. Fotbaden böra tagas hvar 2. dag.

Acid. Nitric. sp. aqu. p XX. mot chron. utslag. reformer.

#

Rec. Acid. Nitric. com. ℨj
Mell. Rosar. ℨij – iij
Mr. Dr. Pensel saft mot Torsk.

Armoraciæ Radix

har en S haltig skarp ætheriol-ja, hvarföre den bör vara färsk då den användes.

I små doser retande på magens verksamhet, länge begagnad för vården af en egen bukt. Stor dos per engång gör tyngd öfver bröstet, kräkning.

Anv för att lifva digest. hos slappa personer (stat. pituitos) ej vid ret-ning i magen, bäst för flegmat. personer. Slemlösande hos gamla personer. diureticum, antiscorbuticum.

Pepparrot rifves, blandas med två delar Socker Sr. 1 thesk. 4-6 dd.

Cerevisia Armoraciæ.

R̸ 3. Pepparrot + Trifol. ℥ij + Rad Zingib. ℥ß Cerevis. ℔ij.
Sr. 1 kt ett thekopp i sender.

R̸ Rad. Armorac. ras. ℥j-ij
— Calam. incis ℥ß
infund. c. aqu. Colat. ℔ij
adde
Syrupi Aurantii q.s. placet.
Sr. 2 m. 4 dd.

#

Rad. Armorac. ℥ij + Zingib. ℥j + en butelj franskt hvitt vin - står ett dygn och drar, hvarpå silas och tages ett spetiglas. p.d.

Begagnas att tugga vid tandvärk

Arnica.

Flores. skarpt. ætheriol. + skarpt extract ämne - retande
Radix skarpt ætheriol + garfämne = adstringerande.

Flores verka i mindre dos gr x-xv p. d. 3-4. dd. = känsla af värme och välbehag, digestion och aptit stegras länge fortsatt secundärt tyngd i hjernan svindel, ökad värme i extremit. krypning i huden, krampaktiga ryckningar kolik, plågor, smärtor, benägenhet för kräkningar och diarrhé, aptiten försvinner etc.

Ett retmedel så väl för gangliesystem som cerebrala systemet då en dyspnoe med verksamhet äger rum med torpiditet.

Contraind. Af sångerste retning (synd. Inflamat.) i mage o tarmat. af stat. gastricus. af röd och flödd tunga, af irriterad puls, af congestioner uti hjernan. Passar i allmänhet ej så bra i acuta sjukdomar.

Begagnas då hjernans tillstånd är deprimerad. Efter föregången sjukdom t. ex. Commotio Cerebri. Apoplexi o congestion. Efter Typhoid o nervösa febrar ej förr än efter crisis, lysis såsom ej heller förr än efter utdygn. I alla feber tillstånd der nervositeten är öfver vägande i senare stad. af Scarlatina. I Inflamationes gangraenosæ med depression i perifert nervsystemet som orsakar gangraen. I Pneumoni complicerande brand. Samt Rheum då den börjar öfvergå till chron. I Edra(?) st. mot slapphet i uttömningsorganer. Mot Paralysier. Och ge Arnica i lambet af utgjutning i hjernsubstansen (apoplexi) äras dess mindre bra förr än fac. apoplect. är förbi. I paralysier från svag-naden. I anæsthesier - Har begagnats mot secretions anomalier i olika organer (bråker) bra i början de amaurosis. I uppsvällningar af lefver o mjelte efter frossor. Nämnt i chron Rheum, ryggmärgs(?) ...

R̸ Inf. Flor Arnicæ (℥ij) ℔j.
Sr. Allt förbrukas i ett af fall om dagen i 4 omgånger. Samma dos fortfares med ökande af ℥ß flor. arn. om dagen tills ...

#

*AXUNGIA PORCI vel ADEPS SUILLA. Swinister. *Sus Scrofa* LIN.

Pinguedo omenti.

BALSAMUM CANADENSE. Canadabalsam. *Pinus balsamea* LIN. America borealis.

Resina ætheroleo soluta ex arbore vulnerata effluens.

BALSAMUM COPAIVÆ. Copaivabalsam. *Copaifera multijuga* MART. et plures *Copaiferæ* species. America meridionalis, præsertim Brasilia.

Resina ætheroleo soluta ex arbore sauciata stillans.

BALSAMUM PERUVIANUM vel INDICUM NIGRUM. Swart Perubalsam. *Myrospermum peruiferum* RICH. (*Myroxylon peruiferum* LIN. FIL.), *cet.* America calidior, Nova Granada præsertim et Peruvia.

Balsamum naturale e ramulis caloris ope elixum.

BALSAMUM TOLUTANUM. Tolubalsam. *Myrospermum toluiferum* RICH. (*Toluifera Balsamum* LIN.) America meridionalis calida.

Balsamum naturale e cortice vulnerato liquidum prodiens, demum solidescens.

*BARDANA. Karborre. *Arctium Lappa* Lin., *cet.*

Radix nondum lignosa vel spongiosa, ante caulescentiam colligenda.

*☿ BELLADONNA. *Atropa Belladonna* LIN. In montosis sylvaticis Europæ mediæ et meridionalis, apud nos culta.

Folia filis suspensa loco umbroso siccanda et vase bene clauso servanda.

Radix.

BENZOË. *Styrax Benzoin* DRYAND. India orientalis, Sumatra præsertim et Java.

Resina sic dicta amygdaloides.

*BERBERIS. Berberis. *Berberis vulgaris* LIN.
Baccæ recentes.

*BETULA. Björk. *Betula alba* LIN.
Folia tenera recentia.

*BILIS BUBULA vel BOVINA, FEL TAURI. Oxgalla. *Bos Taurus* LIN.
Bilis recens in vesica propria.

BISMUTHUM. Wismut.

BOLUS ARMENA. Rödgul Bolus. Fossilis Europæ australis, Asiæ minoris. *Argillæ species.*

BORAX. *Biboras natricus.*

BUCCO. *Diosma crenata* LIN., *Empleurum serrulatum* AIT. (*Diosma unicapsularis* LIN. FIL.) et *cet.* Promontorium bonæ spei.
Folia breviora oblongo-elliptica vel obovata a Diosma, longiora anguste lanceolata ab Empleuro obtinentur.

*BUTYRUM vide LAC.

CACAO. Chokladböna. *Theobroma Cacao* LIN., *cet.* America calida.
Semina de Caracas.

CAJEPUT vide OLEUM CAJEPUT.

CALAMINA vel LAPIS CALAMINARIS. Gallmeja. *Carbonas zincicus nativus.* Fossilis Europæ.

*CALAMUS VULGARIS vel AROMATICUS. Kallmus. *Acorus Calamus* LIN.
Radix decorticata.

*CALX VIVA vel USTA. Bränd och osläckt Kalk. *Calx caustica communis.*

CAM-

Rf. Inf. flor. Arnic (℥ij) ℥viij
Etheriol. spirit ℥ij
S: Att begagna efter nerffebrar. Afven tillsättes Carbon. ammon. Mot Catarrh hos gamla eller efter feber tillsättes Liqu. Ammon. Anis. ℨj–ij till ℥viij. Då digestion bevaras kunna Aromatica tillsättas. Isynnerhet tillsättes Trä.....ka 3β–jβ till ℥viij

Rf. Ætheriol. Arnic. gtt x,
solv. in
Æther. acetic. ℨj
S: 5–10 dr. 4 ggr. dl.

Utv. begagnas mest. s. adjuvans för invärtes bruk, tvättning med infusion. Cataplasmer. Tincturen ingnides. Ol. inf. Arnic. till injection. ekron. slem-flöden.
Vid contusioner, brand, nysmedel. Skalfmedel. – Kan förenas med Ka. Canthar.
Radix. håller 30% garfämne, adstringens o etypt... + Ætherolja, hvaraf den verkar på nerfsystemet. Bra då man vill stegra nerfsystemet samt hämma stegrade secretioner – bra i diarrheer efter nerffebrar, i dysenterie, sedan tenesmer och blodafgång upphört.
Rad. ej contraindicerad vid stat. gastr. kan ges vid belagd. fläld tunga. Ges i Inf. (håller mest Ætherol) l. i Decoct (håller mest garfämne)
Bidt. s. Inf. Dec. (℥ij–vj) ℥viij

R. Rad. Arnicæ
— Columbo āā ℥ij
infund. c. aqu. ebull. per hor. dimid.
Colat ℥viij adde
Ka Cascarill. ℥β
+ Syrup. Zingib. ℨj Aurant. ℥j
S: 4 m. dd. Afven kan tillsättas Æther Spirit. l. Carb. ammon.

Arsenicum Album.

Verkan Betydl. olika efter olika doser. I dosaf gr $\frac{1}{30}$–$\frac{1}{24}$. 1-2 dd. uppstår en känsla af värme o välbefinnande. efter 10–12 dagar torkhet i halsen, stegrad törst, kräkningar. Efter några dagar blodet i sinnesorganerna. Aptitten upphör – darrningar med hela kroppen.
I dosaf gr $\frac{1}{12}$–$\frac{1}{10}$. känsla af torkhet i halsen kolikplågor och diarrhe apathie, svaghetstillstånd, cachectisk hudfärg. pulsen blir hastig och liten. Döden inträffar ej. stort tillstånd. Efter döden inom organerna inga förändringar. Blodet tunnflytande upplöst – Arsenik igenfinnes genom kemisk analys i alla kroppens delar.
I dosaf gr. v – x – xx. Verkan olika alltefter den dos gifvit i fast flytande form. Upplöst verkas den fortare inom några minuter, i fast form kan det fördröjas en timma. Efter intagningen en brännande känsla i oesofagus o epigastrium kräkningar, stinkande diarrhe. apathie delirium symptomer af högst acut gastroenterites före döden något lefn.
Efter döden Blod. upplöst. Stasis i lungorna Ars. verkar först på gangliesystemet sedan på hjernan o nervsystem, framkallar äfven exanthem.
Många anse acid. arsenicos. aldrig borde användas, emedan den framkallar en dyscrasi som skadar den sjuke mer än sjukdomen.
Prof. Huss anser den ej så farlig då den ges med försigtighet, bör ej ges åt svaga dyscrasiska personer, ej åt nervösa fruntimmer, ej åt barn och gamla personer ej då magen är dålig o åt personer med svagt bröst.
dos. gr $\frac{1}{30}$–$\frac{1}{24}$ 1-2 dd. och intagas då den sjuke äter, då man gett den 6–8 dagar bör dermed uppehållas – likasom om den sjuke börjar klaga öfver torkhet i halsen och törst.
Anv. Mot hudsjukdomar, squamosa, lepra Elefantiasis. Mot Tremor ...... quartana, bör dock ej begagnas förr än andra medel blifvit försökt, mot chr. fr. nerfsjukdomar med typisk form. Epilepsie. Prosopalgie – Chorea. Asthma nervosum. Mot tertiär symptomer af Syfilis mot Rachitiska och scrofulosa dyscrasier
Ges: löst i vatten eller i piller 1 gran löst i Lbj + aqu. arom.
S: 1 m. 2 dd.

Rf. Acid. Arsenicos. gr j
Piper. nigr. l. Zing. ℥β
Mucilag. Gumi arab. q. sat. ut. f. M. ex qua form. pill. No xxx. S: 1 p. hvarje måltid, stundom äfven vid om qvällarne

Artemisia vulgaris

håller jemte hartz o extract.ämne ett eget aetheroleum. Förorsakar i stor dos äckel och kräkningar.

anw. i Epilepsie, isädan då anfallen komma flere gånger om dagen. Då prodromerna kännas tages ʒj - ij hvarefter drickes thee af Mynthe - följande dagar gifves 10 gr. mera hvarje dag. Vanligen kan man gå ända till 60 gr. Då inga prodromer kännas tar man ʒ meddet efter ett anfall.

Bra i epileptiska och konvulsiva tillfälligheter hos personer uti evolutionsperioden, äfvensom hos andra personer o. äldre qvinnor vid cessatio mensium. dos. gr X-XV. har äfven användts Emmenagogum

Rf. Inf. Artemis. (ʒij-iv) ℥vj
Sr på en gång i Epilepsie

#

Extr. Spir. artemis. gr iij-v. 3-4 dd.
Hos barn vid convulsioner af dentition Rf. Extr. spir. artem. gr v-x.
Gmi. arab. ʒj
Emulsion Amygdal. ℥iij
M. Sr. 1 th. 1-2. t.

#

Rf. Rad. Artem. vulg. pulv. ℥j
Mell. f. Syrup. qu. sat. ut f.
Electuar.
Sr 1 th. 4. dd.

#

Rf. Rad. Artem. gr X-XX
Oxid. Zinci gr jv
Aetheral. Valerian. gtj - iij
Sr 1 p. 4. dd. (Mot Epilepsie

Assa foetida

består af hartz-gummi vattsLem o skalligt Aetherol. löses i ättika eller med ʒ emulsion.

Verkan Upptages lätt af blodet, excrementerna o utdunstningen lukta deraf.

anw. verkar calmerande vid retlig orkemhet. gangliorna, o pöjes deras orkemhet. i hysteriska o hypokondriska åkommor. asthma, spasmus epiglottidis, hjertklappning.

Contraind. af febertillstånd, obstructions, blödningar och häftiga starka blodflöden.

Rf. Bilis bovin
Assa foetid āā ʒj
Aloë gr XV.
f. pil No LX. Sr 4-6. p 3-4. dd

#

Rf. Extract. Betulae
Sapon.
Assa foetid āā ʒj
f. pil No LX. Sr.
(bra för hysteriska qvin. qualand. bot)

#

Rf. Assa foetid ʒj
Camphor. gr X.
Conserv. Ros. qu. s. ut f. pil
No XXX. Sr. 2-4 p. 3. dd.
Hysteri Cardialgi med Kräkning

#

Rf. Assa foetid
Magist. Bismuth.
Extr. Chamomill. āā ʒj
Aetherol. Menth. gr XV.
f. pil No LX. Sr 4-6 p. 4 dd.

#

Rf. Assa foetid
Gmi Ammon. āā ʒj
Liqu. Amm. Anis. ℈β
M. f. pil No LX. Sr 4-6 p. 3-4 dd

CAMPHORA DEPURATA. Renad Kamfer. *Camphora officinalis* NEES. (*Laurus Camphora* LIN.) Japonia, China.

Ætheroleum concretum.

CANELLA ALBA vel COSTUS DULCIS. Hwit Kanel. *Canella alba* MURR. India occidentalis, præsertim Jamaica.

Cortex.

*CANNABIS. Hampa. *Cannabis sativa* LIN. Planta Orientis, in Europa culta.

Semina (nuculæ).

☿ CANTHARIDES. Spanska Flugor. *Lytta vesicatoria* FABR. In arboribus fruticibusve Caprifoliaceis et Oleineis Europæ mediæ et australis frequentes, apud nos rariores.

Insecta integra.

*CARAGHEEN vide LICHEN CARAGHEEN.

*CARBONAS CALCICUS NATIVUS e formatione primitiva. Urkalk. Bergkalk.

CARDAMOMUM MINUS. Kardemumma. *Alpinia Cardamomum* ROXB. (*Amomum repens* SONNER.) India orientalis, præsertim Malabaria.

Semina matura, capsulis inclusa.

*CARDUUS BENEDICTUS. Kardbenedikt. *Cnicus benedictus* GÄRTN. (*Centaurea benedicta* LIN.) Europa meridionalis; apud nos cultus.

Folia.

*CAREX ARENARIA. Sandstarr. *Carex arenaria* LIN. In maritimis arenosis.

Radix.

CARICA vide FICUS.

*CAROTA. Morot. *Daucus Carota* Lin.
Radix culta, recens.

*CARVUM. Kummin. *Carum Carvi* Lin.
Semina (achenia).

*CARYOPHYLLATA. Nejlikrot. *Geum urbanum* Lin.
Radix primo vere legenda.

CARYOPHYLLI. Kryddnejlikor. *Caryophyllus aromaticus* Lin. India orientalis, imprimis insulæ Amboina et Banda.
Flores nondum evoluti, siccati.

CASCARILLA. Kaskarill. *Croton Eluteria* Swartz. America calidior, Jamaica, cet.
Cortex.

CASTOREUM CANADENSE. Bäfvergäll. *Castor Fiber* Lin. Zonæ Europæ, Asiæ et Americæ arcticæ.
Materia in sacculis binis majoribus juxta anum utriusque Castoris sexus contenta.

CATECHU vel TERRA JAPONICA. *Acacia Catechu* Willd., *cet.* India Orientalis.
Succus (extractum) e ligno paratus.

CENTAURIUM MINUS. Tusengyllen. *Erythræa Centaurium* Pers. In Europa media et australi frequens, in Suecia rara.
Summitates florentes.

*CEPA. Rödlök. *Allium Cepa* Lin. Apud nos cultum.
Bulbus recens.

*CERA. Wax. *Apis mellifica* Lin.
Cera alba, per apricationem candefacta.
Cera flava, e favis apum liquata.

*CERASA ACIDA. Kersbär. *Prunus Cerasus* Lin. Ex Oriente; in Europa ubique culta.
Fructus (drupa) recens et siccata. Varietas austera (Moreller) eligenda.

#

Rec. Asae foetid.
Galbani
Rad. Rhej aa ʒj
Extr. Nucis Vom. spir. gr. viij
f.c. Balsam. Tolutan. q.s. pil
No LX. S. 4-5 p.p.d.
Flatulens med spasm. incyg. mag. Kolik.

#

Rec. Chlor. Ammon: ferrie.
Asae foetid. aa ʒj
Castor. ʒß
Balsami Peruvian. q.s. ut f.
pil. No LX. S. 4-6 p.p.d.
mot Chloros.

#

Rec. Asae foetid ʒj
Castor.
Croci aa ʒß
H. Sabinae gr XV. f.c.
suffic. quant. Ro aloespil
No LX.

#

Rec. Asae foetid ʒj
Acid. Zincic
Rad. Ipecacuanh. aa gr XV.
Ol. Valerianae gr X
Extr. Chamillae q.s. ut f. pil
No LX. S. 4-6 p.p.d.
Mot Convuls. Spasm. Chorea
Utv. Lavement då man vill hastigt verka på tarmkanalen hos personer med flatulens eller hysteriska plågor dos ʒß-j med äggula
Rec. Asae foetid ʒj
Vitell ovor. No j
triturendo Mr. senim adde
Infus Chamill. ʒvij
S. Clysma. Allt på en gång om man vill hafva hastig öppning, men hälften om man vill att det skall längre behållas.
S. plåster kring nafveln i habituell Kolik vid magkramp i epigastricum.

Arrow - Mjöl

Ett stärkmjöl af Amaranthea [illegible] löses ej i spirit eller kallt v. förfal[illegible] skas ofta med flere stärkelse arter Egenskaper lättnärande, i mälter att att reta. Brukas mest. dietetiskt medel, då mågen o tarmkanalen [illegible] i ett sådant tillstånd att den ej kan f[illegible] draga vanlig föda; barn att föda ba[illegible] artificiellt med. då man afvänjer de[illegible] eller då de vid mera framskriden ålder lida af atrophie el. kräkningar För äldre i många fall af gastrites Chronica. kräkningar ulcus ventri[illegible] culi. Tyfus. Diet. Anv. [illegible] med vatten mjölk el. buljong till [illegible] 2-3 theskedar till en Lb. fluid som ut[illegible] rörs kallt och sedan kokas - med [illegible] got arom. kanel. apelsinsirap att ko[illegible] ningen Citron el. Pomerans skal.
En god formel 2 lod hjorthorn i 1½ Lb. V. Colat. i 2-3 th. arrowmjöl. Aroma ombytes då de bedörna [illegible] [illegible].

Aurantium

Flores, folia, fruct. immatur. cortex. fructus alla hålla Aetherisk + Bittert extractivämne hörande Tonica nervina.

Anv. vid minskad verksamhet hos tarmkanalen, benägenhet för förstoppning, i den flatulens som förekommer hos hysteriska personer —

Flores till Aqu. Napha begagnas sällan ss drogt.

Syrup. flor. aurant.

Folia siccata ss. pulver inf. extract

Pulv gr X–XX nyttjas dd. ss comi: gens till Rheum. med Syrup till mos.

Infus (ʒß–j) ℥vj bra isynnerhet för barn med svag matsmältning med Malaga vin att tagas matskedtals 3–4 dd.

Fruct. immatur. ant. som pulver f. mos men bäst som Infus. Vinös ℥ij – iij på en butelj Malagavin

Cortex hos oss mest använd i pulv. form. gr vj — xij 3–4 dd. med socker.

Solamen hypochondriacorum.

Rec. Cort. Aurantii
Rad. Rhej
Tartar. Tartarisat. āā ℥ß
M. f. pulv. Ds. 1 th. 4 dd. (personer med hypochondri o hysteri).

#

Rec. Cortic. Aurantii
Summitat. Millefolii
Rad. Caryophyllat āā
M. f. spec. Ds. på 2–3 matskedar tas 3 te kuppar vatten öfver natten i förtäckt kärl på förmidd. i 3 repriser

Balsam. Canadens.

Rec. Balsam. Canadens ℥j–ij
Mell. depurat. ℥j
M. f. Electuar. Ds. 1 th. 4–6 dd.

#

Rec. Balsam. Canad. ℥j
Carbon. Magnes. qu. s. ut f. m. ex qua form. pil. № CXX
Ds. 10 p. 4–6 dd.

#

R. Balsam. Canadens.
Gumi. Arab.
Sacchar. alb. āā āā ℥ß
tere c. aqu. dest. ℥viij f. Emulsio Ds 1 m. 4–6 dd. lättfördragligt blir det om hinsatt af Aether spirit.

Balsam. Copaivæ

Rec. Balsam. Copaivæ ℥ß
Pulv. pip. Cubeb. ℥j (ʒß)
Syrup. Juniper. q. s. ut. f. E.
(Mell. āā ℥jß
M. f. Elect. Ds 1 th. 4–6 dd
m. f. droppar

#

Rec. Balsam. Copaivæ ℥ß
Vitell. ovor. № j
Aqu. Aurant. f. M. pip. ℥vj
Aeth. nitr. spirit ℥j–ij
M. f. Em. Ds. 1 m. 4. dd

#

Mixtura Chopartii se sid 126.

#

Rp. Ceræ albæ ℥j
liquefacta & refrig. sat. adde
Balsam. Copaivæ ℥j
f. pil. № 80. Ds. 10 st. 4 dd.

#

Rec. Balsam. Copaivæ ℥j
Carbon. magnes. q. s. ut f. pil. № 120.

(afven kan tillsättas Catechu ℥j)

*CEREFOLIUM HISPANICUM. Spansk Körfwel. *Myrrhis odorata* Scop. (*Scandix* Lin.) Europa; apud nos culta.

Herba ante florescentiam colligenda.

*CERUSSA ALBA. Blyhwitt. *Hydrocarbonas plumbicus.*

CETACEUM vide SPERMA CETI.

*CHAMOMILLA NOSTRAS. Kamillblommor. *Matricaria Chamomilla* Lin.

Flores nuper explicati.

CHINA. Kinarot. *Smilax China* Lin. China, Japonia.

Radix ponderosa vel orientalis.

CINA LEVANTICA vel SANTONICUM LEVANTICUM. Levantiskt Maskfrö. *Artemisia Contra* Lin., *cet.* Asia media, Syria, cet.

Semina. (Flores nondum explicati.)

CINCHONA vel CHINA GRISEA DE HUANUCO. Grå Kina. *Cinchona glandulifera* Ruiz. Andes Peruviani.

Cortex.

CINCHONA vel CHINA REGIA seu CALISAYA. Kungskina. *Cinchona angustifolia* Ruiz. Andes novæ Granadæ.

Cortex.

CINCHONA vel CHINA RUBRA. Röd Kina. *Cinchona colorata* Ruiz., *cet.* Andes Peruviæ, cet.

Cortex.

CINNABARIS RUBRA. Cinnober. *Sulphuretum hydrargyricum sublimatum.* (In frustulis.)

CINNAMOMUM CEYLANICUM. Äkta Kanel. *Cinnamomum ceylanicum.* Nees. (*Laurus Cinnamomum* Lin.) Ceylon.

Cortex interior, tenuis.

CITRUS. Citron. *Citrus medica* LIN. Arbor Orientis, in Europa meridionali culta.

Fructus recens.

Cortex fructus maturi, recens et siccatus. Citronskal.

Succus fructus maturi, excorticati, expressus et colatus. Citronsaft.

Oleum de Cedro (ætheroleum flavedinis).

COCCIONELLA. Konsionell. *Coccus Cacti.* LIN. In Cacto coccionellifero, cet. Americæ calidæ.

Feminæ integræ siccatæ.

*COCHLEARIA. Skedört. *Cochlearia officinalis* LIN. In maritimis spontanea, alias culta.

Herba recens.

COLCHICUM. Nakna Jungfrun. Tidlösa. *Colchicum autumnale* LIN. Europa media et australis; apud nos cultum.

Semina.

COLLA PISCIUM vide ICHTHYOCOLLA.

COLOCYNTHIS. Koloqnint. *Cucumis Colocynthis* LIN. Regio mediterranea et variæ Africæ partes.

Pulpa peponis excorticati, siccata seminibusque liberata.

*COLOPHONIUM. Harts. *Pini* species, præsertim *Pinus sylvestris* LIN. et *P. Pinaster* AIT.

Resina, post destillationem ætherolei e balsamo nativo, remanens et iterum igne liquata.

COLUMBO. Kolumborot. *Cocculus palmatus* DE CAND. (*Menispermum palmatum* LAM.) Africa orientalis, Mozambique.

Radix.

*CONIUM. Odört. *Conium maculatum* LIN.

Herba recens et siccata.

Rp. Balsam. Copaivæ
Gmi arab. aa ℥ij
Aqu. Menth. ℥ij
terendo & bene miscens adde
Pulv. pip. Cubebæ ℥ij
f. Boli № vij Sr 2 st. 3-4. dd.

#

Rp. Balsam. Copaivæ ℥ij
Liqu. Ammon. Acesat ℥ß
Syrup. juniperi f. tenega ℥iij
Sr 1 Th. 4-6 dd. (Tbröstsjukd.)

#

Rp. Balsam. Copaivæ ℥ij
Muc. Gi arab. ℥ß
Aqu. Calcis ℥vj
M. f. Emulsio Sr till lavement
el. injection i blåsan

#

Rp. Balsam. Copaivæ ℥j
Gmi arab. pulv. ℥ß
Aqu. Menth piper. ℥viij
Syrup. Althea ℥iß (℥ij
M. f. Em. Dr. Sr. 1m. 4 dd.

#

Rp. Balsam. Copaivæ
Baccæ pip. Cubeb
Cort. Cinchon. pulv.
Mucilag. Gi arab. aa ℥ij
M. f. pil. № 120.

Rp. Bals. copaiv
Spir. vin. gallic. aa ℥j
Aqu. cinnamom
Syrup. Aurant.
Mucil. gmi arab. aa ℥ij
M. f. emuls. D. S. 1 m
2 à 3 ggr. d. 1.

Balsam. Peruvian

Rp. Ceræ albæ ℥ij
liquefact. et semirefrigerat.
adde
Balsami Peruvian. ℥ij
f. pil. № CXX Sr 10 p. 4 dd.
(mot chron. diarrhea med ulcerationer. Tabes. Vid ingiven tillsättes
Extr. Nuc. Vom.)

#

Rp. Balsam. Peruvian ℥ij
Vitell. ovor. № j
tere cum Mucilag Gmi arab. ℥vj
adde
Aqu. flor. Aurant. ℥j
M. f. Emulsio Sr 1 m. 4-6 dd. (Tbröst
å kommor.

#

Rp. Balsam. Peruvian ℥vj
Ol. Olivar. ℥iij
Vitell ovor. № 4
tere semper miscendo
add. Vini ℥iij f. Emulsio
Sr 1 m - 2 t (Slappdroppel. långvar. gonorrh.

#

Rp. Balsam. Peruvian ℥j - ij
Axungiæ ℥j
M. f. Ungv.

#

Rp. Balsam. Peruvian ℥ß
Tæ Opii
Æther. nitriq. spir. aa ℥j
Mr. Sr. Liniment mot om kyla
i frostknölar.

#

Rp. Gummi arab. pulv. ℥j
solv. in
Aqu. flor. Rosar. ℥j
adde subigendo
Ol. Amygdalar ℥iß
Bals. Peruvian ℥j
Mr.

Belladonna.

Rep. Rad. Belladonn. gr ¼
Magnes. Bismuthi. gr jv
Elaeosacchar. Carvi gr viij
D. S.
(Långvariga Cardialgier)

#

Rec. Rad. Belladonn. gr ¼.
Hydrarg. Cretac.
Rhei Sibir. āā gr jv
S.
mot Eulsot - uppdrifning af lefver o mjälte efter frossa.

#

Rec. Sulph. Cupric. Ammon gr jv
solv. in
Aqu. dest. qu. sat.
adde
Rad. Belladonn. gr jv - gr viij
– Althea qu. s. ut f. pil N:o
XVj Gr. 1 p. 4 dd.
Spasmodisk Cardialgi

#

Rp. Rad. Belladonn. gr ¼.
Lactat. ferros. gr jv
Sacchar. lact. gr x.
S.
Chloros.

#

Rp. Rad. Belladonn. gr ¼.
Sulph. Quinin. gr ij
Sacch. gr x.
S. 2-3. p. dd. (Prosopalgi som ej viker för Quinin ensam.)

#

Rep. Fol. Belladonn.
Fol. Stramonii
– Nicotian āā
S. till rökning vid asthma.
Rökes tills spel uppkommer

#

Rec. Infus. fol. Belladonn. (gr X) ℥j
Syrupi Sacch. ℥ij
S. 1 tk. ngr. gg om dagen kikhosta
Tabiä gifva ej yngre som pudvis orätta

#

Rec. Fol. Belladonn. ʒj - ʒß
infund. c
Aqu. ℥jv.
S. Lavement på en gång mot Trismus Tetanus etc.)

#

Rec. Fol. Belladonn.
– Hyoscyami āā gr X
inf. c. aqu. ℥j
S. 3-4 dr. indryppes i ögat

#

Rec. Fol. Belladon. (Extrakt) ʒj
Emplastr. (Hg.) ʒj
S. Empl.

Benzoës

Rec. Benzoë pulv. ʒij
Amygdal. amar. ʒß
tere c. aqu. Rosar ℥viij
in qua solve
Borac. Natric. ʒij
S. Cosmeticum

CORALLIUM RUBRUM. Röd Korall. *Isis nobilis* Lin. Mare mediterraneum.

Pars interna calcarea, animali remotâ.

*CORIANDRUM. Koriander. *Coriandrum sativum* Lin. Europa australis, apud nos cultum.

Semina (achenia.)

*CORNU CERVI. Hjorthorn. *Cervus Elaphus* Lin., *C. Alces* Lin., *C. Tarandus* Lin. Prior apud nos cicur, ceteri indigeni.

Cornua integra et rasa.

COSTUS DULCIS vide CANELLA ALBA.

CREOSOTUM. Kreosot. *Oleum empyreumaticum* sui generis.

*CRETA ALBA. Krita. *Carbonatis calcici nativi* species friabilis, tingens. Fossilis Europæ.

CROCUS ORIENTALIS. Saffran. *Crocus sativus* Lin. Ex Oriente, in Europæ australis regionibus montosis, Austriæ, Italiæ, Hispaniæ, cet. cultus.

Stigmata.

☿CROTON vide GRANA TIGLII.

CRYSTALLI TARTARI vide TARTARUS DEPURATUS.

CUBEBÆ. Kubeber. *Piper Cubeba* Lin. India orientalis, præsertim Java.

Baccæ nondum maturæ.

CYDONIA. Qwitten. *Cydonia vulgaris* Pers. (*Pyrus Cydonia* Lin.) Arbor Orientis et Europæ australis.

Semina.

CYMINUM. Spiskummin. *Cuminum Cyminum* Lin. Ægyptus, cet.; in Europa australi cultum.

Semina (achenia).

*DAUCUS vide CAROTA.

*DIGITALIS. Fingerborgsört. *Digitalis purpurea* Lin. Europa media et Norvegia; apud nos plerumque culta.

Folia locis elevatis, apricis collecta, petiolis costisque liberata.

DIOSMA vide BUCCO.

*DULCAMARA. Qwesweb. *Solanum Dulcamara* Lin.

Stipites (caules sarmentosi) hyeme vel primo vere colligendi.

☿ELATERIUM ALBUM. *Ecballion Elaterium* Rich. (*Momordica Elaterium* Lin.) Europa australis; apud nos interdum cultum.

Succus e fructu submaturo abscisso sponte prodiens, inspissatus.

*ENULA. Ålandsrot. *Inula Helenium* Lin. Europa; apud nos plerumque culta.

Radix.

☿EUPHORBIUM. Prustkåda. *Euphorbia officinarum* Lin., *E. antiquorum* Lin. et *E. canariensis* Lin. Africa, India et insulæ Canarienses.

Succus lacteus e planta vulnerata stillans, in aëre solidescens.

*FEL TAURI vide BILIS.

*FERRUM. Jern.

Rasura. Jernswarfspån. E ferro cuso tornando parata.

Limatura. Jernfilspån. E ferro nec orichalco nec ære adglutinato. Servatur in vase bene clauso.

FICUS PASSA vel CARICA PINGUIS. Torra Fikon. *Ficus Carica* Lin. Arbor Orientis et Europæ australis.

Fructus (cœnanthium).

Rx. Boracis ℥j
Syrup. Sacchar. ℥j
Conterantur donec Borax soluta
sit. Linctus.

#

Rx. Boracis ℥ij
Ser. c. Aqu. Carvi ℥vj
Am. Amar. ℥ij
Sr. 1 m. i timmen eller oftare vid
felande f. svår menstruation hos el
spot starka o friska personer, der ej
allmänna organismen deltager
utan lidandet är mera lokalt.

#

Rx. Boracis gr. x.
Cocc. gr. v.
Elaeosacch. Cinnamom. gr. v.
Sr. 1 p. 1/2 - 2 timme

#

Rx. Boracis ℥j
Aqua Tiliae ℥vj
Aqu. Am. Amar. conc. ℥ij
Sr. 1 m. 2 t. Ulcus Ventriculi

Rec. Fol. Bucco
- Uva Ursi āā ℥β
inf. c. aqu. fervid. ℥viij
digere per horam. dimid
adde
Syrup. Senegae. ℥β
Sr. 1-2 m. 4 dd. (Vid blåsans & prostatas lidanden hos gamla personer, blåsecatarrh.

Rec. Semin. Cacao ℥iv
Rad. Saleb ℥vj
Aqu. destill. ℥viij
coque leni calore per hor. dimid
adde
Sacch. alb. ℥iv
Farin. Tritici (?) q.s.
ut fiat pasta. Sr. Mot Diarrhé

Rec. Semen. Cacao ℔j
Farin. Maranth. ℥β
M. coque. c. aqu. suff. ad pasta

Rec. Lichen. Island. dep. ℥ij
Semen. Cacao
Sacch. alb. āā ℔jβ
Rad. Saleb. ℥ij
M. f. c. aqu. ferv. qu. sat. ut f tabula.
Efter försvagande sjukdomar med Diarrhé)

Rostade Ekollon + rostade Cacao bönor till Kaffe åt scrofulösa barn.

Rec. Folior. bucco
- uvae ursi āā ℥ij
Infund. c. aqu fervid. ℥vj
Macera per horas duas & colaturae
adde Solut. carbon. kali. ℥β
Tr.ae cinnamomi
- hyoscyami āā ℥ij
M. S. 2 m. 3 dd. Cystitis chronica.

Calamus.
verkan. höjer gangl. systemets och śmkt ökar afsöndringarne
användes vid slapphet och dyspepsi med amara t. ex. Quassia. Card Ben. mot maskar, mot vapörer svaghet, buller i tarmarne, mot dyspepsi med fel i digest. organ. t. ex. Hydrops Chlorosis.
dosis som Inf. (℥j) ℥vj per horam
Vin (℥j) ℔j Malaga.

Rec. Rad. Calami
Ramer. Ligni Quassia āā ℥j
(Card Bened) Fol. Aurant
inf per horam ℥viij
Colat. adde
Bicarb. Kalic. ℥ij
Sr. 1 m 4. dd. dyspepsi Chlorosis

Rec. Infus. Calami ℥vj
Extr. Card. Bened ʒj.
Trifol. aquat. ℥β
Aqu. Aur. Amar. ℥j
Sr. 1 m 4. dd. Chlorosis der magens retlighet & Card. sympt. framstå.

Rec. Sachar. alb. ℥vj
coque. c. aqu. qu. s. ad form. tabulas
adde
Rad. Calami pulv. ℥j
Semen. Foenicul. pulv. ʒj
Olei Menth. piper ʒj
Mr. N:o XXX. Sr. 3-4 efter maten mot uppstötningar.
Rec. Aetherol. Calami ʒj
solv. in
Aether. acetic. ℥ij
Sr. 10-20 drop. på socker (nervdroppar.)

*FILIX. Ormbunke. *Aspidium Filix Mas* SWARTZ.
Radix (rhizoma cum basibus frondium).

*FOENICULUM. Fenkål. *Foeniculum officinale* ALL. (*Anethum Foeniculum* LIN.) Europa australis; apud nos cultum.
Semina (achenia).

*FRAXINUS. Ask. *Fraxinus excelsior* LIN.
Cortex ramulorum.

*FULIGO SPLENDENS. Glanssot.

*FUMARIA. Jordrök. *Fumaria officinalis* LIN.
Herba florens.

*FUNGUS QUERCINUS vel AGARICUS CHIRURGORUM. Fnösksvamp. *Polyporus fomentarius* LIN., *cet.* In arboribus frondosis parasiticus.
Pars interior præparata.

GALANGA. Galgorot. *Alpinia Galanga* SWARTZ. India orientalis, præsertim Sumatra.
Radix minor.

GALBANUM. *Galbanum officinale* DON. Asia media.
Gummi-resina e caule sauciato effluens. In granis flavescenti-semipellucidis, separatis vel concretis.

GALLÆ TURCICÆ vel ALEPPENSES NIGRÆ. Swarta Galläpplen. *Quercus infectoria* OLIV. Asia minor, Syria, cet.
Excrescentiæ ramulorum punctura et depositione ovorum a *Cynipe Gallæ tinctoriæ* productæ.

GAMBOGIUM vide GUMMI GUTTA.

GENTIANA RUBRA. Baggsöta. *Gentiana lutea* LIN., *G. purpurea* LIN., *cet.* Alpes Europæ, præsertim Helvetiæ, Tyroliæ; G. purpurea etiam Norvegiæ.
Radix.

*GLACIES. Is.

GLYCYRRHIZA vide LIQUIRITIA.

*GRAMEN. Qwickrot. *Triticum repens* Lin.
Radix.

☿GRANA TIGLII. *Croton Tiglium* Lin. et *C. Pavana* Hamilt. India orientalis.
Semina.

GRANATUM. Granatträd. *Punica Granatum* Lin. Africa, Asia et Europa calidior.
Cortex radicis.

*GRAPHITES. Blyerts. *Carbo nativus.* Fossilis Europæ.

*GRATIOLA. Jordgalla. *Gratiola officinalis* Lin. Europa media et australis; apud nos culta.
Herba.

GUAJACUM vel LIGNUM SANCTUM. Pockenholz. *Guajacum officinale* Lin. India occidentalis, præsertim Jamaica et Domingo.
Lignum.
Resina e trunco et ramis.

GUMMI AMMONIACUM. *Dorema armeniacum* Don. Persia, cet.
Gummi-resina e planta sauciata effluens. In lacrymis vel amygdalis distinctis, interdum conglutinatis.

GUMMI ARABICUM. *Acacia Seyal* Delile, *A. tortilis* Hayne, *A. Ehrenbergiana* Hayne, *cet.* Arabia, Ægyptus, Africa calidior.
Gummi e trunco et ramis arborum sponte exsudans, album, in frustula minuta facile dilabens.

Camphora

Motgift Emet. medel t. kalla begjutningar på ryggen. med aceta ammoniac. caust 4 dr. i 1 t.
Anv. Vid depressionstillstånd i nerfsystemet med förmagad hjertverksamhet. ¦ i nervösa febrar septiskt tillstånd
2°. Vid förvänd verksamhet i hjernan t.ex. delerium Epilepsie
3°. D°. i gangl. nerv neuralgier priapismus. ↔
4°. till ökande af hudverksamheten
5°. Att häfva narcotism.
Contraind: af acut retn. i magen. gastricism. allm. erethism i kärlsystemet t.ex. inflamat. tillfällen (i deras första stadium).
Starkt blodtillopp till hjernan ¦ under lifvet.
Tuberculos. flädd och röd tunga
Hapvandskap (isr på barnet)
Idiosynkrasi mot Campk.
Speciell anv. I febrar (nervösa typh.) efter 11–14 d. Kraft. sjunkna - stupor ej conget. till hjernan - pulsen låg svag. hj. verksamheten svag lita hjertljudet svagt (huden torr lut tungan torr skarp belagd)
Contraind. flädd röd tunga öm mage
I febrar som antaga adynamisk karakter i sednare stad. Mesling Scarlatina Influenza hos gamla personer der depression vid sjukdomen
I Exanthem. febrar a) då utslaget ej slår ut, som är farligt ty Krafterna sjunka för hastigt. i andra stadiet
I acut. Rheum. febrar. för slappa personer, atoniska, ej för sanguiniska blodfulla ty lokala inflammat. sjukdome lätt pericarditis m.m.
Cholera
Neuroser som utgå från spinalsystemet ej för retliga personer.
i gangl. bsystemet
: Cerebralsystemet Epilepsie.
Delir. Trem. med efterfölj. adynam. stadier
retn. i könsorganerna priapism

mot sept. tillstånd Gangraenascens brand efter Typhus feber - Forenas vanligen med opium.
I början af acuta sjukdomar till framkallande af artificiell kris
Camfert med retn. då man fruktar dess retande verkan på karlen.
med Calomel ¦ Ipecacuanha i samma ändamål.
med syror för att minska dess retn. på hjernan
Ökar verksamheten hos Moschus. Castor
Corrigenser Opium minskar dess narkotiska ökar dess sedativa verkan retn. sedativt kylande medel vid smartor af neuralgi. Rheumat. arthritis. contusioner vid Erysipelas.
Rent derivator med t.ex. lavement. ↔ i typhös febr.
Till stillning vid nervösa sjukdomar i respirat. vägarne asthma kikhosta m.fl.
dosis a) i acuta sjukdmr gr ½–j–ij i timmen
b) i chron. gr. ij–jv–vj
c) Cholera. gr V. hvar ¼ timme ↔
form med Spirit tincld.
i Emuls. form med Em. Amygd. Hacken bör omskakas väl.
i Ethertörning Mandelolja för att minska dess retande verkan.

Rp. Camphor. gr ij #
Moschi gr ij – jv
Sal. C.C. gr vj
Sach. gr x
Mr. tr / p. 2 / dygnet om (Typhus)

Rp. Camphor. gr xij #
solve in
Oleum. Tereb. ʒij
Mr. terendo. cum vitell ovi No j
adde
Aqu. Menth.
Mucilag Gum. arab. aa ℥ij
Sr 1 m 2 t. (Krajende typhös Pneumonie

Till kryddpåsar Camph. gr x till kryddor ℥x.
Mot hufvudvärk Camph. & acid. acet. dilut.
Lavement Rx. Camph. gr x.
Opii gr j
Vitell. ovi No j
Infus Chamom. ℥iv
Dr. Halften ¼ delen.
Gargarisma Spir. Camph. Tinct Myrrh. & Inf. Salviae vid salivation
Omslag för brand Camph. tost. pod ven. godt medel.
Luktmedel gr x på Æther. acetic ℥j

Rx. Camphor. ℥j
Acid. Nitr. Nitr. ℥ij
Dr. på svallkött. Lyfter ka sär kräfta.

Rx. Cort. Canell alb. ℥β x
inf. per hor. ½ c. q. s. aqu. ebull
ad Colatur. ℥viij adde
Extr. Card. Bened. ℥j
Æther spirit ℥j.
Dr. 1-2 m. före o efter maten en timme

Rx. Canthard. gr iv
Vitell ovor. No j
f. c. aqu. M. pip. ℥viij
Emulsio Dr 1 m. 3 del.
#
Rx. Canthard. gr v.
pulv. rad. Althea ℥β x
Extr. Liquir. qu. sat.
f. pil No XXX Dr. 2-4 piller 3 ggr dd.
Canthard. bör förenas med amnion at för att kraftigt draga blåsor när så behöfs.

GUMMI GUTTA vel GAMBOGIUM. *Hebradendron Cambogioides* GRAHAM. Arbor Indiæ orientalis.
Gummi-resina e ramulis foliisque decerptis profluens, in aëre exsiccata.

*HÆMATITES. Blodsten. *Oxidum ferricum nativum.* Fossilis Europæ.

☿HELLEBORUS ALBUS. Hwit Prustrot. *Veratrum album* LIN. Alpes Europæ.
Radix fibris resectis.

☿HELLEBORUS NIGER. Swart Prustrot. *Helleborus niger* LIN. Alpes Europæ australioris.
Radix.

*HIPPOCASTANUM. Hästkastanie. *Æsculus Hippocastanum* LIN. Asia borealis; in Europa cultus.
Cortex ramulorum.

*HIRUDINES. Blodiglar. *Sanguisuga medicinalis* SAVIGN., *S. albipuncta* WAHLBERG et *S. officinalis* SAVIGN. In aquis stagnantibus Europæ; priores apud nos indigenæ.
Animalia viva.

*HORDEUM. Korn. *Hordeum vulgare* LIN., *H. distichon* LIN., *cet.*
Crimna. Korngryn.
Farina. Kornmjöl.
Maltum. Malt.

*HUMULUS vide LUPULUS.

HYDRARGYRUS vel MERCURIUS VIVUS. Qwicksilfwer. *Hydrargyrum.*

*HYOSCYAMUS. Bolmört. *Hyoscyamus niger* LIN.
Folia recentia et siccata.

*HYSSOPUS. Isop. *Hyssopus officinalis* LIN. Suffrutex Europæ meridionalis, apud nos cultus.
Herba florens.

*JACEÆ HERBA vide VIOLA TRICOLOR.

JALAPPA. *Ipomoea Schiedeana* Zucc. America media, Mexico, cet.
Radix.

ICHTYOCOLLA vel COLLA PISCIUM. Husblås. *Acipenser stellatus* Pall., *A. Gyldenstædtii* Br. et Ratz., *A. ruthenus* Lin., *A. Huso* Lin. In fluviis Russiæ meridionalis, mare Caspico et nigro.
Membrana interna vesicæ natatoriæ præparata.
Optima albida, subdiaphana.

*IMPERATORIA. Mästerrot. *Imperatoria Ostruthium* Lin. In convallibus alpium Europæ mediæ et australis frequens, apud nos sæpius culta.
Radix.

INDIGO vel PIGMENTUM INDICUM. *Indigofera tinctoria* Lin., *I. Anil* Lin., *I. argentea* Lin., *cet.* India orientalis et occidentalis, Ægyptus, cet.
Pigmentum e foliis paratum.

JODUM. Jod.

IPECACUANHA. Kräkrot. *Cephaëlis Ipecacuanha* Rich. America meridionalis calida, præsertim Brasilia.
Radix annulata, grisea vel fusca.

IRIS FLORENTINA. Violrot. *Iris florentina* Lin. Italia.
Radix decorticata.

*JUGLANS. Walnöt. *Juglans regia* Lin. Arbor Persiæ, cet., in Europa et Suecia quoque australiori culta.
Putamina (pulpa druparum immatura, viridis).

*JUNIPERUS. En. *Juniperus communis* Lin.
Baccæ immaturæ.
Baccæ maturæ.
Lignum radicis.

Rec. Fol. Card. Bened.
Rasur. Quassiæ āā ℥j
Anisi Stell. contus ʒβ
m. f. Species Sr. kryddor hvaraf
tages en stor thekopp. (infus)
½ vrdrickes på nyktra mage
½ efter maten eller 1m. 2 t.
#
Rec. Fol. Card. Bened. ℥iij
Rad. Calami ℥ij
inf. c. aqu. bull. q. s. ad Colatur
℥viij adde
Bicarb. Kalic. ʒij – iij
Ds. Sr.
(Chlorot. Cardialgiek i for slappa pers)
#
Rec. Fol. Card. Bened. ℥ij
Semin. Phellandrii ʒvj
inf. c. aqu. bull ad Colatur ℥viij
Aqu. Am. Amar. conc. ʒij
Sr. 1m 4 dd. för Phtisici med
dålig matsmältning.

Rec. Caricis arenari
Rad. Bardan. āā ℥ij
Lign. Junipor. ras. ℥j
Macerantur per hor XXij c. aqu. Ebr.
coque ad remanent. ℔ij Cola et
press.
Sr. vrdrickes på dagen. Mot Chr.
Rheum. kunna Stipites Dulcamar.
tillaggas

Rec. ℥ rad. Caryophyll. ℥ij
Salis Ammoniac.
Sacchar. āā ℥ij
M. f. pulv. S. 2 th. 2 t.
(under Apyrexiën mot låda växform)

#

Rec. Cort. Cinchon.
rad. Caryophyll. aa ℥ß
f. lege art. Infuso-Decoct ℥viij
Colatur. adde Aether. spir. ℥ij
S. Tertiores på dagen, mot recidiv
af feberanf.

#

Rec. Rad. Caryophyllat. ℥ß
infund. per hor. ½ s. q. aqu. bull.
ad Colat. ℥viij adde
Syrup. Vitrioli ℥ij
Dr. S. mot diarrhé
efter febrar. Vid stor svaghet
tillsättes Aeth. spir.

#

Rec. Caryophyll. aromat. ℥ij
Flavid. Cort. aurant.
Carbon. Magnesiæ aa ℥j
Rad. Rhei Siberiæ ℥ß
Motsvarar pulv. arom. alkal. till verkan.

Rec. Cortic. Cascarill.
Rad. Arnicæ aa ℥ij
inf. ad Colatur ℥viij
Aether spir. ℥ij
(Ra Thebaic. ℥ß)

#

Rec. Cort. Cascarill. gr X–XX
Opii
Ipecacuanh. aa gr j
M. f. pulv. S. 3–4 p. dd. Mot
diarrhé fortsättes länge om man
fruktar diarrhéens återkomst

#

Rec. Castorei gr X–XX
Infus. Chamom. ℥iv–v.
S. till lavement (mot konvul-
sioner under dentition

#

Rec. Castor. angl. ℥j
Asæ foetid ℥ij
Aloës lucid. gr XV–XX.
Balsam. peruvian. (vel Extr. Valerian)
q. s. ut f. pil No LX.
S.
(Mot trögt lif, Flatulens, uppstötning
hos Hysteriska.)

#

Rec. Chlor. ammon. ferric.
Galbani āā ℥ij
Castorei ℥j
Balsam peruvian q. s. ut f. pil
Nr: 120. S. 4-6-8-10. 3–4 dd.
(Mot Chlorosis å Hysteria)

#

Rec. Castorei gr. iij
Sal. C.C. gr iv
Opii gr ¼ ½.
Sacchar gr viij
M. f. pulv. S. 1 p. till natten
eller 3–4 dd.

#

Rec. Castorei ℥j
Vitell. ovor. No j
mucilag. Gum. Arab. q. s. sat. ure
parum addendo
Aqu. Menth. ℥ß.
f. Em. S. 1 m. 3–6 dd.

KALI ZOOTICUM vel BORUSSICUM. Blodlutssalt.
Cyanetum ferroso-kalicum.

KINO. *Drepanocarpus senegalensis* NEES (*Pterocarpus* HOOK.) et arbor Indiæ orientalis nondum satis nota. Drepanocarpus est arbor Africæ occidentalis, imprimis Senegaliæ.

Succus inspissatus.

*LAC VACCINUM. Komjölk. *Bos Taurus* LIN.

Butyrum. Smör. Recens, non salitum.
Cremor. Grädde.
Saccharum lactis. Mjölksocker. E sero paratum.

LACCA IN GRANULIS. Gummi Lacka i korn. *Aleurites laccifera* WILLD., *Ficus indica* VAHL et *F. religiosa* LIN., *cet.* India orientalis.

Materia resinosa, in frustula redacta, quæ puncturâ feminarum *Cocci Laccæ* e ramulis arborum elicitur et insecta ramulosque incrustat.

☿LACTUCARIUM ANGLICUM. *Lactuca sativa* LIN. et *L. virosa* LIN.; illa apud nos culta, hæc in Europa media spontanea.

Succus lacteus e planta sauciata effluens, in aëre inspissatus.

*LAPATHUM ACUTUM. Hästsyra. *Rumex obtusifolius* LIN., *cet.*

Radix.

*LAPILLI CANCRORUM. Kräftstenar. *Astacus fluviatilis* FABR.

Concrementa calcarea.

*LAPIS SUILLUS. Orsten. *Carbonas calcicus bituminatus.* Fossilis.

*LAVENDULA. Lawendel. *Lavandula Spica* Willd. (*L. vera* De Cand.). Suffrutex Europæ australis, apud nos cultus.

Flores nuper explicati.

Oleum (ætheroleum florum).

LAURUS. Lager. *Laurus nobilis* Lin. Europa australis, cet.

Baccæ (drupæ) siccatæ.

Oleum e drupis expressum.

*LEDUM vide ROSMARINUS SYLVESTRIS.

*LEVISTICUM. Libsticka. *Levisticum officinale* Koch. (*Ligusticum Levisticum* Lin.) Europa australior; nobis hortense.

Radix.

*LICHEN CARAGHEEN. *Sphærococcus crispus* Ag. Ad littora Angliæ et Hiberniæ frequens, nec non Sueciæ occidentalis et Norvegiæ passim.

Planta integra.

*LICHEN vel MUSCUS ISLANDICUS. Islandsmoßa. *Cetraria islandica* Ach. In montosis & sylvaticis Europæ borealis.

Planta integra.

LIGNUM CAMPECHIANUM. Campecheträd. *Hæmatoxylon campechianum* Lin. America calidior.

Lignum.

*LINUM. Lin. *Linum usitatissimum* Lin.

Semina.

Oleum seminibus expressum.

LIQUIRITIA vel GLYCYRRHIZA. Lakritsrot. *Glycyrrhiza glabra* Lin. Europa meridionalis.

Radix excorticata.

Succus (extractum radicis siccum). Lakrits.

*LITHAR-

Rec. Catechu
Aluminis
Ext. Ratanhiæ āā ℥j
Syrup. Aurant. qu. s. f. pil N:
LX. Sr. 4–6. p. 4 dd. (Leucorrhea
uteri vel vaginæ, blödningar, slapp
dropp el.)

#

Rec. Centaurea Minor
Folior. Aurant. āā ℥j
Summitat. hyssopi ℥j
f. Species Sr. Beskt the liee en
thekopp varmt vatten att fortna
på dagen.

#

Rec. Centaur. Minor.
Rad. Taraxaci
— Graminis
— Sapon. aa ℥β ×
× f. Species hvaraf tages 2 m. lie
℔j vatten. som inkokas lie
℔β – ½ lie. Et lavement som
behålles så länge som möjligt

Rec Ceræ flav. ℥ij
liquefacta admisce
Catechu ℥ij
Opii gr. xij
M. f. pil no LX. Sr 3 p. 3–4 dd.
(chron. diarrhe med slapphet)

#

Rp. Ceræ alb. ℥ij–iij
(modico calore liquata
adde
Pulv. Gmi arab. ℥vj
tere leni calore Mortario ferreo
semin admisquendo
Decoct. Althææ ℥viij–℔j
f. Emulsio. Sr 1 m. 1–2 t.

#

Rec. Ceræ alb. ℥j
Sacchar. ℥β
f. c. spir. conc. q. s. aliquot
pulvis Sr 1 th. 1–2 t.

Störker Mask mos.

Rec. Semin. Cinæ Levant. ℥ij
Rad. Valerian. ℥j
– Jalappæ ℨss
Sulph. Kaliq. ℥ij–℥j
pulver: admisce
Oxymell Scillæ qu. s. ut f. Elect. S: 1 th. 2-3-4 dd.

#

Rec. Semin. Cinæ Levant. ℥vj
Ferri sulphur. ℥ij
Extract. Cinchon ℥ij
Syrup. Aurant. qu. s. f. Elect. S: 1 th. 2-4 dd. (för lilla slappa barn)

#

Rec. Semin. Cinæ Levant.
Summitat. Tanaceti
Rad. Calami āā ℥ij
Tart. Kaliq. ℥iij
Oxymell. Scillæ qu. sat. f. Elect. S: 1 th. 4-6 dd. (För barn under 12 år) Vid stor slapphet och atoni tillsättes nux vomica)

#

Rec. Semin. Cinæ Levant. ℥ij-jv
Rad. Quassia. ℥j-ij
infund. per hor. ½ qu. suff. aqu. bull. ad Colat. ℥viij adde
Sulph. Kaliq ℥ij-iv
S: 1 m. 4-6 dd. (Syrup. Scillæ kan tillsättas att förstärka)

#

Rec. Semin. Cinæ Levant. gr x-xij
Nux. Vomica gr ¼-j
Rad. Rhei gr. ij-iij
Elæosacch. Valerian. gr vj-x.
M. f. pulv. S: 1 p. 3-4 dd.

*LITHARGYRIUM. Glete. Silfwerglitt. *Oxidum plumbicum* ex argenti cupellatione.

*LUPULUS vel HUMULUS. Humle. *Humulus Lupulus* LIN.
Strobili cum seminibus.

*LYCOPODIUM. Gul Richt. *Lycopodium clavatum* LIN.
Semina vel *Farina* (sporæ).

MACIS vide NUX MOSCHATA.

MAGNESIA ALBA. Magnesia. *Hydrocarbonas magnesicus.*

*MAGNESIUM NIGRUM. Brunsten. *Superoxidum manganicum nativum.* Fossile.

*MALTUM vide HORDEUM.

*MALVA. Kattost. *Malva rotundifolia* LIN. & *M. pusilla* WITH.
Folia.

MANNA ELECTA vel CALABRINA OPTIMA. *Ornus europæa* PERS. (*Fraxinus Ornus* LIN.) Europa australis, Calabria præsertim et Sicilia.
Succus, sponte vel arboris vulneratione, e trunco ramisque exsudans et in aëre induratus.

MARUM. Kattgräs. *Teucrium Marum* LIN. Suffrutex Europæ australis.
Herba florens.

MASTIX vel MASTICHE. *Pistacia Lentiscus* LIN. Arbor Orientis et Europæ australis.
Resina.

*MEL. Honing. *Apis mellifica* LIN.
Materia saccharina e nectariis florum ab apibus collecta et parata. E favis sponte stillans.

*MELILOTUS. Meloten. *Melilotus officinalis* LAM.
Herba cum floribus.

*MELISSA CITRINA. Citron-Meliß. *Melissa officinalis* LIN. Europa media & australis; apud nos culta.
Herba florens.

*MENTHA CRISPA. Krusmynta. *Mentha crispa* LIN., *cet.* (plurium Mentharum formæ crispæ, imprimis *M. sylvestris* et *M. sativæ*, cultæ et culturâ ortæ).
Herba, floribus nuper explicatis.

*MENTHA PIPERITIS. Pepparmynta. *Mentha piperita* LIN. et *M. Langii* STEUD. Anglia; apud nos culta.
Herba efflorescens.

MERCURIUS VIVUS vide HYDRARGYRUS.

*MEZEREUM. Tibast. Källerhals. *Daphne Mezereum* LIN.
Cortex trunci et radicis.

*MILLEFOLIUM. Rölleka. *Achillea Millefolium* LIN.
Summitates (corymbi) florentes.

MINIUM. Mönja. *Superoxidum plumbicum* cum *Oxido plumbico* junctum.

MOSCHUS TUNQUINENSIS vel CHINENSIS. Äkta Mysk eller Desman. *Moschus moschiferus* LIN. Alpes Asiæ mediæ, ut regni Tibetani, Chinæ.
Materia propria, folliculo sub ventre maris pone umbilicum posito inclusa. Folliculi integri, textu celluloso intersepti et moscho repleti.

*MUSCUS ISLANDICUS vide LICHEN.

MYRRHA ELECTA. *Balsamodendron Myrrha* EHRENB., *cet.* Arabia, cet.
Gummi-resina.

Rec. Cort. Cinchon. Reg. ℥β — j
Rad. Calami gr x
Pip. nigr. gr v.
f. pulv. Tr. 1/p. 2 t.
under Apyrexien att kurera ett frossrecidiv.

Rp. Cort. Cinch.# reg. ℥β
Aqu. destill. ℔ij ℥β
Acid. Sulphur. ℈j
Coque ad remanent. ℔j sub.
finem coct. adde
Rad. Calami ℥β

Rp. Cort. Cinchon.# reg. ℥β
Rad. Valerian.
Flor. Arnica aa ℥ij
inf. per hor. suff. qu. aqu. ad
Colatur. ℥xvij
Æther. spir. ℥ij
Syrupi Vitrioli. mil. Drachm. }

Rp. Cort. Cinchon.# reg. ℥ij
Semi. Cacao ℥vj
Sacchar. ℥iij
Balsam. peruvian. ℥j
Aqu. bull. qu. s. ut f. Pasta
Tr. Repos. ö tages 2 m. tri/qvat.
Mjölk (smakar bra för svaga ö chlorotiska personer.)

Rp. Cort. Cinchon# ℥j
Sal. Ammon. depur. ℥ij
coqu. c. aqu. qu. s. ad. Col. ℥viij
adde Camphor. ℈ij
Spir. Vini rectificatiss ℥j
Mr. D. Mot. brand.

Rp. Coccionella ℨj
Bicarb. Kalic ℨij
Saccha. alb. ℥j
Solve in
Aqu. destill. ℥vj
Sr. 1 th. à 1 m. 4-6 dd.

Rp. Coccionell.# ℨj
Magnes. ust. ℨß
Aquae ℥viij
M. D. S. 1 m. 11 Tages om- ... kikhosta.

Rp. Coccionell.* ℨj
Sacch. lactis ℨj
M. S. 1 th. 5 dd.

Rp. Colocynthid. pulp. ℨij
Coque c. aqu. ℔ij ad remanent. ℔j
adde Syrup. Aurant. f. Zingiber.
Sr. 1 m. 3-4 dd. Mot ... vattensot.

Rp. Colocynth.# pulp. ℨij
coque c. aqu. ℔j ad remanent. ℥viij
Colatur adde
Aether. spir. ℨij
Tra Hyoscyami ℨj
Sr 1 m. 4 dd. mot chron. hufvudvärk

Rp. Colocynth.* pulp.
Extr. Hyoscyami aa ℨß
Caryophyll. ℨj
f. c. Mucil. Gum. arab. Massa
ut. f. pil. No LX. Sr 2-4-6 p.
3-4 dd (mot chron. hufvudvärk
hjernsjukdomar)

Rp. Rad. Columbo subtil. pulv. ℥ß
coque c. aqu. ℔ij ad rem. ℥viij
D. Sine colatura
Sr. Mot chron. diarrhé

Rp. Rad. Columbo.#
Magnesia alb.
Sulph. praecipitat aa ℥ß
Aethereol. Carvi f. Foeniculi gtt. v
M. f. pulv. S. 1 th. m. o. afton
(Hämorrhojder)

Rp. Rad. Columbo.# gr XV
Magnes. alb. gr V
Rad. Rhei gr ij-iv
Elaeosacch. f. Semin. Anisi
f. pulv. 1 p. 3-4 dd. mot dyspepsi

Rp. Rad. Columbo#
— Arnica aa ℨij
coque c. aqu. ℔ij ad rem. ℥viij
Colatur adde Aeth. spir. ℨij -v.
Tra Cascarill. ℨß f. Syrup.
Vitriol ℥ij Sr. 1 m 4-6 dd.
efter febrar

Rp. Rad. Columbo.# ℨij-ℨß
Coque c. aqu. ℔j ad. rem. ℥viij
adde Mucil. Salep. ℥iv
Sr 1 th. à 1 m. 4 dd.
(Diarrhé hos barn. Aether spir. ℨij
efter långvariga, mattande Diarréer)

*MYRTILLUS. Blåbär. *Vaccinium Myrtillus* LIN.
Baccæ siccatæ.

NAPHÆ FLORES vide AURANTIUM.

*NICOTIANA vel TABACUM. Tobak. *Nicotiana Tabacum* LIN. America calidior; apud nos culta.
Folia recentia et siccata.

*NITRUM CRUDUM. Rå Salpeter. *Nitras kalicus communis.*

NUX MOSCHATA. Muskot. *Myristica moschata* LIN. Arbor Indiæ orientalis, insularum præsertim Moluccensium.
Macis (arillus). Muskotblomma.
Oleum Macis (ætheroleum arilli).
Nux (nucleus putamine liberatus).
Oleum. Muskotbalsam. E nucleis expressum.

☿NUX VOMICA. Räfkaka. *Strychnos Nux vomica* LIN. India orientalis.
Semina fructus majoris baccati.

OLEUM ANTHOS vide ROSMARINUS.

OLEUM BERGAMOTTÆ. Bergamoolja. *Citrus Bergamium* RISSO. Arbor Asiæ, in Europa australi culta.
Ætheroleum e flavedine fructus.

OLEUM CAJEPUT. Cajeputolja. *Melaleuca Cajeput* ROXB., *cet.* India orientalis.
Ætheroleum foliorum.

OLEUM CASSIÆ. Kanelolja. *Cinnamomum aromaticum* NEES. (*Laurus Cassia* AIT.) India orientalis, China.
Aetheroleum corticis & florum.

OLEUM DE CEDRO vide CITRUS.

OLEUM JECORIS ASELLI FLAVUM et FUSCUM. Gul och brun Lefwertran eller Stockfisklefwer-

tran. *Gadus Morrhua* Lin. aliæque Gadi species. Norvegia, cet.

Oleum hepatis, optimum Bergense.

OLEUM LAVENDULÆ vide LAVENDULA.

OLEUM LINI vide LINUM.

OLEUM MACIS vide NUX MOSCHATA.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ vide NUX MOSCHATA.

OLEUM OLIVARUM. Olivolja. *Olea europæa* Lin. Arbor Europæ australis aliarumque regionum calidarum, ex Asia orta.

Oleum e drupis expressum.

O. commune. Bomolja.

O. florentinum vel *provinciale.* Matolja.

OLEUM ORIGANI CRETICI. *Origanum smyrnæum* Lin., *cet.* Regio mediterranea orientalis.

Ætheroleum e spicis paratum.

OLEUM PALMÆ. Palmolja. *Elais guineensis* Jacq. Guinea; in America calida, cet. culta.

Oleum e pericarpio expressum.

OLEUM PETRÆ vide PETROLEUM.

OLEUM RICINI. Ricinolja. *Ricinus communis* Lin. Zonæ calidæ.

Oleum e seminibus expressum.

OLEUM SUCCINI CRUDUM. Bernstensolja. *Oleum empyreumaticum Succini.*

OLEUM TEREBINTHINÆ. Terpentinolja. *Pinus Pinaster* Ait. (*P. maritima* Lam.) Europa australior.

Ætheroleum crudum.

OLEUM VITRIOLI vide ACIDUM VITRIOLI.

Rec Com. Cerv. ras. ℥j
Cort. Cascarill. ℥ß
coque c. aqu. ℔ijß ad ℔j
S. förtäres på dagen (mot Dysenteri)

Rec. Creosoti gr XV.
Acet. plumbi. gr XXX.
Extract. Ratanhiæ ℥ij
Muc. G̃. arab. qu. sat. f. pil N:o LX. S. 4-6. pr 3-4 dd
(Phthisis med ovärning o illaluktande upphostning).

#

Rec Creosoti ℈j
pulv. rad. Althææ ℈iv
Muc. G̃. arab. qu. sat. ut f. pil N:o XL. S. Borjar med 1 pr. 4 dd.

*

Rec Creosoti gr. XIJ
Ol. Amygdalar. ℥j
tere c. Vitell. ovor. N:o j. f.c.
Aqu. Menth. ℥v Emulsio
S. 1 m. 3-4 dd.

#

Rec. Creosoti
Assa Foetid
G̃. Galbani ãã ℥ß
Pulv. rad. Liquiritiæ ℥ij
Syrup. Althææ qu. sat. f. pil
N:o 120. (¼ gr). S. 2.6. pr 3-4 dd.

#

Rec. Creosoti gtt X.
Ol. Crotonis gtt iv
Ol. Amygdal. ℥ij
S. 1 th. gr fastande mage

[...]ier gynnsamma öppningar följa (Mot Tænia) först ge
Dec. Fil. Maris (℥j) ℔j med Sulph. Magnes. 4 dagar

#

Rec. Creosoti gr XV.
Ol. Amygdal.
Cerati alb. ãã ℥j
M. f. Ungv.

#

Rec. Creosoti
Alkohol ãã p.
S. Tanddroppar; införas på en bit fnöske.

#

Rec. Creosoti ℥j
Spir. Frument. ℥ij
Aquæ. ℥X
S. Mot ondskorf utv.

Rec. Croci gr viij
Semin anis. vulg. ℥ß
rad. Irid. Florentin ℥iß
Rad. Liquirit. ℥ij
M:e S. 1 knifsudd. 5-6 dd.

Rcp. Piper. Cubeb. ℥j
Supertartrat. kali ℥β
Semin. anisi ʒij
Mellis f. Syrup. Juniperi q. s. f.
Elect. S. 2 th. 4-6. dd

Rcp. Pip. Cubeb. pulv. ℥j
Nitr. depurat. ʒj
Elæosacch. anisi gr x.
f. pulv. S. 4-6 p. dd.

Rcp. Pip. Cubeb. ℥j
Sacchar. ℥j
Aqu. M. piper. ℥iv
S. Omskakas väl. 1 m. 1-2 t.

Rcp. Piper. Cubeb. ℥j
Balsam. Peruvian. ʒij-iij
Mucilag. Gum. arab.
Mellis depur. āā ℥j
f. Elect. S. 1-2 th. 4-5 dd. en längre tid (mot impotens efter flytning).

Rcp. Infus. Cubeb. (℥j) ℔j
Aqu. Am. An.
S. Tre insprutning vid slapp drypel:

OLIBANUM, ol. THUS VERUM. Wirak. *Boswellia serrata* Colebr. India orientalis.

Materia resinosa, sponte vel arbore sauciata, e trunco prodiens et in aëre solidescens.

☿OPIUM LEVANTICUM seu SMYRNÆUM. *Papaver somniferum* Lin.

Succus lacteus e capsulis sauciatis stillans, concretus.

*OSSA BOVIS vel PECORUM. Oxben. *Bos Taurus* Lin.

OSSA SEPIÆ. Hwalfiskfjäll. *Sepia officinalis* Lin. In mare, præsertim mediterraneo.

Scutum dorsale.

*OVUM GALLINACEUM. Hönsägg. *Gallus domesticus* Briss.

*OXYCOCCUS. Tranbär. *Oxycoccus palustris* Pers. (*Vaccinium Oxycoccus* Lin.)

Baccæ recentes.

*PADUS. Hägg. *Prunus Padus* Lin.

Cortex ramulorum.

*PAPAVER. Wallmo. *Papaver somniferum* Lin. Ex Oriente; apud nos cultum.

Capita (capsulæ nondum maturæ, seminibus liberatæ).

Semina matura.

Succus concretus vide OPIUM.

PASSULÆ MAJORES vel UVÆ PASSÆ. Rußin. *Vitis vinifera* Lin. Frutex sarmentosus ex Oriente introductus, ab antiquissimis temporibus in Europa media & australi, cet. cultus.

Baccæ maturæ siccatæ.

PASSULÆ MINORES vel CORINTHIACÆ. Korinter. *Vitis vinifera* var. *apyrena* LIN. Frutex sarmentosus, in insulis maris Ægei cultus.

Baccæ maturæ siccatæ.

PECHURIM FABA. Kryddböna. *Ocotea Puchury major* MART. (*Nectandra* NEES.) America calida, præsertim Brasilia.

Cotyledones majores.

PETROLEUM vel OLEUM PETRÆ. Bergolja. *Æther-oleum nativum.* Fossile Asiæ, Europæ.

*PETROSELINUM. Persilja. *Petroselinum sativum* HOFFM. (*Apium Petroselinum* LIN.) Europa australis; apud nos cultum.

Semina (achenia).

*PHELLANDRIUM. Stäkra. *Phellandrium aquaticum* LIN.

Semina (achenia).

☿ PHOSPHORUS. Fosfor.

PIGMENTUM INDICUM vide INDIGO.

*PIMPINELLA. *Pimpinella Saxifraga* LIN.

Radix.

*PINUS. Tall. *Pinus sylvestris* LIN.

Turiones (ramuli nondum explicati). Tallstrunt. Primo vere colligendi.

Colophonium
Pix
Resina flava
Terebinthina communis } vide suis locis.

PIPER ALBUM. Hwitpeppar. *Piper nigrum* LIN. India orientalis.

Semina matura, pulpâ remotâ.

Rec. Fol. Digital. gr j
Rad. Ipecac. gr j–ij
Acet. Plumbic. gr ij–iv.
Sacchar. alb. gr x.
Mr. f. pulv. Dr. 1 jo. tw ½–1–2 t.
mot bladsp. ati nuig efter som den är bef-
tig o med hosty snygellanden pull.
Nitr (gr x–xv) kan äfven tillsättas
fjunken pulsen hastyt så upphöres:

#
Rec. Pulv. Fol. Digital
— Scillæ āā ℈j
Terebinth. Venetæ ʒj
Extract. Trifol. Aquat. ʒj
Rad. Althææ qu. sat. ut. f. pil.
Dr: LX. Dr. 3–4. p. 3–4 dd. (Diuret.)

#
Rec. Fol. Digitalis ʒij
coqu. c. aqu. ℔ij ad ℥vj
Colat. adde
Oxymell. Scillæ ℥ij
Tartar. Boraxat. ℥ß
Æther. nitr. spir. ʒij
Dr. 1–2 m. 4–6 dd. (Diuretic)

#
Rec. Fol. Digital gr xij–xxiv
Sacchar. alb. ʒj
M. f. pulv. subtilissimus. Dr. in pul.
Aequal N: XIJ Dr. Morfvi: flugen ed
morgon och afton –

#
Rec. Fol. Digital ʒj
Ungv. hydrargyr. ʒj
m. f. Ungr. Eller ock att koka
med axungia.

Rec. Stipit. Dulcamar.
Rad. Bardanæ āā ʒj
Ligni Guajaci
Rad. Liquiritiæ āā ℥ß
coqu. c. aqu. ℔iij ad rem. ℔ij
Förtäres om möjligt på dagen sputs
glas tals –

#
Rec. Decoct. Stip. Dulcam (℥ß) ℥vj
Tartr. Kalic. ʒij
Vin. Stib. gtt. LX.
Syrup. Liquirit. ʒj
Hufelands Brostdroppar (Bronchit. chron.)

Rec. Elaterii albi gr j
Extr. Hyoscyami gr XXIV
Pulv. Rad. Althææ qu. s. ut. f.
pil aequal. N: XXIV. Dr. 1 p. 2–3 dd.
(Hus)

#
Rec. Elaterii albi gr iij
solut. in Æth. nitric. spir. ʒij
Tr. Scillæ
Oxymell. Scillæ āā ℥ß
Dr. 40–60–100 dr. 3. 4. dd.

Rec. Rad. Enulæ ℥β
coqu. c. aqu. ubi ad ℥viij
Colat. adde Sal. Ammon. ʒij
Syrup. Senegæ ℥ij
Extr. Liquir. (ʒij–iv)
S: 2 m. 2-3t (Expectorans efter febrar. Pneumoni. chron. Katarr)

Rec. Euphorbii ʒiij
Maschikes ʒj
Colofonii ʒiij
M. f. pulv. d. s. Strös på kompress fuktas med konjak o omlägges det sjuka stället vid Tumor alb. Genu.

PIPER HISPANICUM vel INDICUM. Spansk Peppar. *Capsicum annuum* LIN. America calida, India; in Europa cultum.

Baccæ submaturæ, siccatæ.

PIPER JAMAICENSE. Kryddpeppar. Piment. *Eugenia Pimenta* DE CAND. (*Myrtus Pimenta* LIN.) India occidentalis.

Baccæ nondum maturæ, siccatæ.

*PIX. *Pinus sylvestris* LIN.

P. liquida. Tjära.

P. solida vel *sicca.* Beck.

*PLUMBUM LAMINATUM. Walsadt Bly.

*POLYPODIUM. Stensöta. *Polypodium vulgare* LIN.

Radix.

*POMA ACIDULA. Sura Äpplen. *Pyrus Malus* LIN.

Fructus recens arboris cultæ.

*POTASSA CALCINATA vel ALKALI VEGETABILE FIXUM IMPURUM. Pottaska. *Carbonas kalicus communis.*

PYRETHRUM. Bertramsrot. *Anacyclus Pyrethrum* SCHRAD. Regio mediterranea; varietas in Thuringia culta.

Radix.

QUASSIA. *Quassia amara* LIN. et *Simaruba excelsa* DE CAND. Hæc Surinamensis, illa Jamaicensis.

Lignum.

*QUERCUS. Ek. *Quercus Robur* LIN.

Cortex trunci, parte exteriori remotâ.

Glandes. Ollon. Decorticatæ, siccatæ.

*RANUNCULUS ALBUS. Hwitsippa. *Anemone nemorosa* LIN.

Herba recens cum floribus.

RATANHIA. *Krameria triandra* RUIZ et PAV., *cet.* Peruvia.

Radix.

Extractum, origine incertum.

REGULUS ANTIMONII vide STIBIUM.

RESINA ELASTICA. Kautschuk. *Siphonia elastica* PERS., *cet.* America calida, Brasilia, Guyana, cet.

Materia propria, emulsionis formâ ex arbore vulnerata effluens, in aëre demum solidescens. Lagenæformis eligenda.

RESINA FLAVA. Ljust Harts. *Pini* species, præsertim *P. Pinaster* AIT.

Resina e balsamo nativo parata.

RHEUM vel RHABARBARUM INDICUM vel CHINENSE. Indisk eller Chinesisk Rabarber. *Rhei* species nondum satis notæ (*Rh. palmatum* LIN.? *Rh. australe* DON?, *cet.*). Montes altiores Asiæ mediæ, Regni Tibetani, China, cet.

Radix mundata.

*RIBES NIGRUM. Swarta Winbär. *Ribes nigrum* LIN.

Folia tenera.

Baccæ recentes, et conditæ calycibus liberatæ.

*RIBES RUBRUM. Röda Winbär. *Ribes rubrum* LIN.

Baccæ recentes.

RICINUS vide OLEUM RICINI.

*ROSA DOMESTICA vel PURPUREA. Ättikrosor. *Rosa gallica* LIN. Frutex Europæ australioris, apud nos cultus.

Petala, ante perfectam explicationem collecta, unguibus resectis.

Rec. Rad. Filic. Maris ℥ß
Aqu. Menth. Piper. ℥iij
Syrup. Aurantii ℥j
Ætheris Spirit. ℥ß
S. Omskakas och tages på en gång
Drucknes följande morgon.

#
Rec. Rad. Filic. Maris ℥ß
Semin. Anis
— Tanaceti āā ℥ß
Rad. Jalappæ ℥j
f. c. suff. quant. Mellis Elect.
S. 2 Th. 4-6 dd. eller mera om det fördrages –

#
Rec. Rad. Filic. Maris ℥j–ij
coqu. c. aqu. ℔ijß ad ℔j
adde Sulphat. Kalic. ℥j
Æther. spirit. ℥j
S. Förtäres på dagen [illegible]

Rec. Fulig. splend.
Axungiæ curat. āā ℥ij
coqu. leni igne per hor. vj f. Unguent
S. Salva till påstrykning i utslag
i sjukdomar och orena sår

#
Rec. Fulig. splend. ℥j–ij
coqu. per hor. ½ c. suff. quant. aqu.
ad Colatur ℔j
S. Skabbvatten.

#
Rec. Fulig. splend.
Axungiæ āā ℥ß
Extract. Belladonn. ℥j
f. Ungv. S. mot Smärtande sår
i kräftaktigt utslag.

#
Rec. Fulig. splend. ℥ß.
Carbon. Ligni
Sulph. sublim. āā ℥j
Cort. Cinchon. ℥ß
f. c. Axungiæ suff. quant. Ungv.
S. Ingnides morgon o afton mot
Tinea capitis (favosa) sedan
rufvorna blifvit aflossade.

Rec. Rad. Galangæ
Fol. aurantii āā ℥ij
Fol. Trifol. Aquat. / Card.
Bened. / Quassia ℥ij
inf. per hor ½ c. suff. quant. Aqu. ad.
Colatur ℥viij
S. 1 m. 3–4. dd. / Hertin kan läggas
Aqu. Amygd. Am. ℥ij / bicarb.
Kalici ℥ij / Syrup. aurantii /

#

Rec. Rad. Galangæ ℈j
Cardam. min. gr v–x
Sacchar.
f. pulv. S. 1 p. 2 t. under apyrix.
(först tages mit. brännvin. Vi
äfven godt mot atoni i tarmarne)

#

Rec. Rad. Galangæ ℥ij
Extract. Rhei ℥j
Aloës lucid ℈j.
M. f. c. suff. quant. Extr. Taraxaci
Massa ex qua form. pil No 120.
S. 4–6 p. 2–3 dd.

Rec. Galbani
Extr. Dulcamar.
Rad. Liquir āā ℥ij
Extr. Conii spirit. ℈j
f. pil No 120. S. 4–6–8 p. 3–4 dd.
att befordra upphostning Huss.

*ROSA MULTIPLEX vel INCARNATA. Dubbla Törnrosor. *Rosa centifolia* LIN. Frutex in Europa ubique cultus.

Petala recentia vel salita.

ROSMARINUS. Rosmarin. *Rosmarinus officinalis* LIN. Europa australis.

Folia.

Oleum Anthos (ætheroleum).

*ROSMARINUS SYLVESTRIS vel LEDUM. Squattram. Getpors. *Ledum palustre* LIN.

Summitates florentes (flores cum foliis).

*RUBUS IDÆUS. Hallon. *Rubus idæus* LIN.

Baccæ recentes.

SABADILLA. Sabadill. Husarkrö. *Sabadilla officinalis* BRANDT, *cet.* Planta Mexicana.

Semina capsulis inclusa.

SABINA. Säfwenbom. *Juniperus Sabina* LIN. Europa australis.

Ramuli tenerrimi.

SACCHARUM. Socker. *Saccharum officinarum* LIN. ex India orientali, nunc in omnibus fere regionibus calidis cultum, et *Beta vulgaris* LIN. var. *saccharina.*

Saccharum album. Raffineradt Socker.

Saccharum candum. Bröstsocker.

SACCHARUM LACTIS vide LAC.

SACCHARUM SATURNI. Blysocker. *Acetas plumbicus communis.*

SAL ACETOSELLÆ. Harsyresalt. Bläckpulwer. *Bioxalas kalicus.*

SAL AMMONIACUM DEPURATUM. Salmiak. *Chloretum ammonicum.*

SAL CATHARTICUM vel ANGLICUM vel SEDLICENSE. Bittersalt. Engelskt Salt. *Sulphas magnesicus.*

SAL COMMUNE vel CULINARE. Koksalt. *Chlóretum natricum.*

SAL ESSENTIALE TARTARI vide ACIDUM TARTARICUM.

SAL GLAUBERI vel ALKALI MINERALE VITRIOLATUM. Glaubersalt. *Sulphas natricus.*

SAL SUCCINI vide ACIDUM SUCCINICUM.

SAL VOLATILE vide AMMONIACUM CARBONICUM.

SALEB. *Orchidis* species, præsertim orientales; ex Europæis *O. Morio* LIN., *O. mascula* LIN., *cet.*
Radix (tubera).

*SALIX. Jolster. *Salix pentandra* LIN.
Cortex ramulorum.

*SALVIA. *Salvia officinalis* LIN. Suffrutex Europæ australis, apud nos cultus.
Folia.

*SAMBUCUS. Fläder. *Sambucus nigra* LIN.
Flores (cymæ florentes).
Baccæ recentes.

SANGUIS DRACONIS. Drakblod. *Calamus Draco* LIN., *cet.* India orientalis, Sumatra præsertim.
Resina e fructibus squamulosis sponte exsudans.
In lacrymis vel baculis.

SANTALUM RUBRUM. Rödt Sandelträd. *Pterocarpus Santalinus* LIN. FIL. India orientalis.
Lignum.

SANTONICUM vide CINA.

SAPO ALBUS HISPANICUS vel DURUS ALICANTINUS. Silkestwål. *Sapo natricus* ex Oleo Olivarum.

Rec Gallar. Turciç ℨß
coqu. c. aqu. Lbj ad ℨviij
Colatur. adde Aluminis ℨj
Tr. aromatic ℨß
Fr 1-2 m. (Mot. chron. diarrhe o slemflåden - för Alun kan hiv sättas
Tr. Ratanhiae ℨß + T. opii ℨj).

#

Rec. Gallar. Turciç gr x.
Cretæ præp. gr xv.
Opii gr ¼ - j
Gmi arab. gr x
M. f pulv. Sr. 1 p. 2-3 t. vid diarrhé

#

Rec. Dec. Gallar (ℨj) Lbj (ij)
Sr. 1 sprutglas hv. ½ - ¾ t. med förs. efter.

#

Rec. Pulv. Gallar. Turciç ℨj
Axungiæ curat. ℨij
Opii pulv. ℨß
f. Ungv. Sr. Att morgon och afton stryka så mycket som en ärt på verkande hemorrhoj. knuggar (vid smärtor - i anus tillsätter Ext. Belladonnæ ℨj)

Rx. Rad. Graminis
— Taraxaci āā ℥j
coqu. c. Aqu. libis ad ℔j
adde Tartr. kalic. ℥ß
(Extr. Taraxaci)
Förtöres på dagen.
#
Rx. Extr. Taraxaci
Mellaginis
Tartr. kalic. āā ℥j
Mot. Ikterus

Rx. Graphit. ℥j
Mellis ℥ii
M. f. Elect. 1 th. 2-3 dd.
#
Rx. Graphit. (℥vj)
Extr. Dulcamar. āā ℥j (℥ij)
(Syrup. Juniperi q.s. ut f. pill. ponderis 8 aliq)
f. pil. pond. gr ij. S. 6-8-10 p. pd.
#
Rx. Graphit. ℥j
Syrup. Aurant. q. sat.
f. Pil. pond. gr ij. S. 10 p. pd.
#
Rx. Graphit. ℥vj
Axungiae ℥j
M. f. Ung. Ingnides på mindre ytor: sänder och allt som huden blir röd går man vidare
#
Rx. Graphit.
Sulph. sublim. aa
Axungiae q. s.

#
Rx. Graphit. ℥j
Empl. Sapon. ℥j
Psoriasis

SAPO E BUTYRO vel AD OPODELDOC. Smörtwål.

*SAPO MOLLIS NIGER vel VIRIDIS. Grön Såpa. *Sapo kalicus* ex Oleo seminum Cannabis et sevo.

*SAPONARIA. Såpört. *Saponaria officinalis* LIN. Europa media et australis; apud nos plerumque culta.

Radix.

SARSAPARILLA. Sarsaparill. *Smilacis* species (*S. medica* SCHLECHT., *S. syphilitica* HUMB., *S. officinalis* KUNTH, *cet.*). America media.

Radix. De Honduras eligenda.

SASSAFRAS. *Sassafras officinalis* NEES. (*Laurus Sassafras* LIN.) America septentrionalis.

Radix cum cortice.

SCAMMONIUM ALEPPENSE. *Convolvulus Scammonia* LIN. Asia media, Syria.

Succus lacteus radicis sauciatæ concretus.

SCILLA. Sjölök. *Scilla maritima* LIN. In maritimis regionis mediterraneæ.

Radix (squamæ bulbi).

*SCORDIUM. Gamander. *Teucrium Scordium* LIN. In Europa media et australi frequens, apud nos rarius.

Herba.

*SECALE. Råg. *Secale cereale* LIN.

Farina seminum subtilissima. Rågmjöl.

*SECALE CORNUTUM. Mjölöka. Mjöldryga. *Spermoedia Clavus* FRIES.

Semina secalis fungoso-morbosa, ante perfectam maturitatem e spicis in agro colligenda.

*SEDUM ACRE. Fetknopp. Hällegräs. *Sedum acre* LIN.

Herba recens.

SENEGA. *Polygala Senega* LIN. America borealis, Virginia imprimis et Pensylvania.
Radix.

SENNA sic dicta ALEXANDRINA. Alexandrinska Sennetsblad. *Cassia acutifolia* DELILE (*C. Senna* var. *α* LIN.) et *C. obovata* COLLAD. Ægyptus, Nubia, cet.
Foliola utriusque plantæ ita mixta, ut præponderat C. acutifolia.

SERPENTARIA VIRGINIANA. *Aristolochia Serpentaria* LIN., *cet.* America borealis, præsertim Virginia.
Radix.

*SEVUM BUBULUM. Oxtalg. *Bos Taurus* LIN.

*SEVUM HIRCINUM. Bocktalg. *Capra Hircus* LIN.

*SEVUM OVILLUM. Fårtalg. *Ovis Aries* LIN.

SIMARUBA. *Simaruba officinalis* DE CAND. America meridionalis calida, Cayenne.
Cortex.

*SINAPIS ALBA. Hwit Senap. *Sinapis alba* LIN. Europa media; apud nos culta.
Semina.

*SINAPIS NIGRA. Swart Senap. *Sinapis nigra* LIN.
Semina.

SODA DEPURATA. Renad Soda. Kolsyradt Natron. *Carbonas natricus crystallisatus.*

SPATHUM PONDEROSUM. Tungspat. *Sulphas baryticus nativus.* Fossile.

SPERMA CETI vel CETACEUM. Hwalrat. *Physeter macrocephalus* LIN. In Oceano Atlantico.
Pinguedinis pars solidescens, in propriis loculamentis sub cute capitis et dorsi contentæ.

*SPIRI-

Rec. Extract. Gratiolæ ʒj
Gmi Galbani ʒiβ
Sapon. Natr. dior. ʒij
f. pil N: 120 Sr 6-8-10 p. 2-3 dd.

Rec Extr. Gratiolæ ʒβ #
— Belladonn. gr v
Aqu. Amygd. Aman. conc ʒβ
Sr 20-30 dr. p. d. (Omokakos) Epilepsi / Hufeland /.

Rec. Hbæ Gratiolæ gr iv #
Rad. Rhei gr vj
— Belladonn. gr ½ - ij
Sacchar. gr x.
f. pulv. Sr 1 p. 2-3 dd (Epilepsi)

Rec. Resin Guajaci ʒj
Aloës lucid gr x.
Ferri pulv. ʒβ
Syrup. Aurant. q. s. ut f. pil
N: XXX. Sr 3-6 p. i under (Hæmorrhojder med förstopp.)

Rec. Resin. Guajaci #
Extr. Trifol. aa ʒj
Aloës gr. xij
Extr. Nuc. Vomic. gr vj
f. pil N. 60. Sr 3-4 p. dd.
Dyspepsi

Rec. Gummi Ammon. ℨij
Vitell. ovor. N:j
Aqu. Anisi ℥v
Liqu. Ammon. Anis. ℨj-i6[illegible]
f. Aqu. Am. Amar. conc. ℨij j.
Syrup. Senega ℥j
J. Emulsio Sr 1 m 4-6 dd.
(Lomkakal [illegible] [illegible] [illegible])
#
Rec. Gmi Ammon.
Myrrhae aa ℨj
Ol. Anisi gtt xv.
Syrup. Scillae q.s. f pil
N: 60. Sr 4-8 p. dd.
#
Rec. G. ammon + Subcarb Kal. dep aa ℨjβ
Bd. bor. insp + Extr. Gentian aa ℨij
M. f. l. a. pill pond gr ij Dr Losande
piller att taga 6-7 morg aft.
#
Rec. G. ammon + Rad. Rhei + Sapon
amygdal + Extr. Tarax aa ℨj. Mr
ft. a pill gr ij Sr 15 st. 3 dd.
#
Rec. G. ammon + Asa foetid + Sapon amygdalin + Extr. Tarax aa ℨj Hydrarg.
stib c. sulph. ℨj M f l a pill gr ij Sr
10 st 3 g. dd.

*SPIRITUS FRUMENTI. Bränwin. Pond. spec. = 0.94.

SPIRITUS VINI GALLICUS. Franskt Bränwin. Pond. spec. = 0.933.

SPONGIA MARINA. Badswamp. *Spongia officinalis* LIN. Mare mediterraneum.
Pars fibroso-cellulosa, materiâ carnosâ remotâ.

STANNUM MALACCENSE. Malacca Tenn.

STAPHISAGRIA. Staffansfrö. *Delphinium Staphisagria* LIN. Europa australis.
Semina.

STIBIUM METALLICUM. Antimon-metall.

*☿ STRAMONIUM. Spikklubbsört. *Datura Stramonium* LIN. Europa media, cet.; apud nos plerumque culta.
Folia.
Semina.

STYRAX CALAMITUS. Storax. *Styrax officinalis* LIN. Frutex vel arbuscula præsertim Orientis.
Resina e trunco inciso prodiens.

SUCCINUM FLAVUM. Bernsten. Litora maris Baltici, cet., imprimis Borussiæ.
Resina fossilis.

*SULPHUR. Swafwel.
Sulphur citrinum. Stångswafwel.
Flores Sulphuris. Swafwelblomma. Sulphur sublimatum.

*TABACUM vide NICOTIANA.

TAMARINDUS ORIENTALIS. Ostindinsk Tamarind. *Tamarindus indica* LIN. var. *orientalis.* India orientalis.
Pulpa e lomentis deprompta, seminibus et fibris sæpius mixta.

*TANACETUM. Renfana. *Tanacetum vulgare* Lin.
Summitates (corymbi) florentes.

*TARAXACUM. Maskros. *Leontodon Taraxacum* Lin.
Radix recens et siccata.

TARTARUS CRUDUS. Winsten. *Bitartras kalicus communis.*

TARTARUS DEPURATUS vel CRYSTALLI TARTARI. *Bitartras kalicus depuratus.*

TEREBINTHINA COMMUNIS. Tjock Terpentin. *Pini* species, præsertim *P. Pinaster* Ait. (vide OLEUM TEREBINTHINÆ).
Balsamum sponte, vel incisionibus factis, e truncis exsudans.

TEREBINTHINA VENETA vel LARICINA. Venedisk Terpentin. *Pinus Larix* Lin. Arbor Europæ australioris, cet., apud nos culta.
Balsamum vel sponte vel ex arbore vulnerata prodiens.

TERRA JAPONICA vide CATECHU.

*TESTÆ OSTREARUM. Ostronskal. *Ostrea edulis* Lin.
Valvæ conchæ.

*THYMUS. Timjam. *Thymus vulgaris* Lin. Europa australis; apud nos cultus.
Herba efflorescens.

☿TIGLIUM vide GRANA TIGLII.

*TILIA. Lind. *Tilia europæa* Lin.
Flores (cymæ florentes cum bracteis).

*TORMENTILLA. Blodrot. *Tormentilla erecta* Lin.
Radix.

TRAGACANTHA ELECTA. Fin Dragant. *Astragali* species (*A. verus* Oliv., *A. gummifer* Labill.,

Rec. Hellebori albi ℈j
Aqu. c. aqu. f. acet. ℥vj
ad reman. ℥v. cola et adde
Sacchar. ℥j
Sr. 1 m. i nagot thee.

#

Rec. Veratrini gr ij
Rad. Liquir. gr xij
Extr. Hyoscyami gr vj
f. pil N: XXIV.
Sr 1 p. 3 t.

#

Rec. Veratrini gr j - iv -
Axungiæ ℥j
f. ungr. Ingnides pa mycket som
en nöt trag. dd tills stickningar
uppkomma
Irritatio Spinalis

#

Rec. Veratrini gr ij . iv
solv. i acid acet. q. s.
Axungiæ ℥j
f. Ungr. Sr lika med föregaende

+

Rec. Veratrini. gr iv - viij
Æther. Sulf. ℥j
Spir. conc. ℥iij
Ingnides pa huden i neuralgia
faciei

#

Rec. Veratrini ℈j
rad. Irid. Florent. ℥j
F. oryzæ ℥iß
Æther. ungued. gtt X
Nysspulver.

Rec. Semin. Hyoscyami ℈j
Amygdal. excort. ℥iß
Mr terendo c.
Aqu. flor. Tiliæ f. Aurant. ℥vj
M. f. Emulsio S. 1 ½ - 1 - 2 t. skedblad

Rec. Hbæ Jaceæ pulv.
Sacch. lactis āā ℨij
Sulph. praecip.
Magnes. Carbon. āā ℈β
S. ℥ii Kaffeelöffel (?) 3t.
(Crusta lactea)

Rec. Pigm. ind. pulv. ℈j
Rad. Calami
pulv. Aromat. āā gr X
S. 1 p. 4-6 dd.

#

Rec. Pigm. ind. ℈β
pulv. Aromat. ℈j
Syrup. Zingiberis qu. s.
ut f. Elect. S. 1 Kl. 4-6 dd.

#

Rec. Pigm. ind. pulv. ℈iv
Asae foetid. ℈ij
Castor. angl. ℈j
Mucilag. Gm̄i arab. qu. sat.
f. Boli N° 20. S. 1 Bol. 1 t.
oder 2-3 b. 4-6 dd.

A. creticus Lin.) Asia minor, Persia, Syria, Græcia, cet.

Materia mucosa e trunco fruticuli sponte prodiens.

*TRIFOLIUM AQUATICUM. Wattenklöfwer. *Menyanthes trifoliata* Lin.

Folia.

*TRITICUM. Hwete. *Triticum vulgare* Vill.

Farina seminum. Hwetemjöl.

Amylum vide suo loco.

*TUSSILAGO. Häſthof. *Tussilago Farfara* Lin.

Folia.

*VALERIANA MINOR. Wändelrot. *Valeriana officinalis* Lin.

Radix locis siccioribus e varietate minori colligenda et illota siccanda.

VANILLA. Wanilj. *Vanilla aromatica* Swartz. India occidentalis, Mexico.

Siliqua (capsula) nondum matura.

*VERBASCUM. Kungsljus. *Verbascum Thapsus* Lin., *V. thapsiforme* Schrad. et *V. phlomoides* Lin.

Flores (corollæ).

VINUM. Win. *Vitis vinifera* Lin. Frutex sarmentosus, in zonis mitioribus ubique cultus.

Succus baccarum fermentatus.

Vinum gallicum album. Gammalt hwitt Franſkt Win.

Vinum gallicum rubrum. Bordeaux-Win.

Vinum de Malaga. Malaga-Win.

Vinum de Oporto. Port-Win.

Vinum Rhenanum. Rhenſkt Win.

Vinum de Xeres. Xeres-Win.

*VIOLA TRICOLOR vel HERBA JACEÆ. Styfmorsblomma. *Viola tricolor* LIN.
Herba cum floribus.

VIRIDE ÆRIS vide ÆRUGO.

*VITIS IDÆA. Lingon. *Vaccinium Vitis idæa* LIN.
Baccæ conditæ et baccæ aquâ servatæ.

VITRIOLUM DE CYPRO vel CUPRI. Kopparvitriol.
Sulphas cupricus.

*ULMUS. Alm. *Ulmus campestris* LIN.
Cortex interior (liber).

*UVA URSI. Mjölonris. *Arbutus Uva ursi* LIN.
Folia.

ZEDOARIA. Sittwer. *Curcuma Zedoaria* ROSC.
India orientalis.
Radix.

ZINCUM. Zink.

ZINGIBER. Ingefära. *Zingiber officinale* ROSC.
In India orientali spontaneum, in India occidentali cultum.
Radix depurata (R. Zingiberis alba).
Radix condita (Conditum Zingiberis).



Rep. Rad. Ipecacuanh. ℈ij
Aqu. ℥iv
Ms. tr. 1 m. 10 min hvar verkan följer
(Emot för retl.)

#

Rep. Ipecacuanh. gr xv
Tartar. Antimon gr ij
Ms tr. Emetic. laxans.

#

Rp. Ipecacuanh. gr. XV.
Sulphat. Cupri gr V.
Ms. tr. Att hastigt tömma bronchierna

#

Rep. Ipecacuanh. gr XV.
Camphor. gr. ij

Dos. refr. gr ¼ - ½.
Inf. Ipec. (℈j) ℥viij
+ Salm. om tungan är tjock
+ Syrup. ℥ij - iij om tungan är ren.

#

Rep. Ipecac. gr ¼ - ½.
Acet. Plumbic. gr j
Cort. Cinnamon. gr ij - iv
E. Opii gr ¼.
Saccha. gr X.
S. 1 p. 10 - 5 minut hvar verka följa mot blödingar från bronchierna

#

Rep. Infus. Ipecacuanhæ.
Syrupi Vitrioli
Tr. Thebaic.
S. Lifmoders blödningar.

#

Rep. Ipecac. gr ½.
Magist. Bismuth. gr iv - x.
Ext. Hyoscyami gr ij
Elaeosacchar. Carvi gr vj
S. 4 p. dd. Cardialgi

Rep. Ipecacuanh. gr ½.
Oxid. Zinci gr ij - iv.
Lactucar. gr ij
Sacchar. gr X.
S. 4 p. dd. nervös hjertklappning Cardialgia Spasmadica

Rp. Jodi gr. XXX-L-LX.
Spir. Vini rectif ℥j
Sr. Jodtinctur

Rp. Jodi ℈ij #
Jodet. kalii. ℈iv
Sr. Blandas hiis bad.

dos gr. 1/8 - 1/2 ; pilleform #

Rp. Jodi gr j - ij
Jodet. Kalii gr XV-XXX
Aquæ Menth. ℥viij
Sr. 1m. 4. dd. (1 tk at barn.)

Rp. Jodi ℈j # - (℈j ?) ?
Jodet. kalii ℈ij
Spirit rectific ℥iij
Mr. Sr. 10-20-30 dr. 3 dd.

Rp. Jodi gr vj #
solv. in
Aeth. sulphur. ℥j
Ms. 5-10 dr. 3 dd.

Rp. Jodi gr j #
Rad. Liquir. f. Althea ℈j
Mucilag. G[m] arab. qu. s. ut. f pil
No viij Sr. 1p. 2-3. dd.

Rp. Jodi gr vj #
Jodet. Kalii ℈j - ℈ij
Axungiæ ℥j
M. f. ung. Sr. Til ingnidning 2 ggr dd.

Rp. Jodi gr iij #
Ungt. Hydrarg. f. Empl. Hydrarg ℥j

Rp. Jodi gr vj #
Jodet. Kalii gr X.
Empl. Sapon. ℥j
Sr. pro Mamma mm.

PHARMACA PRÆPARANDA.



Acetas Cupricus.
Motgift. kräkning med Ipecacuanh. el. laxans ägghvita, vispad med Sockervatten. Sockervatten i stora qvantiteter. I brist deraf mjölk, buljong, mandelmjölk, matolja

Rec. Acet. Cupric. gr XX
solv. in
Aqua destill. qv. s.
adde
Rad. Althea qu. sat. ut fiat Pil
No XL S. 1 p. 4 ggr. d.d.

#

Rec. Acet. cupric. gr iv
Rad. Ipecacuanha gr XVj
Mx. S. på en gång

Ögonvatten

Rec. Acet. cupric. gr iv
s. in
Aqua. Rosar ℥vj
adde
Tinct. Opii Crocat. ℨiß
Mx. S. Ögonen badas 2-3 ggr om dagen vid granul. etc.

Acetas Kalicus
Rec. Acet. kalic ℥ij
Rad. Rhei ℨiß
Mellis qu. s. f. Electuar.
S. En theskedl (större f. mindre) 2-3 d.d.
(För Scrofulösa barn)

#

Rec. Acet. kalic
Extract. Taraxac.
Syrup. Juniperi aa ℥j
Mx. S. för äldre godt lösande medel Theskedtals.

#

Mixt. diuretica f. diaphoretica
Rec. Acet. kalic ℥j
solv. in
Aqua Petroselin.
— Sambuci aa ℥ij
adde
Syrup. Juniperi ℥ij
S. 4-6. m. d. d.
(kan tillsättas Ox. Scill. T. digital etc)

Acetas Morfiicus.
lösning
Rp. Acet. Morphici gr iv
Acid. Acet. dilut. gtt. iv
Aqua destill. ℥iv
Ds. 5–30 drop. p.d.
Obs 60 dr. = gr j. Ibland tillsättas några droppar gumit.

Pillerform
Rp. Acet. Morphici gr ij
solv in Aqua dest. qv. sat.
adde
Rad. Althea ℈j
Syrup. Althea qu. sat. ut fiat pil. aequal. N: XXXij.
Ds. 1–4 piller p.d. efter den olika verkan, som åsyftas
obs. hvje piller = gr 1/16.

Pulverform
Rp. Acet. Morphici gr j
Sal. C.C. ℈j – ij
Sacchar. ℈j
divide in partes aequal. in f. viij
Ds. Eti i sender till natten.
Tillsatsen af S.C.C. förstärker dess sedativa verkan och minskar den narkotiska särdeles hos mycket retliga personer
#
Rp. Acet. Morphici gr ij
Sach ℈ij
M.f. pulv. subtilissimus. Divid. in part. aequal. iv f. viij Ds. Tiu
Insprutning
#
Rp. Acet. Morphici gr 1/6–j
solv. in
Acid. acet. dilut gtt jv.
adde
Decoct. Althea ℥ij
Ds. till ljumt Lavement.

Smärtstill. Salva.
Rp. Acet. Morphic. gr 1/6–j
solv. in
acid. acet. dilut gtt jv /. qus.
add.
Axungia curat. ℥j
M.f. Ungv. Ds ij inguider. i sender 1–2 dd.
Förenas med Ungv. Hydr. då man vill fördela verkande inducerande Körtlar: Gumskor på halsen: Mamma.

Plåster
Rp. Acet. Morphici gr jv
Emplast. Hydrargyr.
— f. Saponis
— f. Hjarneri ℥ß
Vid Neuralgier tillsättes Extr. Belladonna gr X–XX.

ACETAS CUPRICUS. Ed. stap. 47

Aerugo crystallisata.

Ærugo, in pulverem redacta, *Acido acetico diluto*, *Aquæ destillatæ* sufficientem copiam addendo, solvitur. Solutum, per chartam colatum, additâ parvâ *Acidi acetici diluti* quantitate, leni calore vaporat, ut eliciantur crystalli, quæ, inter chartæ plagulas siccatæ, in vase probe clauso ad usum servantur.

ACETAS KALICUS. p. 47

Alkali vegetabile acetatum vel Terra foliata Tartari.

Acido acetico diluto in vase vitreo capaci per vices admiscetur *Carbonatis kalici depurati*, quantum ad saturationem requiritur. Liquor hinc oriundus, in vase fictili vel porcellaneo vaporando ad dimidium consumptus, per chartam colatur et, addito *Acido acetico diluto*, acidus redditur; quo facto, inter continuam cum baculo vitreo agitationem, balnei vaporis calore iterum evaporat, donec exsiccetur. Sal concretus in vas vitreum, probe siccum et bene obturandum, statim ingeritur.

ACETAS MORPHICUS. ☿

Morphina, in pulverem redacta, *Acido acetico diluto* solvitur, et solutio colata in vase, magnam

superficiem præbente, ad temperaturam + 40 — 50° C., ad siccum usque evaporat. Massa crystallina in vase vitreo, bene clauso asservatur.

Ed. 8. p. 47

ACETAS PLUMBICUS.

Saccharum Saturni purificatum.

Sacchari Saturni pars una
in *Aquæ destillatæ* partibus duabus
solvitur. Liquidum per chartam colatur et loco tepido, admixtâ *Acidi acetici diluti* parvâ copiâ, ut crystallos demittat, seponitur. E liquido remanente, iteratâ vaporatione ad dimidium consumpto, eodem modo crystalli formantur. Acetas plumbicus, hoc modo purificatus, chartâ bibulâ siccatur et, ne fatiscat, in vitro clauso servatur.

☿ ACETAS STRYCHNICUS.

E *Strychnina* pulverata [addito aqua destillata] paratur, ut de Acetate morphico præscriptum est; atque eodem modo servatur.

ACETA MEDICATA.

Parantur macerando per præscriptum temporis spatium, humorem deinde exprimendo et, post subsidentiam, per chartam colando. In lagenis vitreis in cella asservantur.

Omnis maceratio ad temperaturam ordinariam fit, interdum agitando vel ipsum vas vel substantias, quæ in eo continentur.

ACETUM AROMATICUM.

Acetum prophylacticum.

Rec. *Caryophyllorum* contusorum drachmam, . . p. 1.
Lavendulæ florum incisorum unciam, . . . p. 8.
Rosmarini foliorum,
Salviæ foliorum, singulorum incisorum uncias duas, ... p. 16.
Aceti Vini libras quattuor . . . . p. 384.

Macerantur per quattuor dies.

ACETUM ROSÆ.

Rec. *Rosæ domesticæ petalorum* incisorum unciam, p. 1.
Aceti Vini libram . . . . p. 12.

Macerantur per quatriduum.

ACETUM RUBI IDÆI.

Rec. *Rubi idæi baccarum* recentium, mundatarum et in pultem redactarum, libras sex, . . p. 3.
Aceti Vini libras quattuor . . . . p. 2.

Macerantur per dies quattuordecim. In lagenis non amplis servatur.

ACETUM SCILLÆ.

Acetum scilliticum.

Rec. *Scillæ radicis*, siccatæ et minutim concisæ, unciam, ... p. 1.
Aceti Vini libram . . . . p. 12.

Macerantur per octo dies.

Ed. Vta p. 49

ACIDUM ACETICUM CONCENTRATUM.

Rec. *Sacchari Saturni*, leni calore in vase porcellaneo (ne pars quædam salis destruatur, ab igne sæpius removendo) inter agitandum, donec sal aquam amiserit, calefacti et deinde pulverati, libras quinque, p. 10.
Acidi Vitrioli, coctione ab aqua excedente liberati et plane decoloris, uncias duodeviginti . . . . p. 3.

Saccharum Saturni in retortam vitream, tubulatam, siccam, adaptato lege artis excipulo vitreo, caute immittitur, ne collum retortæ inquinetur; acido deinde partitis vicibus per tubulum instillato, miscela ope baculi vitrei agitatur, quo facto fit destillatio ex balneo Chloreti calcici, quamdiu acidum prodit, quod in ampulla vitrea, epistomio vitreo instructa servatur. Pondus specificum 1.063 erit.

Si acido sulphuroso inquinatum esset acidum, super
Magnesii nigri, subtilissime pulverati, uncias quinque . . . . p. 1.
rectificetur, necesse est.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

Rec. *Sacchari Saturni* crystallisati libras quattuor, p. 48.
Acidi Vitrioli uncias tredecim, ... p. 13.
Aquæ destillatæ libris duabus . . . . . . p. 24.
diluendas. Miscentur in retorta satis ampla et, post digestionem per horas viginti quattuor, fit destillatio usque ad siccum, excipulo non plane clauso et ad finem destillationis sæpius mutando, ita ut illam acidi portionem, quæ acido sulphuroso inquinata prodit, separatim excipere liceat. Acidum purum, cujus pondus

Concentrerad Ättiksyra,

specificum 1.04 erit, in lagenis vitreis, probe clausis servatur.

Acidum, ab acido sulphuroso inquinatum, destillando super *Magnesii nigri* pulverem purificatur.

Ed. V. p. 50

ACIDUM BENZOICUM.

Flores Benzoës.

Benzoë amygdaloides, grandiuscule pulverata, in sartaginem ferream vulgarem immittitur. Supra orificium sartaginis charta bibula laxioris texturæ expanditur, marginibus ejus supra externam sartaginis oram glutine amylaceo agglutinatis. Supra sartaginem et chartam expansam conus vel cylindrus e charta densioris texturæ construitur, funiculi ope supra sartaginis parietes fortiter alligandus. Sartago, tali modo præparata, in laminam ferream, strato arenæ intersperso, imponitur; quo facto ignis lenis sub lamina accenditur, per horas quattuor vel sex æquabiliter alendus. Tota supellectile post refrigerium subversâ et funiculo dissoluto cylindrus, acidum sublimatum continens, amovetur.

---

p. 50.

ACIDUM BORICUM.

Sal sedativum Hombergi.

Rec. *Boracis* pulveratæ uncias quattuor, ... p. 2.
Aquæ destillatæ ferventis uncias decem . p. 5.

In vase vitreo miscentur, ut Borax dissolvatur; tum solutioni etiamnunc fervidæ instillantur

Acidi hydrochlorici unciæ duæ . . . . . . p. 1.

Crystalli, e liquore post refrigerium depositæ, chartâ colliguntur et *Aquâ destillatâ* frigidâ abluun-

tur; deinde in parva aquæ ferventis quantitate liquescunt et, e solutione colata iterum depositæ atque aquâ frigidâ ablutæ, inter chartæ bibulæ plagulas exprimuntur et siccantur. In vase vitreo, clauso servantur.

Liquores, e quibus crystalli demissæ sunt, et aquæ lotionis, si evaporatione diminuuntur, parvam tradunt acidi borici quantitatem, ut jam præscriptum est, purificandam.

---

p. 51

ACIDUM HYDROCHLORICUM.

Acidum muriaticum vel Salis.

Rec. *Aquæ destillatæ* uncias quindecim, ... p. 5.
Acidi Vitrioli uncias quadraginta quinque, p. 15.
Salis communis, calore adhibito ab aqua inhærente liberati, libras quattuor . . p. 16.

Sal cum Acido, Aquâ antea diluto, in cucurbita ad dimidium replenda miscetur, quæ, tubo securitati inserviente instructa et supra balneum arenæ collocata, igne afficitur, ita ut mixtura ferveat. Quod gignitur gas, ope tubi vitrei, bifariam curvati et ad orificium cucurbitæ adaptati, in lagena, *Aquæ destillatæ* libras duas continente, colligitur, ubi tubus summam tantummodo aquam adtingit. Quo autem aqua, quantum fieri possit, gase saturetur, lagena aquâ frigidâ, nive vel glacie immixtâ, cingenda est.

Quando aqua lagenæ, tubo suppositæ, tantum gasis acidi absorbuerit, ut pondus specificum 1.19 ei sit, removenda est, et nova aquæ destillatæ portio in illius locum substituenda. Quod si, opere peracto, aquæ pars quædam non perfecte saturata est, servatur, ut, quum eadem alias operatio repetitur, saturari possit.

Serva-

Chlorvätesyra

Servatur acidum in lagenis vitreis, epistomiis vitreis arcte claudendis.

ACIDUM HYDROCYANICUM DILUTUM. ☿ Ed. VIa p. 155.

Acidum Borussicum.

Rec. *Acidi tartarici* drachmas undecim, . . . p. 11.
Aquæ destillatæ uncias novem . . . . . p. 72.
Fit solutio clara, quæ servatur.

Quum jussu Medici practici præparandum est Acidum hydrocyanicum,
Hujus solutionis drachma
cum *Cyaneti kalici* granis tribus et dimidio in lagena, statim obturanda, miscetur; mixturâ bene conquassatâ, lagena in aquam frigidam per semihoram immergitur, quo facto liquor clarus a crystallis tartari depositis caute defunditur et ponderatur.

Acidum hocce nullâ conditione servetur paratum, nec nisi ad præscriptum Medici, summâ cautione adhibitâ, paretur; ubi copia quædam ejus superest, hæc semper delenda.

Continet acidi hydrocyanici anydri trigesimam octavam circiter partem vel 2.66 partes centesimas.

ACIDUM NITRICO-NITROSUM. p. 52

Acidum Nitri fumans.

Rec. *Nitratis kalici depurati*, pulverati et siccati, libras quattuor, ... p. 2.
Acidi Vitrioli libras duas . . . . p. 1.

Nitrati, in retortam vitream, semirepiendam immisso, acidum sensim affunditur; quod quidem, si

deest retorta tubulata, epistomio vitreo claudenda, fit ope infundibuli, rostro longo incurvoque instructi, summâ tamen adhibitâ cautione, ne gutta quædam acidi collo retortæ adhæreat. Mox retorta in balneo arenæ calefacto collocatur; tum admovetur excipulum, siphone vel tubo incurvo ita instructum, ut crus siphonis interius in excipulum paullum modo intret; crus autem exterius in lagenam, paullum aquæ continentem, ut aquam adtingat, ingeritur, et commissura secundum leges artis clauditur. Destillatur deinde igne primum leni, dein sensim aucto, donec non amplius ulli vapores ascendant.

Quod in excipulo est acidum mox effunditur in vas vitreum, epistomio vitreo claudendum, et in loco frigido et obscuro servatur; pondus specificum 1.50—1.51 habebit.

In lagena manens liquidum est Acidum nitricum valde dilutum.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

Acidum Nitri præcipitatum.

Rec. *Aquæ fortis* quantum vis;
cui *Nitras argenticus*, *Aquâ destillatâ* solutus, instillatur, quamdiu Aqua fortis inde fit turbida. Miscela deinde, bene conquassata, in retortam vitream, tubulatam, per tubulum infunditur, vel in retortam sine tubulo per infundibulum, caudâ longâ instructum, immittitur; in retorta vero paullum *Nitratis kalici depurati* et pulverati inest. Adaptatur deinde excipulum capax, et fit, commissurâ non clausâ, ex balneo arenæ destillatio fere ad siccum. Quod primum prodit destillatum aquosum separatim recipitur; quod vero postea provenit acidum illo aquoso est diluendum, ut pondus ejus specificum 1.25 fiat.

In ampulla, epistomio vitreo bene clausa, loco obscuro servatur.

ACIDUM QUERCITANNICUM.

Rec. *Gallarum turcicarum*, grandiuscule pulveratarum, quantum vis,
Ætheris quantitatem sufficientem.

Tubus vitreus amplus, cujus altera pars in acumen educta est, altera aperta et epistomio claudenda, ope obturamenti suberei lagenæ cuidam ita infigitur, ut a fundo ejus satis distet tubi acumen. Orificio acuminis lanugine gossypii leviter oppleto, pulvis gallarum, aquâ paullulum humectatus, tubo immittitur, Æthere deinde replendo et claudendo. Post aliquot horas apertura tubi clausa returatur, ut liquor e tubo in lagenam decidat, ubi duo omnino strata formantur, unum inferius spissius, alterum superius tenuius; nova vero Ætheris copia tubo est infundenda, dum stratum illud spissius augetur, quod deinde, a superiore strato siphonis ope vel alio quodam modo separatum, exhalatione in balneo vaporis ad siccum reducitur. Massa residua, spongiosa, in vitro bene clauso servatur.

E strato tenuiori Ætheris quædam portio destillando recuperari potest.

ACIDUM SULPHURICUM DESTILLATUM.

Retortæ vitreæ ope infundibuli, rostro longo incurvoque instructi, infunduntur
Acidi Vitrioli libræ duæ vel tres;
ubi cavendum, ne collum retortæ acido inquinetur neve retorta ipsa amplior sit, quam ut ad dimidium acido repleatur. Adaptato sine luto vel juncturis

excipulo, retorta in balneum arenæ immergitur et mitrâ, e lamina ferrea confectâ, tegitur. Calor deinde balnei augetur ad ebullitionem acidi, quæ, ne momento quidem cesset, cavendum est. Quando destillatione elicitæ sunt unciæ circiter duæ vel tres, vas excipiens amovetur et aliud bene siccum et calefactum adaptatur, ita ut collum retortæ in medium excipuli promineat: quo facto destillatio continuatur, usque dum acidi duo trientes provenerint, qui in ampullam vitream, siccam et calefactam, epistomio vitreo probe claudendam, statim ingeruntur. Pondus specificum 1.845 erit.

Ad destillationem bene perficiendam non paullum conducit, fila platinica, ubi ad manus fuerint, spiræ modo flexa, acido immisisse.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

Spiritus Vitrioli.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* quantum placet,
Aquæ destillatæ quantitatem octuplam.

Sensim et caute mixta in lagena, epistomio vitreo munita, servantur.

ÆTHER.

Æther sulphuricus vel vitriolatus.

Rec. *Spiritus concentrati* partes duas,
Acidi Vitrioli partes tres.

Spiritui, vasi idoneo infuso, acidum, subtilissimæ instar chordæ, paullatim admiscetur, vas interea sæpissime agitando, ut liquor sub instillatione in gyrum moveatur. Mixtura etiamnunc calida retortæ vitreæ, tubulatæ, ad dimidium replendæ, balneo arenæ im-

positæ et jam calefactæ infunditur, adaptato lege artis excipulo amplo, tubulato, ubi tubulus clauditur subere tubi vitrei deflexi, cujus crus externum in lagenam siccam intrat. Loco excipuli hoc modo instructi, collo retortæ adaptari potest canalis refrigeratorius e stanno puro. Tubulus retortæ epistomio subereo clauditur, quod longius complectitur siphonis crus, amplitudine internâ trium linearum; acumen hujus cruris, ad amplitudinem lineæ coarctatum, liquori immergitur, ut a fundo retortæ satis distet; crus vero brevius in lagenam, quantitatem Spiritus concentrati arbitrariam continentem, usque ad fundum intrat. Tali vel alio quodam modo efficiendum est, ut, ubi sipho Spiritu impletus sit, torquendo spiraculo æneo, ad crus longius siphonis applicato, affluxum Spiritus dirigere liceat.

His rite instructis junctisque, calor balnei caute augetur ad liquoris ebullitionem, quæ haud interrupta sustentatur, excipulo et tubo aquâ frigidâ vel nive continue refrigeratis. Liquori vero, decimâ circiter parte destillando imminutâ, tantum Spiritus per siphonem sensim additur, ut pristinum sui volumen recuperet, cavendo, ne cesset ebullitio; in quo faciendo pergendum, quamdiu Spiritus, ad præparationem ætheris designatus, lagenæ inest.

Præclarius quidem et facilius fit hæc operatio, si affluxus Spiritus ita disponitur, ut thermometrum una cum siphone in liquorem intrans, temperaturam liquoris coquentis $+140^{0}-150^{0}$ C. semper monstret.

Quum circiter tres Spiritus consumpti quartæ partes in vase excipiente collectæ sunt, destillationi finis est imponendus. Destillatum deinde in lagena, subere claudenda, cum dimidia parte *Aquæ destillatæ, Calce ustâ* admixtâ, quæ aquâ adspersâ in hydratem conversa est, diligenter conquassatur, quo facto per horas viginti quattuor seponitur. Post hæc æther superna-

tans caute defunditur, in alia lagena cum *Chloreto calcico*, grandiuscule pulverato, conquassatur et, post quietem dierum aliquot iterum defusus, lenissimo calore rectificatur; excipulis sæpius mutatis, illa destillati pars, quæ pondus specificum 0.723 possidet, separatim colligitur et in lagenis, subere clausis, servatur ad usum; quæ autem majus habeat pondus specificum, iterata destillatione, calore blandissimo est rectificanda.

Residuum in retorta acidum præparationi Ætheris, alias instituendæ, inservire potest.

ÆTHER ACETICUS.

Rec. *Sacchari Saturni*, ut ad Acidum aceticum concentratum præscriptum est; aquâ liberati, uncias triginta duas, ... p. 32.
Spiritus concentrati uncias novem, . . . p. 9.
Acidi Vitrioli uncias duodecim . . . p. 12.

Mixtura refrigerata e Spiritu et Acido, rite commixtis, Saccharo Saturni, in pulverem redacto, in retorta vitrea superinfunditur. Adaptato excipulo, non plane clauso et diligenter frigefaciendo, destillantur unciæ novem (p. 9), quæ ope *Hydratis calcici* ab acido excedente, et ab aqua ope *Chloreti calcici*, ut in æthere purificando jam præscriptum est, liberatæ rectificantur, ita ut pondus specificum 0.88—0.89 habeat destillatum. Servatur in lagena, subere probe clausa.

ÆTHER NITRICUS SPIRITUOSUS.

Spiritus Nitri dulcis.

Rec. *Spiritus concentrati* libras duas . . . p. 4.
In retorta vitrea capaci paullatim adjicitur
Acidi nitrico-nitrosi libra dimidia . . . p. 1.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Adaptatur excipulum tubulatum, siphone, ut ad Acidum nitrico-nitrosum dictum est, instructum, et fit destillatio calore balnei vaporis, donec in excipulo, quod quam frigidissimum conservari oportet, collectæ sint unciæ octodecim (p. 3.), quæ cum *Bicarbonate natrico*, in pulverem redacto, conquassantur, quamdiu acidi reactionem præbeant. Separatus post quietem liquor æthereus iteratâ in balneo vaporis destillatione rectificatur et in lagenis parvis, obturamentis subereis bene claudendis, servatur. Pondus specificum 0.84 —0.85 erit.

ÆTHER SPIRITUOSUS.

Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.

Rec. *Ætheris* partem unam.
Miscetur cum
Spiritus concentrati partibus duabus.
Servatur in lagenis probe clausis.

ÆTHEROLEA.

In ætheroleis parandis, ubi nihil aliud præscriptum fuerit, debitæ substantiæ, rei convenienter deminutæ, imponuntur diaphragmati, ad cribri similitudinem perforato atque in superiori parte alembici ænei collocato, ubi aquæ fluvialis partes quattuor vel sex ad ebulliendum jam calefactæ sint. Adaptato statim capitello cum refrigeratorio, fit destillatio, quamdiu aqua ætheroleo gravida prodit, quæ in lagena vitrea, tubo laterali recurvato munita (excipulo Florentino) colligitur. In vitris parvis, inde repletis ac bene clausis, loco obscuro servanda sunt.

Quæ una cum ætheroleo transiit aqua, ætheroleo ex nova copia ejusdem generis substantiarum eliciendo inservire potest.

Aliâ quoque et quidem præclariori ratione peragitur hæc operatio, si elicitur ætheroleum, adjuvantibus aquæ vaporibus, qui ope tubi ex aheno quodam, aquam semper bullientem continente, usque ad fundum alembici continue deducuntur, ubi substantiæ, aquâ fervidâ humectatæ, collocatæ sunt. Alembicus vero vel balneo vaporis vel circumvoluto stramine calidior est conservandus.

ÆTHEROLEUM ABSINTHII.

Oleum Absinthii.

Paratur ex *Absinthii summitatibus.*

ÆTHEROLEUM ANISI.

Oleum Anisi.

Paratur ex *Anisi seminibus;* ubi cavendum, ne majori refrigeratione ætheroleum in vase refrigeratorio concrescat.

ÆTHEROLEUM CARVI.

Oleum Carvi.

Paratur e *Carvi seminibus.*

ÆTHEROLEUM CARYOPHYLLORUM.

Oleum Caryophylli.

Paratur e *Caryophyllis*, excipulo Florentino ita instructo, ut poscat pondus specificum ætherolei colligendi aquâ gravius.

ÆTHEROLEUM CYMINI.

E *Cymini seminibus* paratur.

ÆTHEROLEUM FOENICULI.

Oleum Foeniculi.

Paratur e *Foeniculi seminibus*; ubi observandum, quod de Ætheroleo Anisi jam monitum est.

ÆTHEROLEUM JUNIPERI.

Oleum Juniperi.

E *Juniperi baccis immaturis* paratur.

ÆTHEROLEUM MENTHÆ PIPERITIDIS.

Oleum Menthæ piperitidis.

E *Menthæ piperitidis herba* paratur.

ÆTHEROLEUM PIPERIS JAMAICENSIS.

Oleum Piperis jamaicensis.

Paratur e *Pipere jamaicensi.*

ÆTHEROLEUM SABINÆ.

Paratur e *Sabinæ ramulis.*

ÆTHEROLEUM TANACETI.

Oleum Tanaceti.

Paratur e *Tanaceti summitatibus.*

ÆTHEROLEUM TEREBINTHINÆ DEPURATUM.

Oleum Terebinthinæ æthereum.

Rec. *Olei Terebinthinæ* quantum placet,
Aquæ fluvialis trecuplam quantitatem.

Mixta destillantur, quamdiu prodit ætheroleum.

ÆTHEROLEUM THYMI.

Paratur e *Thymi herba.*

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS.

Hydrargyrum stibiato-sulphuratum.

Rec. *Sulphuris sublimati eloti* uncias duas, . . p. 2.
Sulphureti stibici præparati uncias tres, . p. 3.
Hydrargyri destillati uncias quattuor, . . p. 4.

In mortario vitreo vel porcellaneo, ope pistilli, basi dilatatâ præditi, simul teruntur, donec globuli Hydrargyri oculo armato penitus disparuerint.

ÆTHIOPS MINERALIS,

loco Sulphureti Hydrargyri nigri.

Rec. *Sulphuris sublimati eloti,*
Hydrargyri destillati, singulorum uncias tres vel partes æquales.

Miscentur, terendo in mortario vitreo vel porcellaneo amplo diligentissime et diu, donec Hydrargyrum oculo armato penitus evanuerit.

ALKOHOL VINI.

Spiritus concentratissimus.

Rec. *Spiritus concentrati* libras quattuor, . . . p. 8.
Carbonatis kalici depurati, plane sicci, libram unam et dimidiam . . . . p. 3.

In lagena, interdum agitanda, per horas duodecim macerantur. Spiritus deinde defusus super
Chloreti calcici, in frustula redacti, libras tres et semis, ... p. 7.
cum iis antea maceratus, e retorta vitrea rectificatur, ad siccum usque destillando.

Quæ primum prodeunt unciæ separatim colligendæ sunt et, si aquosæ reperiantur, rejiciendæ.

Pondus specificum 0.794 habeat.

ALUMEN USTUM.

Rec. *Aluminis crudi* quantum vis.

In patina satis ampla, ferrea vel fictili nova, incalescit igne leni, sensim sed non nimis augendo, donec aqua abierit et residuum in massam spongiosam, levem, fuerit conversum. Servatur in vase bene clauso.

AMMONIACUM CAUSTICUM.

Spiritus Salis ammoniaci causticus.

Rec. *Salis ammoniaci depurati*,
Calcis recens ustæ, singulorum libras quinque p. 5.

Seorsim pulverata in olla e ferro fuso miscentur, cui statim, ope vinculorum et luti, e gypso farinaque confecti, adfigitur operculum duobus foraminibus instructum; quorum alterum subere integro obturatur, alterum vero subere perforato, tubum vi-

treum incurvum includente. Deinde per foramen, subere integro claudendum, affunduntur, partitis vicibus et agitando cum baculo ferreo,

Aquæ destillatæ libræ circiter quattuor vel tantum,

ut Sal et Calx inter destillandum semper humecten-tur, et fit, incenso inter hæc igne, non nimis augendo, destillatio. Gas, quod per tubum deducentem prodit, primum per lagenam inanem perducitur et deinde in alia lagena, librarum duodecim fere capace et

Aquæ destillatæ libras novem . . . . . . p. 9. continente, continue frigidissima conservanda, colligitur; tubus vero, cujus ope gas in aqua colligitur, ad fundum lagenæ prominet.

Ubi bullulæ gasis rariores finem destillationi imponendum significant, foramen subere clausum extemplo returandum est, ne inter refrigerationem liquores in ollam regrediantur.

Liquori, qui in lagena posteriori continetur, tantum *Aquæ destillatæ* additur, ut pondus specificum 0.95 habeat.

☿ AMYGDALINUM.

Rec. *Amygdalarum amararum*, subtiliter contusarum, libras duas . . . . p. 2.

Oleo earum pingui iterata expressione et, si velis, leni calore, sed aquâ haud affusâ, remoto, placenta pulverata cum

Spiritus concentrati libris tribus . . . . . p. 3. decoquitur in vase idoneo, ne Spiritus in auras abiens perdatur, sed colligi et in vas refundi possit; quo

quo facto liquor, etiamnunc fervens, colatur, et massa residua cum

Spiritus concentrati libris duabus . . . . . p. 2.

eodem modo tractatur.

Amygdalinum, quod inter refrigerandum e liquoribus spirituosis deponitur, colo colligendum est, Spiritu concentrato frigido edulcorandum, inter chartæ plagulas exprimendum et denique siccandum. Quod si una cum Amygdalino deposito copia quædam olei pinguis subsederit, hæc a liquore spirituoso, ad Amygdalinum solvendum iterum calefacto, accurate separatur, quo facto Amygdalinum, e liquore refrigerato denuo depositum, colligitur.

Amygdalinum siccum in lagena occlusa cum *Ætheris* sufficiente copia quassatur et, Æthere defuso, iterum siccatur; quod si jam non plane album appareat, tale fit solvendo in Spiritus concentrati ferventis sufficiente quantitate, colando et refrigerando.

Liquor ille spirituosus, qui Amygdalinum primum deposuit, destillatione et refrigeratione novam exhibet ejus copiam, ut jam præceptum est, purificandam.

AQUÆ.

Aquæ, quæ *destillatæ aromaticæ* dicuntur, ope vaporum aquæ bullientis parantur, ut in ætheroleis jam monitum est, substantiis vel super cribrum, in superiori parte vesicæ destillatoriæ collocatum, immissis vel in vesica ipsa cum aqua commixtis. Quum prodierit præscripta destillati quantitas, hæc, bene conquassata, per nychthemeron seponitur et deinde, colando per chartam madidam, ab ætheroleo deposito vel innatante liberatur.

Servantur loco frigido et obscuro in lagenis clausis, vitreis aut figulinis.

AQUA ACIDI CARBONICI.

Aqua aërata vel carbonica.

Aqua fontana, quam in vase clauso diu servatam non putrescere notum est, in apparatu idoneo, immixtâ *Glaciei* contusæ parte circiter quintâ, cum *Gase Acidi carbonici puro* (aëris atmosphærici experte et per aquam transadacto) tamdiu quassatur, quamdiu Acidi carbonici aliquid ab aqua absorbetur; quod dum fit, aëri, ex aqua expulso, sæpius dandus est evadendi locus.

Aqua, gase saturata, in lagenas vitreas jam frigefactas, quæ suberibus selectis rite obturantur, immittitur. Subera, vinculo apto lagenis infixa, in *Colophonium*, cum *Sevi bubuli* sexta parte commixtum et supra ignem liquefactum, immerguntur.

☿ AQUA AMYGDALARUM AMARARUM CONCENTRATA.

Rec. *Amygdalarum amararum* partem unam.

Ex contusis et cum

Aquæ fluvialis partibus quattuor,

quæ inter agitandum partitis vicibus affunduntur, per horas viginti quattuor maceratis, destillando elicitur pars una.

In vitris parvis caute asservanda est.

Aqu. Amygdal. Amar. c. Amygdalin. parat.

Rx. Amygdalar. Amar. ℥ij

Aquæ Fluviat. ℥j

Teratur ut fiat Emulsio

Cola et adde

Amygdalin gr. xvij

Aqua Anticephalalgica

Rx. Ammoniac. Caust. ℥ss

Aqu. destillat. ℥iv

Sal. Marin. ℈ij

Camphor. gr. iv

Mx. Ds. Lr.

AQUA AMYGDALARUM AMARARUM DILUTA.

loco Aquæ Cerasi.

Rec. *Aquæ Amygdalarum amararum concentratæ* drachmam . . . . p. 1.
Aquæ destillatæ uncias duas . . . . p. 16.
Miscentur.

Paratur ex tempore.

AQUA AURANTII.

Aqua Naphæ.

Rec. *Aurantii florum, sale conditorum*, partem unam,
Aquæ fluvialis quantum requiritur.
Destillatione eliciuntur partes duæ.

AQUA CALCIS.

Rec. *Calcis ustæ* partem unam,
Aquæ destillatæ partes viginti.

Calce sensim Aquæ, interea quassandæ, additâ, in vase clauso seponuntur. Quum autem ex præscripto Medici datur Aqua, optime conquassata per chartam cito colari et in lagena, bene obturata, servari debet.

AQUA CARVI.

Rec. *Carvi seminum* partem unam,
Aquæ fluvialis sufficientem quantitatem.
Destillando eliciuntur partes sex.

AQUA CHLORI.

Aqua Superoxidi muriatosi.

Rec. *Salis communis* partes quattuor,
Magnesii nigri partes tres.

Pulverata et mixta in retortam percapacem vel cucurbitam, tubo deducente instructam, immittuntur. Tum admiscetur miscela frigida ex

Acidi Vitrioli partibus octo

et *Aquæ fluvialis* partibus quattuor,

conjungiturque collum retortæ vel tubus cucurbitæ cum duabus tribusve lagenis Woulfianis, quarum prima parvam tantummodo continet Aquæ destillatæ quantitatem, ceteræ vero

Aquâ destillatâ

ad duos trientes repletæ sunt. Juncturis rite clausis, lenissimo calore, gradatim augendo, evolutioni gasis consulitur, quod per Aquam perducitur, dum hæc saturata sit; tunc solutio flavescens, quæ lagenæ secundæ et tertiæ inest, in vitris parvis, minime pellucidis, inde replendis et bene obturandis, loco frigido servatur. Nova vero Aquæ destillatæ copia in illius locum est substituenda, ut etiam hæc saturetur; quod denuo fit, quamdiu Gas Chlori evocari possit.

Parari etiam potest Gas Chlori e

Magnesii nigri parte una

et *Acidi muriatici crudi* partibus quattuor, commiscendis et in cucurbita blandissime calefaciendis.

AQUA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi libram, p. 8.
Spiritus Vini gallici libras duas, . . . p. 16.
Aquæ destillatæ, quantum satis ad evitandum empyreuma.

Destillando eliciuntur libræ sex (p. 48), in quibus solvitur

Sacchari albi uncia una cum dimidia . . p. 1.

Aqua Foeniculi. Ph. M.

AQUA CREOSOTI.

Rec. *Creosoti* drachmam; . . . . p. 1.
Aquæ destillatæ uncias decem . . . . . p. 80.
Mixta per octo dies, interdum conquassando, reponuntur. Colatura in vase bene clauso servatur.

AQUA DESTILLATA.

Aqua fluvialis, admixtâ perparvâ quantitate *Calcis ustæ*, ex alembico æneo, qui capitello et refrigeratorio, Aquâ destillatâ antea diligentissime ablutis, instructus est, ad remanentiam sextæ partis destillatur; rejectâ, quæ primum prodit, portiunculâ minus purâ.

AQUA FOENICULI.

E *Fœniculi seminibus*, ut Aqua Carvi, paratur.

AQUA MENTHÆ CRISPÆ.

Rec. *Menthæ crispæ* herbæ partem unam,
Aquæ fluvialis quantum requiritur.
Destillando eliciuntur partes tres.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

E *Menthæ piperitidis herba* eodem modo, quo Aqua Menthæ crispæ, paratur.

AQUA PETROSELINI.

E *Petroselini seminibus* paratur, ut Aqua Carvi.

AQUA PICEA.

Infusum Picis liquidæ.

Rec. *Picis liquidæ* libram, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras quattuor . . . . . p. 4.

In vase ligneo mixta agitantur rudiculâ ligneâ; deinde per duodecim horas subsidere pix sinitur, et liquidum defusum per chartam colatur.

AQUA RANUNCULI ALBI.

Aqua Anemones.

Rec. *Ranunculi albi herbæ recentis* partes duas,
Aquæ fluvialis sufficientem quantitatem.

Destillando eliciuntur partes tres.

AQUA ROSÆ.

E *Rosæ multiplicis petalis recentibus* vel *salitis*, ut Aqua Aurantii, paratur.

AQUA SAMBUCI.

E *Sambuci floribus* paratur, ut Aqua Aurantii.

AQUA SUBACETATIS PLUMBICI.

Aqua Saturni.

Rec. *Solutionis Subacetatis plumbici* unciam dimidiam, ... p. 1.
Spiritus Frumenti depurati unciam, ... p. 2.
Aquæ destillatæ libras duas . . . . p. 48.

Miscentur.

℞ Aqu. Ros. ℥ij
Spirit. Vini gall ℥j
(Epiphora)

<u>Aqua Saturni</u>
℞ Acet. Plumbi. ℥ss
Aqu. Fluviat. Lbij.
M. Ds.

<u>Aqua Stibiata</u>
℞ Tartrat. Kalic. Stib. grij
solv. in
Aqua destill. ℥j
M.

Aqua vuln. Thedenii

Rz. Aceti ℔iij
Alkohol ℔iß
Acid. sulph. dilut. ℥6
Mell. depur. ℔j

Aqua Vegeto mineral. Goulardi

Rz. Subacet. plumb. ʒ6
Aqu. commun. ℔ij
Spir. Vin. rectific. ℥ij

AQUA SUPERCARBONATIS KALICI.

Aqua aërata alkalina.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* uncias tres . . p. 1.

Fit in Aqua solutio, quæ colata tantæ *Aquæ fontanæ* quantitati, *Gase Acidi carbonici* secundum regulas jam datas (vide ad Aquam Acidi carbonici) imbutæ, additur, ut, quum miscela gase ulterius perfecte saturata est, pondus librarum quinquaginta sex (p. 224) habeat.

AQUA SUPERCARBONATIS NATRICI.

Aqua Sodæ.

E *Soda depurata*, fatiscendo aquâ liberata, ut ad Aquam Supercarbonatis kalici dictum est, paratur.

ARGENTUM PURUM.

Argentum Acido nitrico diluto solvitur; solutio ejus, diluta et colata, solutione fervidâ *Salis communis* præcipitatur. Quod fundum petit Chloretum argenticum, Aquâ destillatâ fervidâ bene lavatur et deinde siccatur.

Hoc præcipitatum, cum æqua portione *Carbonatis kalici depurati* mixtum, in crucibulum argillaceum ingeritur, quod igne paullo remissiori rubefit per horam dimidiam vel donec, massâ nondum liquatâ, argentum in statum metallicum reductum sit; tum calor augetur, ita ut omnia liquefiant, et argentum in unum coire possit.

AXUNGIA CURATA.

Adeps curata.

Axungia Porci, membranulis, venis et fibrillis exemptis, lavatur Aquâ et in balneo vaporis liquatur; denique, post humidi exhalationem, per linteum exprimendo colatur.

Curantur eodem modo *Sevi* variæ species.

BALSAMUM ADSTRINGENS.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* drachmas decem, p. 5. quibus in vase vitreo capaci et ampli orificii guttatim et per vices affunditur

Olei Terebinthinæ uncia dimidia . . . . . p. 2.

Effervescentiâ et calore cessantibus, caute admiscentur

Spiritus diluti unciæ quattuor . . . . . . p. 16.

Servatur in vase vitreo, bene clauso.

BALSAMUM AROMATICUM.

Linimentum aromaticum.

Rec. *Ceræ flavæ* unciam dimidiam, ... p. 12.

Olei Nucis moschatæ uncias duas . . . . p. 48.

Calore balnei vaporis liquata colantur; nondum concretis admiscentur

Olei Succini empyreumatici rectificati scrupulus, ... p. 1.

Balsami peruviani drachmæ duæ, ... p. 6.

Olei Lavendulæ,

Ætherolei Caryophyllorum, singulorum uncia dimidia . . . . p. 12.

Exactissime mixta in vase, bene obturato, servantur.

---

mot. Rheumat. in o uhr. dos. 10 dr 4i.

Rp. Bicarb. Kalic. 3j
D. in X^ple Sr. 1p. 37. (Ergotinum)

BALSAMUM SULPHURIS.

Rec. *Sulphuris sublimati* libram dimidiam, . . . p. 1.
Olei Lini libras duas . . . . p. 4.

Oleo, in vase terreo vitreato aut ferreo, satis capaci et alto, ad +200° C. circiter calefacto, additur sensim Sulphur, agitando spathulâ et cavendo, ne nova Sulphuris portio addatur, nisi prius cessaverit effervescentia, neu temperatura +250—260° C. superet.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

Ætheroleum Terebinthinæ sulphuratum.

Rec. *Balsami Sulphuris* libram, ... p. 1.
Ætherolei Terebinthinæ depurati libras tres p. 3.

Soluta in vase clauso servantur.

BICARBONAS KALICUS.

Carbonas kalicum.

Rec. *Carbonatis kalici depurati*,
Aquæ destillatæ, singulorum partes æquales.

Fit solutio, quæ colata *Acidi carbonici Gase* in apparatu idoneo perfecte saturatur; crystalli, post hæc demissæ, inter chartæ plagulas siccantur.

Liquor residuus, blando calore evaporatus, novam crystallorum tradit copiam.

BICARBONAS NATRICUS.

Carbonas Natricum.

Sodæ depuratæ crystallisatæ pars una cum *ejusdem Salis*, fatiscendo in pulverem redacti, par-

tibus tribus terendo intime commiscetur et, in apparatu idoneo, *Acido carbonico* perfecte saturatur.

BILIS BOVINA INSPISSATA.

Fel Tauri inspissatum.

Rec. *Bilis bovinæ recentis*, e vesicis nuper depromptæ, libram vel quantum vis,
Spiritus concentrati par pondus.

Probe mixta et per linteum trajecta in balneo aquæ vaporando comminuuntur, donec residuum pondus specificum 1.20 habeat.

BOLUS PRÆPARATA.

Bolus armena, in mortario contrita vel super porphyritem levigata, sacculo linteo, e filis tenuissimis (quorum 130 pollicem decimalem, vel 108 pedis duodecimam partem (Verktum), efficiunt) contexto, includitur, quo apte quassando pulvis subtilissimus a crassiore separatur; hic denuo tritus eodem modo tractatur, ille vero inpalpabilis servandus est.

CALAMINA PRÆPARATA.

Fit, ut Bolus præparata, e *Calamina*.

CARBO ANIMALIS.

Carbo Lixivii Sanguinis.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* libras duas, . . p. 1.
Sanguinis bovini recentis libras decem . . p. 5.

Mixta supra balneum arenæ evaporant, ut exsiccentur; quo facto in crucibulo ferreo tecto leni

Rp. Carbon. Animal. gr viij
Elaeosacch. Carvi gr v.
(Gangraena pulmonum)

Rc. Pulv. carb. veget. prep ℥j
— cort. Cinch. rag.
Magnes. carbon. aa ℥j

(Erysipelas gangranosa)

#

Rc. Carbon. Kalii. depur ʒjß
solv. in Aqu. Cinnamom. ℥iv
adde
Syrup. Diacodii ℥ß
Mr. S. 1 in 4. dd. Tillka drickes.
Inf. Hbæ. jacea.
(Dysenteria)

igne candefiunt, quamdiu vapores inflammabiles evolvantur. Massa refrigerata cum *Aqua destillata* in mortario teritur in pulverem tenuissimum, qui, Aquâ probe lotus, cum *Acido hydrochlorico* diluto coquitur et Aquâ destillatâ denuo edulcoratur. Carbo residuus levis siccatur et in crucibulo, bene tecto, leniter excandescit. Post refrigerationem in vas, probe claudendum, statim ingeritur.

CARBO SPONGIÆ.

Spongia usta.

Spongiæ marinæ frustula, ab arenulis purgata, in crucibulo cooperto, ut plane excandescant et donec fumum emittere cessent, uruntur. Carbo exinde ortus in crucibulo, ex igne remoto, operculo etiamnunc remanente, refrigeratur et in vase clauso servatur.

CARBO VEGETABILIS PRÆPARATUS.

Carbo ligneus præparatus.

Quum ignis in fornace *Ligno Betulæ* alitur, carbones candentes, ubi aëres inflammabiles edere cesserint, in olla, operculo imposito, exstinguuntur et, etiamnunc calidi atque cineribus liberati, in pulverem rediguntur, qui in vase clauso statim servatur.

CARBONAS KALICUS DEPURATUS.

Subcarbonas kalicum depuratum.

Potassa depurata.

Rec. *Potassæ calcinatæ* libras quattuor, ... p. 2.
Aquæ destillatæ libras sex . . . . p. 3.

Mixta, agitatione sæpius iteratâ, per triduum macerantur. Solutio clara post subsidentiam sordium defunditur et in vase ferreo mundo ad dimidium evaporat; tum, lixivio refrigerato, quod limpidum est a crystallis, post diem unum alterumve depositis, decanthatur et in vase ferreo ad siccum vaporat. Residuum etiamnunc calens in pulverem redigitur et in vasis, optime obturatis, statim servatur.

CARBONAS KALICUS PURUS.

Alkali Tartari. Subcarbonas kalicus purus.

Tartarus depuratus, in pulverem redactus, in vas ferreum, ad rubedinem usque calefactum, per vices injicitur ibique ad plenam destructionem uritur. Massa alkalina, hinc orta, *Aquâ destillatâ* extrahitur, et liquor colatus in vase ferreo mundo vaporat ad siccum.

Servatur in vase, optime clauso. Si album non apparet, tale tandem fit ustione, dissolutione in Aqua destillata et evaporatione.

CATAPLASMA SINAPINUM FORTIUS.

Sinapismus acris.

Rec. *Sinapis nigræ seminum* pulveratorum quantum placet,
Aquæ destillatæ quantum satis,
ut fiat cataplasma mollioris consistentiæ, quod in vase vitreo, orificio amplo, epistomio vitreo claudendo, servandum est, ut promptum habeatur.

CATA-

Ceratum Flavum.

Re. Ceræ Flavæ lbj
Resin. Elemi ℥vj
Ol. Olivar. lbij ℥ij

CATAPLASMA SINAPINUM MITIUS.

Sinapismus mitis.

Rec. *Secalis farinæ* unciam unam, ... p. 1.
Sinapis nigræ seminum pulveratorum uncias tres, ... p. 3.
Aquæ destillatæ quantum satis,
ut fiat cataplasma mollioris consistentiæ.

Paratur ex tempore.

CERATA.

Materiæ pingues, in ceratis parandis, ope balnei aquæ bullientis liquandæ sunt ac miscendæ.

Servantur loco frigido, non humido.

CERATUM ALBUM.

Rec. *Ceræ albæ* uncias duas et dimidiam, . . . p. 5.
Cetacei uncias tres, ... p. 6.
Olei Olivarum communis uncias sex . . . p. 12.

Liquando miscentur. Massa, per linteum trajecta, in capsulis refrigeratur.

CERATUM RUBRUM.

Ceratum labiale.

Rec. *Alkannæ radicis corticis* drachmas duas, p. 1.
Ceræ albæ unciam dimidiam, ... p. 2.
Olei Cacao unciam, ... p. 4.
Butyri recentis, nondum saliti, uncias duas. p. 8.

Simul liquefacta et mixta per linteum colantur et in capsulis refrigerantur.

Servatur loco obscuro vel in vase non pellucido.

CERATUM SABINÆ.

Rec. *Ceræ flavæ* unciam unam, ... p. 1.
Sabinæ ramulorum uncias duas, ... p. 2.
Axungiæ curatæ uncias quattuor . . . . p. 4.

In balneo vaporis per horam digeruntur; tum per linteum exprimitur ceratum, in vase non pellucido servandum.

CEREOLI.

Rec. *Olei Olivarum communis* partem unam, . p. 1.
Ceræ flavæ partes sex, ... p. 6.

Post lenem humidi evaporationem, e massa ab igne remota fiunt cereoli, superficie lævi, variantibus formâ et diametro, prout requiruntur.

CEREOLI PLUMBICI.

Cerei medicati.

Rec. *Solutionis Subacetatis plumbici* drachmas duas, p. 2.
Cetacei drachmas tres, ... p. 3.
Ceræ flavæ libram . . . . p. 96.

In balneo vaporis liquefacta miscentur; e massa, nondum refrigerata, finguntur lege artis cereoli.

Parantur quoque, si requiruntur, cum Solutionis Subacetatis plumbici duplo vel quadruplo.

CHARTA AD FONTICULOS.

Rec. *Terebinthinæ communis* uncias duas, . . . p. 4.
Sevi ovilli curati uncias quattuor, ... p. 8.
Ceræ flavæ libram dimidiam, ... p. 12.
Resinæ flavæ libram . . . . p. 24.

Ry. Chinoidin. ℥j
Acid. Acet. dilut. ℥ij
Tinct. Absinth. ℥j
Mr. D. S. 40 dr. 2t,

Ry. Chlor. Aur. Natr. grij
Solv. in
Aetheris spirit qu. s.
admisce
pulv. rad Althea gr XLviij
M. f. c. syrup. Althea qu. s. pil
Nr. XXIV.
S/p. 4dd. Vitro, charta nigra
obducto. servatur.

In balneo aquæ colliquatis atque etiamnunc calidis additur

Acetatis cuprici, in pulverem tenuem redacti, uncia dimidia, ... p. 1.

et immerguntur in hanc miscelam colatam plagulæ chartæ tenuioris, albæ, tenacis, post refrigerium servandæ.

CHLORETUM AURICO-NATRICUM.

Murias Aurico-natricum.

Auri ducatus vel pars una

in *Acidi hydrochlorici* partibus quattuor

et *Acidi nitrici diluti* parte una, vel sufficiente quantitate, sensim addenda, solvitur. Liquidum, *Aquâ destillatâ* dilutum, a Chloreto argentico, in fundo remanente, separatur et cum solutione colatâ, e

Sulphate ferroso et

Aqua destillata

confectâ, miscetur, quamdiu oritur præcipitatum, colo papyraceo colligendum atque *Acido hydrochlorico* primum, dein *Aquâ destillatâ* lavandum et denique siccandum.

Auri tali modo purificati quantitas ponderata in *Acido hydrochlorico*, additâ quanta minima requiritur *Acidi nitrici diluti* copiâ, denuo solvitur. Solutioni, Aquâ destillatâ dilutiori factæ, ad Auri partes decem,

Salis communis partes tres

adduntur; quibus solutis, liquor balnei vaporis calore ad siccum vaporat. Massa sicca in vase opaco ac bene clauso servatur.

CHLORETUM BARYTICUM.

Murias baryticum.

Terra ponderosa salita.

Rec. *Spathi ponderosi*, in pulverem subtilissimum contriti, libram . . . . p. 8.
Cum *Carbonis lignei* uncia sesquialtera . . . . p. 1.
et *Hordei farinæ* unciis tribus . . . . . . p. 2.
intime commiscetur et in crucibulo fictili, inde replendo, sub tegmine minoris crucibuli, Carbone contrito repleti, igne validissimo per horæ spatium vel amplius uritur. Crucibulo refrigerato et carbone rejecto, Sulphuretum baryticum cum
Aquæ destillatæ fervidæ libris tribus . . p. 24.
in vase clauso, sæpius agitando, per horæ dimidium digeritur, et liquor ab insolutis colo separatur, quæ Aquâ destillatâ fervidâ abluenda sunt. Liquidis conjunctis caute instillatur
Acidi hydrochlorici
quantum ad saturandum requiritur. Tum liquor, post digestionem ad Sulphidum hydricum fugandum, ad siccum vaporat, massa residua in crucibulo per horæ dimidium uritur et postremo in Aquæ destillatæ ferventis sufficiente quantitate solvitur; solutio, etiamnunc fervida, per chartam colatur et loco frigido, ut crystalli formentur, seponitur. Liquidum remanens exhalatione minuitur, ut crystalli iterum formentur.

CHLORETUM CALCICUM.

Murias calcicum vel Calx salita.

Massa calcarea, quæ post præparationem Ammoniaci caustici remanet,
Acido muriatico crudo

Rx. Chloret. ferr. Ammon. ʒj
Extr. Conii ℈j
F rad Althea qu. s. f. pil. No:
LX.

#

Rx. Chlor. ferr. Ammon.
Extr. Carduí Benedict. aa ʒj
F fol. Card. Bened. qu. sat. f pil
No 120 Cx 4p. 4dd.

saturatur. Solutio colata ad siccum vaporat, et massa sicca in crucibulo igni exponitur, donec omnis effervescentia cesset. Tum ignis augetur, ut quiete fluat massa liquata, quæ super laminam ferream effunditur et, quum etiamnunc calida in frustula est deminuta, in vase bene clauso servatur.

CHLORETUM FERRICO-AMMONICUM.

Murias ammonico-ferricum.

Sal ammoniacum martiale.

Chloreti ferrici uncia una . . . . p. 1.
et *Salis ammoniaci depurati* unciæ sex . . . p. 6.
in *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate solvuntur; solutum, per chartam colatum, inter continuam agitationem, præsertim sub finem, in vase porcellaneo vaporat ad siccum. Servatur in vase bene clauso.

CHLORETUM FERRICUM.

Murias ferricum.

Rec. *Hæmatitæ præparati* quantum placet,
Acidi hydrochlorici triplum podus.

Digeruntur in phiala vitrea vel potius in retorta vitrea, excipulo adaptato, ut destillatum in retortam refundi possit, donec acidum saturatum sit. Liquidum rubicundum, colatione separatum ab Hæmatite non soluto, in patina porcellanea, evaporando ope balnei vaporis, ad syrupi tenuioris spissitudinem redigitur; tum patina, laminâ vel campanâ vitreâ tecta, in locum frigidum et humidum per hebdomadas vel menses seponitur, donec crystalli, in massam aurantiacam concretæ, crescere desinant, quæ muriâ liberatæ in lagena sicca, probe obturanda, servantur.

☿ CHLORETUM HYDRARGYRICUM CORROSIVUM.

Murias hydrargyricum corrosivum.

Mercurius corrosivus albus sublimatus.

Rec. *Hydrargyri destillati* uncias sex, ... p. 2.
Acidi Vitrioli uncias novem . . . . . . p. 3.

In vase porcellaneo decoquuntur ad siccum. Massa sicca pulverata cum

Salis communis siccati et pulverati æquâ portione

intime commiscetur, et e cucurbita vel lagena vitrea, plane sicca, in arenam immersa et ad tertiam tantum partem repleta, fit, calore lenissimo, sublimatio. Massa crystallina, ad superiora cucurbitæ vel lagenæ hærens, a scoriis purgata, caute servatur.

CHLORETUM HYDRARGYROSUM.

Murias hydrargyrosum. Mercurius dulcis. Calomel.

Acidum nitricum dilutum

cum *Hydrargyri destillati* superflua quantitate coquendo digeritur, idque per horæ spatium fit post gasis rubicundi cessationem, vel usque dum solutio flavescere incipiat. Acidum Oxido hydrargyroso saturatum et etiamnunc fervidum

Aquæ destillatæ fervidæ partibus duodecim

et *Acidi nitrici diluti* parte vel dimidiâ vel tantâ diluitur, ut liquor clarus evadat, qui, Aquâ destillatâ affusâ, non turbetur. Hic liquor, mox colatus, solutioni colatæ et ferventi, quæ

Salis communis partem, Hydrargyro soluto pondere æqualem,

in *Aquæ destillatæ* duodecuplo pondere solutam, continet, inter agitandum additur.

Rx Chlor. Hydrargyri corros. gr ß–j
Aqu. Rosar. ℥iij
T:ra Opii ℈j – ʒß
(Dacryocystoblennorrhe)

Rx Chlor. Hydr. corros. gr j
Opii depur. gr viij
Sol. in Aq. Rosar. ℥ij
S. Till indryppning i ögat (Leucoma)

Rx Chlor. Hydr. corr. gr j
Aqu. Rosar. ℥ij
L. L. Sydenham. ℥iß
Mucilag. G:ae arab. ℥j
S. Anbringas med pensel 2–3 ggr på nyligen uppkomna fläckar på cornea efter scrophulös ophtalmoblennorrhe.

Rx Calomel. gr. v
Opii depur. gr iij
Sacch. alb. ℈j
m. f. p.
(Pannus)

Rx Pulv. Tutiæ
– Sacch. cand.
– Calamulanes āā p.
S. Inblåses morgon & afton med en penna i ögat.
(Leucoma – Derivantia efter pjägg, V.S. Iglar, laxans, setaceum i nacken.)

Quod fundum petit a liquido separatur et, Aquâ destillatâ fervidâ diligentissime elotum, in charta bibula leni calore siccatur.

CHLORETUM STIBICUM.

Murias stibiosum. Butyrum Antimonii.

Rec. *Sulphureti stibici præparati,*
Acidi Vitrioli, singulorum partes æquales.

In patina porcellanea miscentur et ope caloris ad siccum usque rediguntur. Quæ restat massa albida vel cinerea cum

Salis communis, siccati et in pulverem redacti,
duplo pondere

commiscetur et in retortam vitream immittitur, ex qua, adaptato excipulo sicco, fit in balneo arenæ destillatio; interea cavendum, ne retortæ collum, si major admoveatur frigoris vis, destillato obstruatur. Destillatum, quod producitur, in vase vitreo, epistomio vitreo instructo, asservatur.

CHLORETUM ZINCICUM.

Rec. *Acidi hydrochlorici* quantum placet.
Additur huic per vices

Zinci laminati vel granulati tantum, ut, cessante effervescentiâ acidoque saturato, copia quædam Zinci intacta supersit. Liquor, per colum trajectus, calore vaporat, donec refrigeratione concrescat in massam salinam, quæ statim in vitro sicco et probe clauso servatur.

CINNABARIS PRÆPARATA.

Præparatur *Cinnabaris rubra* ut Bolus præparata.

CONDITUM AURANTII.

Aurantiorum cortices in *Aquam fluvialem* fervidam immerguntur, donec mollescant, ita ut culmo secalino perforari queant. Tum cortices, ab albedine mundati, cribro subverso imponuntur, ut a humore superfluo liberentur. In vas vitreum jam inditis affunditur *Syrupus Sacchari*, qui eos contegat. Post diem unum alterumve eximuntur cortices, qui syrupo, modico calore spissato atque refrigerato, iterum immerguntur et post aliquot dierum macerationem denuo eximuntur. Syrupus residuus, cum *Saccharo* iterum ad justam spissitudinem redactus, postea corticibus affunditur, ut hos tegat.

Si e corticibus recentibus paratur conditum, maceratione non opus est.

CONFECTIO CINÆ.

Rec. *Cinæ levanticæ*, a stipitibus aliisque quisquiliis optime mundatæ, partem unam.

Cacabo aheneo, amplo, super lenissimum ignem suspenso, immissa affunduntur sensim

Sacchari albi, ad consistentiam tabulati cocti, partes quattuor vel quantum sufficit,

cacabum interea assidue agitando et massam spathulâ ligneâ probe intermiscendo. Semirefrigerata manu leviter terintur, ut globuli minuti formentur, donec omnia sicca appareant; tum partes pulverulentæ et semina, non satis incrustata, cribri ope ab incrustatis separantur, quæ servanda sunt. Cetera in cacabo,

denuo mundato, eodem modo tractantur, donec saccharo rite obducta sint.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

Cochleariæ Herbæ, minutim sectæ et diligenter contusæ, admiscetur *Sacchari albi* pulverati duplum.

CONSERVA ROSÆ.

Conserva Rosæ rubræ.

Rosæ multiplicis petalis recentibus et diligenter contusis admiscetur *Sacchari albi* pulverati par pondus.

CORALLIA PRÆPARATA.

Præparatur *Corallium rubrum* eodem modo, quo Bolus præparata.

CORNU CERVI USTUM PRÆPARATUM.

Cervi cornua in fornace comburuntur, donec penitus albescant; deinde statim præparantur eodem modo, ac Bolus præparata, et in vase bene clauso servantur.

Præparatum ejusdem indolis fit etiam ex *Ossibus Pecorum*.

CRETA PRÆPARATA.

Præparatur eodem modo, quo Bolus præparata, *Creta albissima*.

CYANETUM FERRICO-FERROSUM.

Cœruleum Berolinense.

Rec. *Chloreti ferrici* uncias tres, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras quinque . . . . . p. 20.

Fit solutio, cui colatæ, additur partitis vicibus solutio colata, e
Kali zootico
et *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate confecta, quamdiu præcipitatum cœruleum prodit; cavendum tamen, ne excedat Kali zooticum. Liquor, inter præcipitandum bene agitatus, per horas viginti quattuor seponitur, quibus præterlapsis, quod limpidum est defunditur; præcipitatum vero in vase alto *Aquâ destillatâ*, sæpius affusâ et subinde post quietem defusâ, perfecte elotum colo colligitur et siccatur. In pulverem redactum in vase, bene clauso, servatur.

☿ CYANETUM KALICUM.

Rec. *Kali zootici*, in pulverem redacti, uncias duas, p. 4.
Acidi sulphurici destillati,
Aquæ destillatæ, singulorum unciam . . . p. 2.

Sali, retortæ vitreæ tubulatæ indito, miscela refrigerata Acidi et Aquæ superfunditur, et fit, calore balnei *Chloreti calcici*, destillatio, quamdiu prodit acidum hydrocyanicum, quod per tubum vitreum incurvum, ad collum retortæ rite adaptatum, in lagenam perducitur, cui inest solutio clara, e
Hydratis kalici uncia . . . . p. 2.
et *Spiritus concentrati* unciis tribus et semis p. 7. confecta; quod dum fit, tubus et lagena sollicite sunt refrigeranda. Quæ, destillatione finitâ, lagenæ insunt crystalli, super colum papyraceum colliguntur, Spiritu concentrato eluuntur et, inter chartæ plagulas

Rx. Cyanet. ferrici-ferros. gr jv
Pulv. rad. Calami gr viij
Rhei rad. gr ij
Extr. intern. in Chloros.

Decoct. alb. Sydenhami
R. Corn. Cerv. Ras.
Mica panis albi aa ℥ij
Coque c. aqu. Lb v. ad rem. Lb iij
adde Syrup. Citri c. Succo.
q. s. Dr Zebendryck.

Decoctum album nosocom.
R. Corn. Cerv. rasp. ℥ij
Panis Tritic. ℥iß
Coque c. aqu. Lb iv ad reman.
Lb ij

Decoct. Cinchon. Acid
R. Cort. Cinch. flav. contus. ℥j
Acid. Sulphur. dilut. ℥ij
Aqu. Fontan. Lb iß
Coque ad Colatur. Lb j

Decoct. Cinchon. Alkali
Rx. Pulv. Cort. Cinchon. flav. ℥j
Coque c. Acet. commun. Lb j ℥jv ad
reman. Lb j. Adde
Carb. Kalic. depur. q. s. ad satur. and.
℥vj.

quam citissime siccatæ, in vase optime clauso servantur.

DECOCTA.

Parantur (nisi aliud expressis verbis præscribitur) in vasis cylindricis altis, e stanno puro vel massa porcellanea confectis. Hæc vasa tegenda sunt operculo, cui est foramen, per quod tubus pure stanneus prope ad fundum demitti possit. Jam vero, ubi decoctum est præparandum, substantiæ, pro diversa singularum indole comminutæ, tantâ Aquæ destillatæ ferventis copiâ humectantur, quantâ opus est, ut, operatione peractâ, præscriptam habeas decocti quantitatem; tum, operculo admoto, vapores aquæ, in apparatu idoneo bullientis, per tubum deducuntur, ita ut liquor in vase ferveat.

Post horæ qvadrantem, operculo tuboque sublatis, decoctum etiamnunc calidum exprimendo colatur. At vero, si colatura pondus præscriptum non expleat, residuum aquâ calidâ humectandum est atque iterum exprimendum, ita ut colatura habeatur ponderis debiti.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

Rec. *Althææ radicis* incisæ drachmas tres . . p. 1.
Fit decoctum libræ dimidiæ . . . . p. 16.

DECOCTUM CINCHONÆ.

Rec. *Cinchonæ corticis* (ubi nil certi statuitur, *Cinchona regia* adhibenda) contusi unciam. p. 1.
Fit decoctum unciarum decem . . . . p. 10.

DECOCTUM GUAJACI COMPOSITUM.

Decoctum Lignorum.

Rec. *Liquiritiæ radicis* incisæ drachmas duas, p. 1.
Saponariæ radicis incisæ unciam dimidiam, p. 2.
Juniperi ligni rasi unciam, ... p. 4.
Guajaci ligni rasi unciam unam et semis. p. 6.
Fit decoctum librarum trium . . . . p. 144.

DECOCTUM HORDEI.

(Tisane commune)

Rec. *Graminis radicis* incisæ drachmam, . . . p. 1.
Hordei crimnorum, aquâ calidâ aliquoties elotorum, drachmas tres . . . . p. 3.
Fit decoctum libræ unius . . . . p. 96.

DECOCTUM HORDEI ACIDULUM.

Rec. *Oxymellis* unciam dimidiam, ... p. 1.
Decocti Hordei libram . . . . p. 24.
Miscentur.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

Rec. *Sarsaparillæ radicis*, minutissime incisæ, uncias tres . . . . p. 1.
Coquendo per horam fit decoctum librarum duarum . . . . p. 8.

Rp. Decoct. Cinchon. ℥viij
Extr. Absinth. ℈iv
F. 2m. 4dd.

Decoct. Guajaci

Rp. Lign. Guajaci ras. ℥j
Stipit. Dulcamar. ℥ß
Cort. Mezerei
Rad. Glycyrrhiz. aa ℥j
Coque per horam c. aqu. fluv.
qu. sat. ad Colaturam Lbij.

Dec. Guajac. Alkalin.

Rp. Lign. Guajac. ras. ℥ij
Carbon. Kalici depur. ℥j
Coque per horam c. Aqu. fluv.
qu. sat. ad Colaturam Lbij.

Decoct. Zeltzii

Rp. Antimon. crud. ℥iv
Aqu. fluviat. Lbxij
Coque per horas IV ad remanent
Lbviij
Deinde per horas XIjeam
Rad. Sarsaparill
— Chinae
— Bardanae aa ℥ij
Gi. Arab. ℥j
Coque ad remanent. Lb vj
Colaturae adde
Muriat. hydrargyri corros gr iij

Decoct. Cinchon. c. Senega — Bougii

Rp. Cort. Cinchon. flav. ℥vj
Radic. Seneg. incis ℥ij
Coque c. aqu. Lbij: ad remanentia
℥viij adde
Syrup. Althea ℥j
Ms. tr.

Decoct. Cinchon. Nitr.

Rp. Cort. Cinchon. contus ℥j
Acid. Nitr. dilut ℨjß
Coque c. Aqu. Hjß ad reman. Hj
cola et adde
Aeth. Nitr. Spir ℨij

Decoctum Pectorale.

Rp. Rad. Columbo incis
Lichen. Island. incis non dep aa ℨiij
Coque c. Aqu ℥xvj ad rem. ℥viij
Sub finem coctionis adde
Semin. Phellandrii ℨjv
Hbæ Conii incis ℨj. Cola

Decoct. Ratanhiæ

Rx. Rad. Ratanhiæ ℥β

Coque c. aqu. font. ℥viij

ad remanent. ℥iv

(Ext. Ratanh. kan ogs. [illegible] ʒj)

S. Mot ymnig Slimbildning -

Decoct. Tarax. c. Levistic

Rx. Rad. Tarax. incis ℥ij

Coqu. c. Aqu. font. q. s. per horam

dimidiam ad Colatur ℔ij

sub finem coctionis adde

Rad. Levistiq. incis. ℥ij

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

Rec. *Mezerei corticis* contusi drachmam et semis, p. 3.
Sassafras radicis rasæ,
Guajaci ligni rasi,
Liquiritiæ radicis incisæ, singulorum unciam dimidiam, ... p. 8.
Sarsaparillæ radicis, minutissime incisæ, uncias quattuor . . . . p. 64.

Fit, coquendo per horam, decoctum unciarum viginti et quattuor . . . . p. 384.

DECOCTUM ZITTMANNI FORTIUS.

Rec. *Sarsaparillæ radicis*, minutissime incisæ, libram, ... p. 96.
Aquæ destillatæ libras septuaginta duas. p. 6912.

Digeruntur per horas viginti quattuor. Immissis deinde

Cinnabaris rubræ pulveratæ drachmâ, . p. 1.
Chloreti hydrargyrosi drachmis quattuor, p. 4.
Aluminis crudi pulverati,
Sacchari albi pulverati, singulorum drachmis sex, ... p. 6.

commixtis et sacculo linteo inclusis, in vase fictili vitreato decoquuntur ad remanentiam librarum viginti quattuor (p. 2304); additis sub finem coctionis

Anisi seminum,
Fœniculi seminum, singulorum drachmis quattuor, ... p. 4.
Liquiritiæ radicis incisæ unciâ unâ et semis, p. 12.
Sennæ alexandrinæ unciis tribus . . . . . p. 24.

Exprimendo colatum, a sedimento defunditur decoctum et in lagenas, unius libræ capaces, datur.

DECOCTUM ZITTMANNI MITIUS.

Rec. *Residui Decocti Zittmanni fortioris,*
Sarsaparillæ radicis, minutissime incisæ, uncias sex, ... p. 16.
Aquæ destillatæ libras septuaginta duas. p. 2304.

Decoquuntur in vase fictili vitreato ad remanentiam librarum viginti quattuor (p. 768); additis sub finem coctionis

Cardamomi minoris seminum,
Cinnamomi ceylanici corticis,
Flavedinis Citri, singulorum contusorum drachmis tribus, ... p. 1.
Liquiritiæ radicis incisæ drachmis sex . . p. 2.

Colatura, exprimendo facta, a sedimento defunditur et in lagenas, librarum duarum capaces, datur.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

Pulvis cordialis.

Rec. *Olei Cassiæ* guttas sedecim,
Cinnabaris rubræ pulveratæ drachmas duas, p. 1.
Sacchari albi pulverati unciam. . . . . . . p. 4.

Miscentur terendo et in vase, bene clauso, servantur.

Eodem modo parantur, sed non nisi usu urgente et sine addita Cinnabari, e *reliquis Ætheroleis, Elæosacchara.*

ELATERINUM.

Rec. *Elaterii albi* quantum vis,
Spiritus concentrati triplum pondus.

Digeruntur in vase clauso per nycthemeron; residuum non solutum, a solutione spirituosa colando separatum, cum nova Spiritus copia iterum digeritur, quæ colatur. Liquores spirituosi in balneo aquæ ad

Electuar. Cinchon. Compos.

Rx. Cort. Cinchon. flav. pulverat.
Bitartr. Kalic. depur. āā ℥j
Syrup. Juniperi ℥ii
Mr. Dr.

Electuar. Digestivum.

Rx. Elect. Sennæ ℥iß
Cremor. Tartari ℥vj
Subcarb. ferric. ferros. ℥iij
~~Radicis~~ Rhei ℥j
Syrup. commun. qu. sat. ut f. Electuarium

Rx. Elect. Sennæ # ℥j
Cremor. Tartar. ℥iß
Subcarb. ferric. ferros
Rad. Rhei pulv. āā ℥iß
Syrup. Zingiber. qu. s.

Electuarium Cinchon. Compos. D.

Rx. Cort. Canell. alb. ʒiß
Sal. ammon. dep.
Rad. Rhei Indic. āā ℥ij
Cort. Cinchon. Reg. ℥ij
Syrup. commun. q. s. (℥ij) ut fiat Elect.

syrupi spissitudinem vaporando rediguntur et, etiamnunc calentes, in *Aquam destillatam* bullientem infunduntur. Quæ inter refrigerationem aquæ deponuntur crystalli, primum *Aquâ destillatâ* frigidâ, dein *Æthere* lavandæ sunt, siccandæ et servandæ.

ELECTUARIA.

Enixe terendo parata in vasis vitreis vel figulinis natro vitreatis vel porcellaneis, bene obturatis, loco frigido reponuntur.

ELECTUARIUM MANNÆ.

Rec. *Mannæ electæ,*
Sacchari albi pulverati,
Aquæ Fœniculi, singulorum uncias duas. p. 16.
Mixta exprimendo colantur; deinde admiscentur
Iridis florentinæ radicis, in tenerrimum pulverem tritæ, drachma, ... p. 1.
Olei Amygdalarum recentis uncia. . . . . p. 8.

ELECTUARIUM MYRRHÆ COMPOSITUM.

Rec. *Myrrhæ electæ,*
Sanguinis Draconis,
Catechus, singulorum pulveratorum drachmas tres, ... p. 3.
Saponis albi hispanici rasi unciam . . . . p. 8.
Teruntur in mortario vitreo vel lapideo cum sufficiente *Spiritus diluti* quantitate, ut fiat massa uniformis, spissitudinis extracti mollioris; deinde adduntur
Caryophyllorum pulveratorum uncia, . . . p. 8.
Mellis depurati unciæ quattuor. . . . . . p. 32.
Miscentur, bene iterum triturando.

ELECTUARIUM SCORDII.

loco Diascordii.

Rec. *Opii levantici* drachmam unam et semis, p. 3.
Tormentillæ radicis,
Pechurim fabarum,
Catechus, singulorum uncias duas, . . . p. 32.
Scordii herbæ uncias tres, ... p. 48.
Mellis depurati uncias viginti et octo. p. 448.

Opium, cum *Vino de Malaga* tritum, additur Melli paullulum calefacto, cui cetera, in pulverem redacta, admiscentur.

ELECTUARIUM SENNÆ.

loco Electuarii lenitivi.

Rec. *Coriandri seminum* pulveratorum unciam dimidiam, ... p. 1.
Sennæ alexandrinæ pulveratæ uncias quattuor, p. 8.
Syrupi Sacchari uncias octo, ... p. 16.
Pulpæ Tamarindorum depuratæ libram. p. 24.

Miscentur.

ELIXIR AMARUM HJÆRNERI.

Rec. *Specierum amararum Hjærneri* uncias tres, p. 1.
Spiritus diluti libras duas. . . . . p. 8.

Per triduum inter agitandum digesta colantur.

℞. Electuar. Sennæ ℥j
Aqu. M. piper ℥iv
Fr. 1m. 41. (Emvia diarrheer).

<u>Electuar. Oleosum.</u>
℞. Sulphat. Natrii
Ol. Lini frigid express. aa ℥ij
Mellis commun. ℥j
Mr. Dr.

ELIXIR STOMACHICUM TEMPERATUM HOFFMANNI.

Elixir viscerale vinosum Hoffmanni.

Rec. *Extracti Absinthii*,
Extracti Cardui benedicti,
Extracti Centaurii minoris,
Extracti Gentianæ, singulorum unciam dimidiam, ... p. 1.
Tincturæ Aurantii unciam, ... p. 2.
Flavedinis Aurantii concisæ uncias duas, p. 4.
Vini de Malaga libram . . . . p. 24.
Per triduum inter agitandum digesta colantur.

EMETINA.

Rec. *Ipecacuanhæ radicis* pulveratæ partem unam,
Aquæ destillatæ, *Acido sulphurico destillato* paullum acidulatæ, partes sex.

Per diem noctemque inter agitandum digesta et deinde refrigerata colantur. Colatura, additâ

Calcis ustæ, affusâ Aquâ, primum in hydratem, dein in pultem conversæ, parte unâ,

ope balnei vaporis ad siccum redigitur; massa sicca et pulverata cum

Spiritu concentrato

decoquitur, quamdiu aliquid ab eo solvatur, quod colatum, destillando et vaporando, ad formam siccam est redigendum.

Quæ sic obtinetur Emetina, minus pura, in parva quantitate *Aquæ destillatæ*, *Acido sulphurico destillato* acidulatæ, solvenda est, coquendo cum *Carbone animali* a materia colorante liberanda et e solutione colata, vaporando concentrata, ope *Ammoniaci caustici* præcipitanda. Quod fundum petit, colo colligi-

tur, Aquâ destillatâ frigidâ eluitur et siccatum in vase, bene clauso, servatur.

EMPLASTRA.

Parantur emplastra partibus, quibus conficiuntur, ad temperaturam + 100° C. haud superantem, liquefaciendis ac miscendis; ubi major caloris vis in emplastro quodam conficiendo requiritur, ibi in formula ejus id expressis verbis præscriptum invenies.

Parata vel in capsulis refrigerantur vel, si id non præscriptum fuerit, etiamnunc mollia manibus, bene lotis et aquâ humectandis, in magdaleones formantur et in cistulis vel ligneis vel e ferro laminato albo confectis atque, quantum fieri potest, clausis, servantur loco frigido nec humido.

Illa, quæ substantias herbaceas, Extracta vel Cantharides continent, priusquam servantur, aëris tepidi contactu siccanda sunt, ne mucorem contrahant.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

Rec. *Cerussæ albæ* libram dimidiam, ... p. 2.
Lithargyrii præparati libram sesquialteram, p. 6.
Olei Olivarum communis libras tres . . . p. 12.

In aheno capaci mixta ad modicum ignem, spathulâ continue agitando et Aquam destillatam fervidam subinde cauteque admiscendo, coquuntur, ut fiat emplastrum, cui, post humidi consumtionem, admiscentur

Resinæ flavæ liquatæ et colatæ unciæ novem . . . . p. 3.

Emplastr. Anodyn. Hoffman.

Rec. Empl. Saponac.
Ceræ flavæ āā ℥j
Colliquat. et. semi refrigerat.
adde
Ol. Tartar. faetid ℈iv
Pulv. opii crudi ℥j
Camphor. depur. ℈ij
dissolut. in
Ol. Hyoscyam. Inf ℈iv
Mr. f. Emplastr.

EMPLASTRUM ASSÆ FOETIDÆ COMPOSITUM.

Emplastrum foetidum.

Rec. *Ceræ flavæ* uncias duas, ... p. 2.
Emplastri plumbici uncias novem. . . . . p. 9.
Simul liquefactis et paullum refrigeratis cribrando admiscentur
Assæ foetidæ,
Galbani, singulorum pulveratorum unciæ quattuor. . . . . p. 4.
Fit emplastrum.

EMPLASTRUM CALAMINÆ.

Emplastrum e Calaminari lapide.

Rec. *Sevi bubuli curati*,
Terebinthinæ communis, singulorum drachmas sex, ... p. 3.
Ceræ flavæ uncias duas et semis, ... p. 10.
Emplastri plumbici libram . . . . p. 48.
Liquefactis et colatis adjicitur
Calaminæ præparatæ libra; . . . . p. 48.
quibus mixtis fit emplastrum.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM.

Emplastrum vesicatorium.

Rec. *Ceræ flavæ*,
Resinæ flavæ,
Sevi ovilli, singulorum uncias quattuor. p. 2.
Liquefactis et colatis inter agitationem perpetuam sensim et exacte admiscentur
Cantharidum recenter et subtilissime pulveratarum unciæ sex . . . . p. 3.

Per horæ quadrantem liquata habentur et inter agitandum refrigerantur.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM CAMPHORATUM.

Rec. *Camphoræ depuratæ,* cum guttulis *Olei Olivarum* terendæ, scrupulum, ... p. 1.
Emplastri Cantharidum unciam . . . . . . p. 24.
Miscentur. Paratur ex tempore.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM CUM EUPHORBIO.

Emplastrum vesicatorium perpetuum Janini.

Rec. *Terebinthinæ venetæ,*
Mastiches pulveratæ, singularum uncias sex. p. 6.
Liquatis et colatis admiscentur
Euphorbii pulverati uncia, ... p. 1.
Cantharidum pulveratarum unciæ duæ . . p. 2.
Fit emplastrum.

EMPLASTRUM CERÆ.

Emplastrum citrinum.

Rec. *Resinæ flavæ* libram dimidiam, ... p. 1.
Sevi bubuli curati,
Ceræ flavæ, singulorum libram cum dimidia. p. 3.
Simul liquefacta et colata in capsulis refrigerantur.

Rec. Emplast. Conii
— Hydrargyri
— Diachyl. Comp. āā ℥j
f. Empl. S. Påläggés öfver nat-
ten (vid Dacryadenitis etc).

#

Rec. Empl. Conii ℥j
— Belladonnæ ℥j
— Cerussæ ℥ij
f. Empl. (Hordeolum)

Emplastr. Stibiat. Nos.

Rec. Empl. Picenuos ℥iß
Resin. Pini ℥ß
Terebinth. Venet. ℥ij
Tartr. Stibii. kal. ℥j
M. s. l. art. ut f. Empl.

Emplastrium Irritans

Rec. Empl. Hjernari
— Picis āā ℥ß
— Janini ℥ij
Mr. f. Empl.

EMPLASTRUM CONII.

Rec. *Ceræ flavæ* uncias tres, ... p. 3.
Emplastri plumbici libram. . . . . p. 12.
Liquefactis et mixtis admiscentur
Extracti Conii spirituosi unciæ duæ. . . . p. 2.
Fit emplastrum.

EMPLASTRUM GUMMI AMMONIACI SCILLITICUM.

Rec. *Gummi ammoniaci* pulverati libram, . . . p. 1.
Aceti Scillæ libras duas . . . . p. 2.
Gummi ammoniacum cum Aceto Scillæ diluitur et liquidum in vase fictili vitreato vel porcellaneo inter continuam agitationem evaporat, donec justam habeat spissitudinem.

EMPLASTRUM GUMMI-RESINOSUM.

Emplastrum gummosum.

Rec. *Ceræ flavæ* libram dimidiam, ... p. 1.
Emplastri plumbici libras tres . . . . p. 6.
Simul liquefactis, ab igne remotis et paullum refrigeratis, cribrando admiscetur
Gummi ammoniaci,
Galbani, singulorum pulveratorum libra dimidia, ... p. 1.
ut omnium unitas fiat.

EMPLASTRUM HJÆRNERI.

Emplastrum saponaceo-plumbicum.

Rec. *Cerussæ albæ* pulveratæ uncias novem, p. 18.
Saponis albi hispanici uncias decem, . . p. 20.
Minii pulverati libram et semis, ... p. 36.
Olei Olivarum communis uncias quadraginta et quinque . . . . p. 90.

Sapo rasus in oleo liquatur; quo facto pulveres, cum oleo mixti, igni admoventur, usque dum soluti sint et massa colorem castaneum obtinuerit; tum demum adjicitur

Terebinthinæ communis uncia cum dimidia, p. 3.

et fit emplastrum.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

Rec. *Axungiæ curatæ* drachmas duas, ... p. 2.
Terebinthinæ venetæ drachmas novem, . . p. 9.
Hydrargyri uncias tres . . . . p. 24.

Hydrargyro cum Terebinthina, donec majores Hydrargyri globuli evanuerint, contrito additur Axungia, quo facto omnia ad plenam Hydrargyri exstinctionem conteruntur; tum subigendo cum

Ceræ flavæ uncia una et semis, ... p. 12.
Emplastri plumbici unciis sex, ... p. 48.

simul liquatis, in unum coguntur.

EMPLASTRUM HYOSCYAMI.

Ut Emplastrum Conii ex *Extracto Hyoscyami spirituoso* paratur.

EMPLASTRUM MELILOTI.

Rec. *Olei Olivarum communis* uncias octo, . . p. 2.
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singularum libram . . . . . . p. 3.

Colliquatis colatisque ac paullum refrigeratis admiscentur

Meliloti herbæ pulveratæ unciæ sedecim. p. 4.

Fit emplastrum.

Rc. Emplastr. Hydrargyri ℥ß
Sulphat. Quiniæ gr x.
f. Empl. S. Att lägga öfver
en efter passa uppdrifven mjelte.

<u>Emplastr. Opiatum Nos.</u>
Rc. Opii Levant. ʒ
Extract. Belladonnæ āā ℈j
Emplastr. Sapon. ℥iv
M. f. l. a. Empl.

Rec. Empl. Picis ʒj
Camphor. ʒj
f. Empl. Lr. Läggs på regio
epigastrica i fossa.

EMPLASTRUM PICIS.

Rec. *Terebinthinæ venetæ* uncias quattuor, . . . p. 4.
Ceræ flavæ uncias octo, ... p. 8.
Picis solidæ uncias sedecim, ... p. 16.
Resinæ flavæ uncias viginti tres . . . . . p. 23.

Simul liquata colantur et in capsulis, oleo unctis, refrigerantur.

EMPLASTRUM PLUMBICUM.

Emplastrum Oxidi plumbici vel commune.

Rec. *Lithargyrii præparati* partem unam, . . . p. 1.
Olei Olivarum communis partes duas. . . p. 2.

In aheno capaci mixta, spathulâ continue agitando et Aquam destillatam ferventem, ne humidum deficiat, subinde cauteque instillando, coquuntur ad modicum ignem, donec emplastrum factum sit.

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

Emplastrum saponatum.

Rec. *Saponis albi hispanici* uncias tres, ... p. 1.
Emplastri plumbici libras duas. . . . . . . p. 8.

Simul liquata igni admoventur, usque dum colorem castaneum acceperint.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

Emplastrum aromaticum.

Rec. *Terebinthinæ communis* unciam, ... p. 8.
Sevi ovilli curati uncias tres, ... p. 24.
Ceræ flavæ uncias quattuor. . . . . p. 32.

Colliquatis colatisque ac semirefrigeratis immiscentur
Ætherolei Menthæ piperitidis,
Ætherolei Caryophyllorum, singulorum drachma, ... p. 1.
Olei Nucis moschatæ drachmæ sex, . . . p. 6.
Benzoës amygdaloidis pulveratæ uncia, . p. 8.
Olibani pulverati unciæ duæ. . . . . p. 16.
Fit emplastrum in vase, probe clauso, servandum.

EMPLASTRUM ZINCICO-PLUMBICUM.

Emplastrum diapompholygos.

Rec. *Olei Olivarum communis* uncias sex, . . p. 12.
Ceræ flavæ libram unam. . . . . p. 24.
Colliquatis subigendo admiscentur
Olibani pulverati uncia una et semis, . . p. 3.
Oxidi zincici unciæ tres, ... p. 6.
Cerussæ albæ pulveratæ unciæ quattuor, p. 8.
Graphitæ pulverati unciæ sex. . . . . p. 12.
Fit emplastrum.

EMULSIONES.

Quum, in emulsionibus parandis, materiæ emulgendæ cum liquido quodam diluendæ sunt, hoc tali modo efficitur, ut in mortario lapideo cum liquidi pauxillo primum in pultem mollem terantur, cui deinde, quæ superest liquidi pars, inter triturandum sensim additur.

Omnes ex tempore parantur.

EMULSIO

Mucilago Camphorat. Nov.

Rec. Camphor. depurat. ℈j

(Part. Amygdalar. ʒss)

Teritur c.

Mucilag. Gmi Arab. ℥iij

Sensim adde

Aqu. Fontan. ℔j

Mr. ft Sr.

EMULSIO AMYGDALINA.

Emulsio communis.

Amygdalæ dulces Aquâ fervidâ infunduntur; deinde, post horæ quadrantem, vel quum, inter digitos leviter pressæ, cuticulam facile amittant, decorticantur.

Amygdalarum ita decorticatarum uncia una et dimidia . . . . p. 3.
una cum *Sacchari albi* pulverati uncia, sensim addenda, ... p. 2.
in mortario lapideo, affundendo *Aquæ destillatæ* unciam circiter unam et contundendo, in massam penitus pultaceam redigitur, cui inter triturationem additur

Aquæ destillatæ tantum,
ut fiat, lenissime exprimendo, colatura libræ unius (p. 24).

EMULSIO ASSÆ FOETIDÆ.

Mixtura Assæ foetidæ.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ drachmas duas, p. 1.
Aquæ Menthæ piperitidis uncias quattuor. p. 16.
Terendo fit emulsio.

EMULSIO CAMPHORATA.

loco Mucilaginis camphoratæ.

Rec. *Camphoræ depuratæ* grana sex, ... p. 1.
Gummi arabici pulverati drachmam dimidiam, p. 5.
Emulsionis amygdalinæ uncias sex. . . p. 480.
E contritis fit emulsio.

EMULSIO CANNABINA.

Rec. *Sacchari albi* pulverati unciam dimidiam, p. 1.
Cannabis seminum unciam et semis. . . p. 3.
Fit, ut de Emulsione amygdalina præscriptum est, emulsio libræ unius. . . . . p. 24.

EMULSIO CORNUS CERVI USTI.

Decoctum album.

Rec. *Cornus Cervi usti præparati*,
Gummi arabici, singulorum unciam dimidiam, p. 1.
Aquæ destillatæ libram. . . . . p. 24.
Paullum ebulliunt. Refrigeratis admiscetur
Syrupi Amygdalarum uncia dimidia. . . p. 1.
Datur sine colatura.

EMULSIO GUAJACINA.

Mixtura Gummi Guajaci.

Rec. *Gummi arabici* pulverati drachmam, . . . p. 1.
Guajaci resinæ pulveratæ drachmas duas, p. 2.
Sacchari albi pulverati drachmas sex. . . p. 6.
Optime contritis additur sensim
Aquæ Menthæ piperitidis tantum,
ut fiat emulsio libræ dimidiæ. . . . . p. 48.

EMULSIO GUMMOSA.

Emulsio Gummi arabici.

Rec. *Gummi arabici* pulverati drachmas duas, p. 1.
Emulsionis amygdalinæ uncias sex. . . . p. 24.
Terendo miscentur.

Emulsio Ceræ

R. Ceræ alb. ℥ij
Pulv. Gum̄i Arab. ʒvj
Decoct. Altheæ ℔j
Mr Dr. fr.

Emulsio Gummosa

R. Gum̄i Arab. ʒss
solv. in
Aqu. fervid ℥ij
adde
Emulsion. papav. ℔j
Mr.

Linctus oleos. Nosocom.
Mucilag. & Emulsio oleosa
Rp. Gummi Arab. ℥j
j. Aq. Am. Amar. / dil.
Aqua Cerasi ℥j
Ol. olivar. alb. ℥iij
Syrup. Althea sive
Aqu. Aurantii praeparat.
℥iv
M. l. a. f. Linctus

Emulsio Papaveris
Rp. Semin papav. ℥iß
in mortario marmor. contus.
sensim adde Aq. fontan. qu.
s. ut f. Colatura ℔j
cui adde
Sacchar. alb. ℥iij
Mr. Dr.

Emulsio Therebinthinacea
Rp. Atherol. Thereb. ℥j
Vitell. ovor. N: ij
Mucilag. G: Arab. ℔ß
Aqua fluviat ℥ij
Mr. Dr. / Therbed 3-4 dd.

Rp. Emulsion. Thereb. ℥iv
Camphor. depur. gr. XXjv (24)
Mr. Dr. b. / 1h. / 1t.
Pneumon. c. hepat.

Emulsio Therebenth. Malmster.
Rp. Atherol. Thereb. dep. ℥j
Vitell. Ovorum N: ij
Aqu. destill.
Mellis dep. āā ℥jv.
M. f. l. a. Emulsio.

EMULSIO GUMMI AMMONIACI.

Lac ammoniacum.

Fit eodem modo, ac Emulsio Assæ foetidæ, e *Gummi ammoniaco* pulverato.

EMULSIO HYDROCYANICA. ☿

Rec. *Amygdalini* grana duodecim, ... p. 1.
Emulsionis amygdalinæ uncias duas . . . p. 80.
In lagena claudenda miscentur et per horam, interdum quassando, macerantur.

EMULSIO MYRRHÆ FERRATA.

loco Mixturæ Myrrhæ Griffithi.

Rec. *Myrrhæ electæ* pulveratæ drachmam. . . p. 12.
Diluitur terendo cum
Aquæ Menthæ piperitidis unciis sex et dimidia. . . . . p. 624.
Dein colatis adduntur
Sulphatis ferrosi scrupulus, ... p. 4.
Carbonatis kalici puri grana viginti et quinque, p. 5.
Syrupi Sacchari drachmæ duæ, ... p. 24.
Tincturæ Lavendulæ aromaticæ drachmæ sex. p. 72.

EMULSIO SALINA.

Rec. *Amygdalarum dulcium* excorticatarum et contusarum unciam, ... p. 8.
Mellis depurati unciam unam et dimidiam. p. 12.
Contrita cum
Aquæ destillatæ tanta copia
diluuntur, ut, solutis in emulsione
Tartratis kalici drachmis tribus, ... p. 3.
fiat colatura libræ unius . . . . p. 96.

ENEMATA.

Quum jubentur, haud cunctanter paranda.

ENEMA COMMUNE.

Rec. *Avenæ crimnorum* uncias duas, ... p. 1.
Aquæ ~~destillatæ~~ fluviales libras duas. . . . . p. 12.

Coquuntur ad colaturam libræ unius (p. 6), in qua solvuntur

Salis communis pulverati unciæ duæ. . . p. 1.

Huic decocto, semper in promptu habendo et in cella servando, quum jubetur Enema, inter quassandum addendæ sunt

Olei Olivarum communis unciæ duæ. . . . p. 1.

ENEMA NICOTIANÆ.

Rec. *Nicotianæ foliorum* comminutorum drachmam unam . . . . p. 1.

Infunduntur cum

Aquæ destillatæ fervidæ unciis octo, . . p. 64.

et per horæ quadrantem inter agitandum macerantur; dein colantur.

☿ ENEMA OPII.

Rec. *Amyli* drachmas duas. . . . . p. 4.

Cum exigua Aquæ copia trituratæ

Aquæ destillatæ ferventis unciis quattuor p. 64.

sensim et inter agitandum admiscentur. Quum in unum coierint, additur

Tincturæ Opii drachma dimidia . . . . . . p. 1.

EXTRACTA.

In extractis, summâ curâ parandis, id agendum, ut aquæ, ubi eâ opus sit, quam minima copia adhibeatur et inter evaporandum ille semper caloris gradus teneatur, quem præbet balneum vaporis. Quum ad justam spissitudinem redacta sunt (sub finem evaporationis, inter continuam cum spathula agitationem), etiamnunc calentia immittuntur in vasa vitrea, post refrigerationem epistomiis vitreis arcte claudenda et loco frigido servanda.

Vasa, in quibus fit evaporatio, porcellanea sint vel e stanno puro confecta.

EXTRACTUM ABSINTHII.

Rec. *Absinthii summitatum*, minutim concisarum, quantum placet.

Cum *Aquæ destillatæ* ferventis sufficiente quantitate in pultem fluidam rediguntur et, in dolio tecto interdum agitatæ, per horas viginti quattuor macerantur. Tum puls illa, sacculis linteis inclusa, prelo exprimitur; residuum vero cum Aquæ destillatæ fervidæ minori, quam antea adhibita fuerit, copiâ in pultis lentæ formam denuo redigitur exprimiturque post duodecim horarum macerationem. Quæ expressa sunt liquida, in vasis figulinis vitreatis vel ligneis per noctem mixta relinquuntur, ut subsidat sedimentum; tum per pannum colantur et ad justam spissitudinem evaporant.

Fit etiam expressio sine sacculis et quidem commodius, prelo in dolium, apte ad id fabricatum, intrante.

☿ EXTRACTUM ACONITI.

Aconiti folia recentia, paullulum concisa, in mortario lapideo contunduntur, sub finem addendo foliorum libris singulis *Aquæ destillatæ* uncias duas, ut fiat massa pultacea, quæ, sacculis linteis inclusa, prelo fortiter exprimitur. Succus inde profectus leni igne ad ebullitionem calefit, per pannum trajicitur et ad syrupi spissitudinem vaporando redigitur.

Hujus succi partibus duabus, in lagenam immissis, *Spiritus concentrati* partes tres adduntur; quæ mixta optime conquassantur et per noctem seponuntur. Tum liquor supernatans primum, postea cetera colo chartaceo, antea madefacto, caute infundenda sunt et Spiritu edulcoranda; quæ vero colando clara facta sunt ad spiritum fugandum destillant. Liquor residuus, denuo colatus, ad extracti spissitudinem vaporat.

☿ EXTRACTUM ACONITI SPIRITUOSUM.

Rec. *Aconiti foliorum siccatorum* partem unam,
Spiritus diluti partes duas.

Folia grandiuscule pulverata in cucurbita vel lagena amplioris orificii per nycthemeron inter agitandum cum Spiritu digeruntur. Expressione forti deinde institutâ, residuo

Spiritus diluti pars una et dimidia

denuo superinfunditur; quæ, iterum digesta, bene exprimuntur. E liquoribus colatis Spiritus destillatione separandus est, et residuum denuo colatum lege artis inspissandum.

☿ EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Paratur e *Belladonnæ foliis*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

Rₑ. Extract. Aconit. (spirit) gr ½ – ij
Phosphat. Calcis stib. gr vj – x.
Sr. 1 p. 2 t.

#

Rₑ. Extract. aconit (spirit) gr xij
solve in
Vini Stib. ℥β x ƒ ℥ij
Sr. 20 drop. 4 dd.

Rₑ. Extract. Belladonnæ spir. gr ⅛.
Sal. Corn. Cerv. gr. viij
Dr. in 1 p^{le} S. 1 p. 3 t.
Vid hyperæstesi af spinalirritation

#

Rₑ. Butyri reg. insulti ℥ij
Extr. Belladonnæ gr vj

#

Rₑ. Extract. Belladonnæ gr j
Bicarbon. Kalici ℈jv – viij
Eleosacchar. Carvi ℈ij
Divide in viij p^{le} (Mot. Cardialgi i Chloros. – Stad. Erethicum af Tabes dorsalis

#

Rₑ. Extr. Belladonnæ ℈j
Aqu. fontan. ℥x
S. Till fomentation (Iritis)

Rₑ. Opii pur. gr viij
Extract. Belladonnæ ℈j
Ungv. Hydrarg. ℥i β x
Sr. Ingnides kring ögat (Iritis)

#

Rₑ. Tᵣₑ. Thebaicæ ℥j
Extr. Belladonnæ gr. v.
Sr. några droppar indryppes i ögat (Iritis)

#

Rₑ. Empl. adhæsiv ℥β x
Extr. Belladonnæ ℈j
M. f. Empl. S. Att lägga i maggropen i Cardialgi Chloros.

EXTRACTUM BETULÆ.

E *Betulæ foliis* recentibus, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM CARDUI BENEDICTI.

Paratur, ut Extractum Absinthii, e *Cardui benedicti foliis.*

EXTRACTUM CASCARILLÆ.

Rec. *Cascarillæ corticis* contusi partem unam,
Aquæ destillatæ ferventis partes tres.

Post unicam ebullitionem lenem exprimendo colantur. Residuum iterum leniter coquitur cum *Aquæ destillatæ* partibus tribus et liquor exprimitur atque colatur; idque iteratur, donec aqua nullum saporem inde trahat.

Liquores, qui singulis ebullitionibus proveniunt, separatim ad syrupi spissitudinem vaporando rediguntur; tunc omnes commiscentur et ad justam consistentiam vaporant.

EXTRACTUM CENTAURII MINORIS.

E *Centaurii minoris summitatibus* paratur eodem modo, quo Extractum Absinthii.

EXTRACTUM CHAMOMILLÆ.

Paratur e *Chamomillæ nostratis floribus* eodem modo, ac Extractum Absinthii.

EXTRACTUM CINÆ.

Rec. *Cinæ levanticæ* pulveratæ quantum placet,
Ætheris sufficientem quantitatem.

In apparatu idoneo, ut de Acido quercitannico jam præceptum est, instructo, Cina Æthere ter quaterve extrahitur. E liquoribus æthereis commixtis et, si opus est, colatis, quod cito et per infundibulum, laminâ vitreâ tectum, fieri debet, Ætheris quinque circiter sextæ partes destillatione evocantur; residuum vero in patina porcellanea vaporando comminuitur, ut fiat extractum.

EXTRACTUM CINCHONÆ.

E *Cinchonæ regiæ cortice* paratur, ut Extractum Cascarillæ.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

Rec. *Colocynthidis pulpæ* uncias quattuor, . . . p. 16.
Aquæ destillatæ libras quattuor. . . . . p. 192.

Modico igne decoquuntur ad dimidium, et humor colatus balnei vaporis calore vaporat, donec in mellis spissitudinem coierit. Tum admiscentur in pulverem tenuem tritorum

Caryophyllorum drachmæ duæ, ... p. 1.
Scammonii aleppensis unciæ duæ, ... p. 8.
Aloës lucidæ unciæ quattuor, ... p. 16.

et miscela, vaporando exsiccata atque pulverata, servatur.

☿ EXTRACTUM CONII.

(Extractum Cicutæ interdum dictum.)

Paratur e *Conii herba recenti* eodem modo, ac Extractum Aconiti.

Rp. Extr. Conii ℈j
Aqu. Cinnamom. spirit ℥iv.
S: 4 dr. 3 dd. för 4 års barn. Stiger
1 dr. hvar dag ända till 25. (Scro-
fulös photophobi)

R. Extr. Conii spirit 3-x
Abo Conii qu. sat. ut. f. pil.
N: 120. Sr. 4p. 4dd (i stejn
de dos.

R. Extr. Pratioka ℈iv / ʒj /
Aqu. Menth. piper. ℥iv
S: 1m. 3ti Mania hypochondri

EXTRACTUM CONII SPIRITUOSUM. ☿

E *Conii herba siccata* paratur, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM DULCAMARÆ.

Paratur e *Dulcamaræ stipitibus*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM ENULÆ.

Rec. *Enulæ radicis*, in pulverem grandiusculum redactæ, quantum placet.

Digerendo cum miscela e
Spiritus diluti
et *Aquæ destillatæ*, singulorum partibus æqualibus bis terve extrahitur. Liquores spirituosi colati, separato destillatione Spiritu, ad extracti spissitudinem rediguntur.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

E *Gentianæ radice* concisa eodem modo paratur, quo Extractum Absinthii; sed Aquâ tepidâ extrahendum est.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI. ☿

Ex *Hellebori nigri radice* incisa paratur, ut Extractum Cascarillæ.

EXTRACTUM HYOSCYAMI. ☿

Paratur ex *Hyoscyami foliis recentibus*, ut Extractum Aconiti.

☿ EXTRACTUM HYOSCYAMI SPIRITUOSUM.

Paratur ex *Hyoscyami foliis siccatis* eodem modo, quo Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

Rec. *Jalappæ radicis* contritæ libram, ... p. 1.
Spiritus concentrati libras quinque. . . . . p. 5.
Macerantur modico calore, inter agitandum, per triduum, et effunditur tinctura. Residuum cum
Aquæ destillatæ libris duodecim . . . . . p. 12.
decoquitur ad colaturam unciarum triginta duarum. Dein tinctura et decoctum, separatim colata, minuuntur, hoc evaporando, illa destillando, donec spissescere incipiant. Postremo, quæ restant, miscentur et, inter assiduam cum spathula agitationem, exsiccantur. Pulveratum servatur extractum.

EXTRACTUM JUGLANDIUM.

Juglandium putamina, mixta cum *Aquæ destillatæ* parva copia, contunduntur in vase lapideo vel ligneo. Liquor inde expressus vaporat, donec mellis spissitudinem habeat.

EXTRACTUM LIQUIRITIÆ.

☿ Ut Extractum Gentianæ e *Liquiritiæ radice* parandum est.

EXTRACTUM LUPULI.

E *Lupuli strobilis* paratur eodem modo, quo Extractum Absinthii.

Rp. Extr. spir. Nicot. gr 1/8. gr 1/4 – 1/2
Bicarbon. Kalic. gr XV.
Pulv. rad. Rhei gr ij
Sacch. alb. pulv. gr x
M. f. pulv. d. t. 4 p. dd.

Rp. Extr. Nuc. Vom. spir. gr viij
— trifol. aquat. ʒj
pulv. rad. Calami qu. sat.
f. pil. N: LXIV. S: 4 p. 3 d.
(Slapphet o atoni i magen, då
maten går oförändrad l. uppkräke
(febr. gastr. nerv.)

#

Rp. Pulv. N. Vom.
Extr. Nuc. Vom. aa ℈j
f. Pil. N: XV. S: 1 p. 2. 3. 4. t.

EXTRACTUM MEZEREI.

Rec. *Mezerei corticis* partem unam,
Spiritus concentrati partes tres.

Cortex, concisus et in mortario ferreo cum exigua Spiritus quantitate contusus, digeritur cum Spiritu per horas triginta sex, vas subinde agitando et sub finem in balneo aquæ paullum calefaciendo. Liquore post refrigerium decanthato, residuum fortiter exprimitur et cum nova Spiritus copia digeritur, donec hic quam minimo sapore inficiatur. Liquores mixti et per chartam colati destillant ad remanentiam sextæ partis, quæ dein vaporat ad extractum.

EXTRACTUM MILLEFOLII.

Paratur e *Millefolii summitatibus*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM NICOTIANÆ. ☿

E *Nicotianæ foliis recentibus*, ut Extractum Aconiti, paratur.

EXTRACTUM NICOTIANÆ SPIRITUOSUM. ☿

Paratur e *Nicotianæ foliis siccatis*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM NUCIS VOMICÆ. ☿

Fit, ut Extractum Mezerei, e *Nucibus vomicis* rasis.

EXTRACTUM POLYPODII.

E *Polypodii radice* paratur, ut Extractum Gentianæ.

EXTRACTUM POMORUM FERRATUM.

v. Tinctura ferri Pomata

Rec. *Pomorum acidulorum* excorticatorum libras duas, ... p. 6.
Limaturæ ferri uncias quattuor. . . . . . p. 1.

In lebete e ferro fuso mixta, aquâ adspersâ, in pultem tenuem rediguntur, quæ, interdum agitata, per dies quattuordecim ad viginti digeritur, aquam evaporatione dissipatam restituendo. Tum tantum *Aquæ destillatæ* affunditur, ut habeas pultem tenuiorem, quæ post aliquot horas, sacculis linteis inclusa, prelo fortiter exprimitur. Residuo, adjectâ aquâ, denuo expresso, liquores juncti, quum seponendo et colando depurati sunt, in vase porcellaneo ad justam spissitudinem rediguntur.

EXTRACTUM RHEI.

Rhei indici radicis, in taleolas minutas dissectæ, pars una
Aquæ destillatæ tepidæ partibus quattuor infunditur. Macerata per nycthemeron, sacculo linteo inclusa, preli ope exprimuntur. Residuo tres Aquæ destillatæ partes affunduntur et, per duodecim horas macerata, iterum exprimuntur. Liquores per chartam, subinde renovandam, colati, ad consistentiam massæ pilularis inspissantur.

☿ EXTRACTUM STRAMONII.

Paratur e *Stramonii seminibus*, ut Extractum Aconiti spirituosum.

EXTRACTUM

Rc. Extr. Taraxaci
Mell. commun.
Tartr. kalici āā ℨj

S. 1 Th. 4. dd. Latwerge
(Syrupus Juniperi)

EXTRACTUM TARAXACI.

E *Taraxaci radice recenti* paratur, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM TRIFOLII AQUATICI.

Paratur e *Trifolii aquatici foliis*, ut Extractum Absinthii.

EXTRACTUM VALERIANÆ.

Paratur e *Valerianæ minoris radice*, granditer pulverata, eodem modo, quo Extractum Aconiti spirituosum.

FARINA HORDEI PRÆPARATA.

Rec. *Hordei farinæ* libras sex.

Immittuntur in sacculum linteum, ita colligandum, ut inter farinam et ligaturam nullum sit spatium. Tum sacculus in aheno cupreo, stanno obducto et aquâ repleto, ita suspenditur, ut aheni parietes nusquam attingat. Coquitur deinde aqua per quattuordecim horas continuas, aheno aquâ semper repleto; quo facto massa globosa e sacco in patinam excutitur, et stratum ejus exterius, lubricum, cultri ope amovetur. Massa vero interior, modico calore siccata, conteritur et in vase clauso servatur.

FERRUM PULVERATUM.

Ferrum cusum, limando comminutum, in mortario ferreo in pulverem subtilissimum teritur, qui per linteum tenerrimum, ut ad Bolum præparatam præceptum est, a pulvere grandiori separatur.

Servatur in vase bene clauso.

FLAVEDO AURANTII.

Aurantii cortices in aquam fervidam immerguntur, donec mollescant; tum cultri ope ab albedine liberantur et, leni calore siccati, servantur.

FLAVEDO CITRI.

E *Citri corticibus*, ut Flavedo Aurantii, paranda est.

GELATINÆ.

Ad usum parantur.

GELATINA CARAGHEEN.

Gelatina Fuci crispi.

Rec. *Lichenis Caragheen* concisi drachmas tres, p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,
ut, coquendo per horæ quadrantem, fiat colatura, quæ, solutâ in eadem
Sacchari albi pulverati unciâ dimidiâ, . . p. 4.
pondus habeat unciarum sex (p. 48). Refrigerando fit gelatina.

GELATINA CORNUS CERVI.

Rec. *Cornus Cervi* rasi, aquâ aliquoties eloti, uncias quinque, ... p. 80.
Aquæ destillatæ libras tres et dimidiam. p. 672.
Modico igne coquuntur in vase tecto per septem vel octo horas. Liquor colatus, additis et permixtis
Albumine Ovi unius,
Succi Citri drachmâ sesquialterâ, ... p. 3.
Sacchari albi pulverati unciâ sesquialterâ, p. 24.
Vini rhenani unciis tribus, ... p. 48.

ter inter agitandum ebullit et, etiamnunc calens, per pannum laneum colatur. Refrigerando fit gelatina.

GELATINA LICHENIS ISLANDICI.

Rec. *Lichenis islandici præparati* uncias duas, p. 1.
Aquæ destillatæ sufficientem quantitatem.

Quibus per horæ quadrantem coctis, fit per linteum fortiter exprimendo colatura libræ unius (p. 6), quæ loco frigido, ut fiat gelatina, seponitur.

GLOBULI MARTIALES.

Tartarus martialis. Tartras kalico-ferricum.

Rec. *Ferri Limaturæ* uncias novem, ... p. 3.
Tartari depurati pulverati libras duas, . p. 8.
Aquæ destillatæ libras viginti quattuor. . p. 96.

In vase ferreo coquuntur, agitando cum spathula ferrea, quamdiu Gas Hydrogenii evolvatur; tum liquor una cum sale albicante, relicto ferro forte intacto, defunditur et in balneo vaporis eo usque vaporando comminuitur, ut exinde formari possint globuli unciæ unius.

HÆMATITES PRÆPARATUS.

Præparatur *Hæmatites*, ut Bolus præparata.

HYDRARGYRUM CUM CRETA.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmas sex, . . . p. 3.
Cretæ præparatæ drachmas decem. . . . . p. 5.

Assidue conteruntur, donec Hydrargyri globuli oculo armato non amplius conspiciantur.

HYDRARGYRUM DESTILLATUM.

Rec. *Hydrargyri* libras duas.

Immittuntur retortæ vitreæ firmæ, longo collo instructæ atque satis capaci, ita ut dimidia ejus pars vacua supersit; collum retortæ inseritur excipulo, tantâ aquæ copiâ replendo, ut superficiem aquæ fere adtingat. Retortâ deinde balneo arenæ impositâ atque strato arenæ tectâ, ignis caute intenditur, ut lente ferveat Hydrargyrum; et sic pergendum, dum unciæ viginti hydrargyri transierint, quæ, ab aqua separatæ et siccatæ, per cucullum chartaceum perfunduntur et in vitro obturato servantur.

Quod si deest retorta, longo collo instructa, collum retortæ communis tubo chartaceo longius reddendum est.

HYDRAS FERRICUS IN AQUA.

Rec. *Chloreti ferrici* libram dimidiam. . . . . p. 1.
Solvitur in
Aquæ destillatæ libris decem. . . . . . . p. 20.
Huic solutioni, si opus est, colatæ, solutio frigida e
Bicarbonatis kalici sufficiente quantitate
et *Aquæ destillatæ* decuplo pondere
confecta, diligenter agitando cum baculo vitreo, sensim admiscetur, quamdiu prodit præcipitatum; quod quum post quietem fundum petiit, solutio supernatans effunditur, et fit, Aquam destillatam diligenter affundendo, perfecta ablutio. Denique aquâ, quantum fieri potest decanthando remotâ, puls liquida in vasis vitreis obturatis servatur.

Observandum, quattuor saltim hujus pultis libras in officina semper paratas prostare debere.

HYDRAS KALICUS.

Causticum salinum.

Solutio Hydratis kalici, in olla ferrea, bene mundata et linteo mundo cooperta, vaporando supra ignem consumitur, usque dum guttula refrigerando perfecte solidescat. Quo facto in crucibulum ferreum vel potius argenteum effunditur, in quo, aucti caloris ope liquefit, donec massa intumescere cessaverit et, crucibulo ad rubedinem calefacto, olei instar leniter fluat. Tum in fistulas ferreas idoneas effunditur hydras, et refrigeratus in vitro optime clauso servatur.

HYPOCHLORIS CALCICUS.

Oxymurias calcicum. Calx oxymuriatica.

Rec. *Calcis ustæ*, aquâ affûsâ in hydratem conversæ et per cribrum trajectæ, quantum placet.

Immittitur, quantum fieri pōtest diffuse, in vas idoneum, in quod *Gas Chlori* (ut ad Aquam Chlori præceptum est extricandum et lavandum) lente inducitur, quamdiu Chlorum ab Hydrate calcico absorbetur, qui ne calorem graduum +30° C. superet, cavendum. Peractâ saturatione, nova hydratis copia gasi exponenda est; quod vero jam saturatum est in vasis non magnis, bene obturatis, loco umbroso frigidoque asservandum.

INFUSA.

Fiunt infusa, nisi alia præparandi ratio præscribitur, Aquam destillatam fervidam affundendo substantiis præscriptis et rei convenienter comminutis, in vase idoneo e stanno puro, vitro vel massa porcellanea confecto, collocatis; fit deinde per præscriptum temporis spatium maceratio, vas operculo clausum interdum agitando. Quo autem evitetur nimia aquæ fervidæ inter affundendum refrigeratio, præsertim ubi copia ejus minor sit, rite agitur, si vas, Aquam ferventem affundendo et circumagitando et denique effundendo, ante præparationem Infusi calefiat. Infusum per linteum mundum leniter exprimendo colatur.

Ex tempore parantur.

INFUSUM AURANTII AROMATICUM.

Rec. *Caryophyllorum* contusorum,
Citri corticum concisorum, singulorum drachmam dimidiam, ... p. 1.
Aurantii corticum concisorum drachmas duas, p. 4.
Aquæ destillatæ ferventis uncias octo. . p. 128.
Macerantur per horæ quadrantem.

INFUSUM CINCHONÆ.

Infusum Kinkinæ.

Rec. *Cinchonæ regiæ* corticis contusi unciam, p. 1.
Aquæ destillatæ ferventis uncias decem. . p. 10.
Per horæ quartam partem digeruntur, et colatur infusum etiamnunc fervidum.

Infusum Digitalis
Rx. Pulv. fol. Digital ℈j
infund. c. aqu. fervid ℥viij
per quattuor horas et adde
Aqu. Menth. pip. ℥ij
Tinct. Lavendul. Aromat.
℥ij
M.

Infusum Ipecacuanhæ.
Rx. Rad. Ipecac. contus ʒß (℈j Lbj)
infund. per hor. dimid cum
Aqu. font. fervid. ℥viij
Cole et adde
Syrupi Altheæ ℥j
M.

Infus. Junipori Amar.
Rx. Trifol. Aquat.
Baccar. Junip. āā ℥j
infund. c. aqu. fervid.
℥xxij
Col.
M. D. S.

Infus. Rhei Amarum.
Rx. Rα Absinth. compos. ℥j
Infus. Rhei ℥ij
M. 1m. hvar morgon.

Infus. Alkal. Amar.
Rx. Rad. Calami ʒß
Ramora Guaiac ℥j
infund. per hor. ½. c. aqu. qu. sat.
ut f. Colatura ℥viij.
adde
Carbon. kalic. ℥j
(Tinct. Nuc. Vom. Ph.
℈j–ij)
M.

Infus. Armoraciæ Nitr. Nos.
Rx. Infus. Rad. Armoraciæ (℥j) Lbj
Syrup. commun. ℥j
Acid. Nitr. dilut
Aether. Nitr. spir. āā ℥j
M.

Rx. Infus. Cinchon. ℥viij
Rα Tolutan ℥j
S. 1m. 2-3t. (Vid allmän svaghet i behof af uppehostning (chronisk catarrh.
(Trα. Nuc. Vom ℥j)

Rx. Infus. Digital (℥x) ℥viij
Tartrat: Boracat ℥j
ft. 1m. 2t,

Infus. Levist. Nitr. Nos.

Rec. Infus. rad Levist. (℥j) ℔j
Syrup. commun. ℥j
Acid Nitr. dilut.
Aether. Nitr. spir. āā ʒij
Mr.

Infusum Lini Nitr. Nos.

R. Infus. Lin. ℔j in ceteris ingred.
supra stanti pari.

INFUSUM DIGITALIS.

Rec. *Digitalis foliorum* comminutorum drachmam, p. 1.
Aquæ destillatæ ferventis uncias octo. . . p. 64.
Macerantur per horam dimidiam.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis,*
Aurantii corticum,
Citri corticum, singulorum contusorum drachmam, ... p. 1.
Aquæ destillatæ ferventis libram. . . . . . p. 96.
Macerantur per horam.

INFUSUM LINI.

Rec. *Liquiritiæ radicis* concisæ scrupulos octo, p. 1.
Lini seminum integrorum unciam, ... p. 3.
Aquæ destillatæ fervidæ uncias sedecim. p. 48.
Macerantur loco calido, inter assiduam quassationem, per horam.

INFUSUM MALTI.

Rec. *Malti* fumo haud inquinati, aliquantulum comminuti, uncias duas; . . . . p. 1.
macerantur per quattuor horas cum
Aquæ destillatæ fervidæ unciis quattuordecim. p. 7.

INFUSUM RHEI.

Rec. *Bicarbonatis natrici* drachmas duas, . . . p. 1.
Rhei indici radicis contusæ uncias duas, . p. 8.
Aquæ destillatæ frigidæ libram unam et dimidiam. . . . . p. 72.

In vase vitreo inter agitandum macerantur per duodecim horas; quo facto colatura, leniter exprimendo facta, ad ebullitionem calefit.

INFUSUM ROSÆ ACIDULUM.

Rec. *Acidi sulphurici diluti* drachmam, ... p. 3.
Rosæ domesticæ petalorum siccatorum scrupulos quattuor, ... p. 4.
Sacchari albi unciam dimidiam, ... p. 12.
Aquæ destillatæ ferventis uncias tredecim. p. 312.

Rosæ petalis Aqua superinfunditur in vase vitreo claudendo; dein, instillato acido, macerantur per horam dimidiam. Liquori colato adjicitur saccharum.

INFUSUM SENNÆ.

Rec. *Sennæ alexandrinæ* unciam, ... p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ uncias octo. . . p. 8.

Macerantur per horam.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

Rec. *Coriandri seminum* drachmam, ... p. 2.
Tartratis kalici drachmas duas et semis, p. 5.
Passularum minorum drachmas tres, . . p. 6.
Sennæ alexandrinæ drachmas sex. . . . . p. 12.

Incisis et contusis affunditur
Aquæ destillatæ ferventis tantum,
ut, post digestionem per horam, fiat colatura tanti ponderis, ut, solutis in eadem
Mannæ electæ unciis duabus et semis, . p. 40.
liquor, exprimendo iterum colatus, pondus habeat unciarum novem (p. 144).

℞ Inf. Ros. acid. ℥vj
mucilag. Gm̃i arab. ℥ij
Ft. m., 2t.

Infusum Serpentariæ (ʒij) ℔j

Infusum Valerianæ (ʒss) ℥viij

Rp. Jodeti hydrargyrii gr iij
Jodet. Kalii ʒiij
solo. cui Aqu. dest ℥j
adde
Syrup. Sacchar. ℥xiij
Ds 1 m. 2-3 dd.
Syfilitiskt utslag

Rp. Jodet. Kalii ℥j
Aqu. destill. ℥viij
(Syrup papaveris ℥j)
Ds. 1 m. 3 t. (En Thesked 4ggr dd.)

#

Rp. Jodet. Kalii ℥j
Axungiae ℥ij
Ds Salfva att förbinda Spanska
flugan på inom körtlar. Chol
[ill] Leucom.

#

Rp. Inf. Hbae Conii (ʒij-iij) ℥viij
Jodet. Kalii ℥j
Induration i Lungorna

JODETUM HYDRARGYRICUM. ☿

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi* unciam unam et drachmas tres, ... p. 33.
Jodeti kalici unciam unam et drachmas quinque cum scrupulo . . . . p. 40.

Solvuntur separatim in sufficiente *Aquæ destillatæ* quantitate, quo facto solutiones colatæ miscentur, inter agitandum cum baculo vitreo. Præcipitatum, hinc oriundum, colo colligitur et, Aquâ destillatâ ablutum, leni calore siccatur.

JODETUM HYDRARGYROSUM. ☿

Rec. *Hydrargyri destillati* unciam, ... p. 8.
Jodi drachmas quinque. . . . . p. 5.

In mortario porcellaneo miscentur diligenter terendo, additis per vices *Spiritus concentrati* tot guttis, ut massa semper humida sit, usque dum Hydrargyrum disparuerit et massa ipsa colorem flavescenti-viridem acceperit. Tum *Spiritu concentrato,* quamdiu is aliquid solvat, abluitur, leni calore, sine lucis accessu, siccatur et loco obscuro servatur.

Cavendum, ne majores simul Hydrargyri et Jodi quantitates conterantur, neve inter miscendum exsiccentur.

JODETUM KALICUM.

Rec. *Solutionis Hydratis kalici* quantum placet.

Leniter calefactæ sensim additur
Jodum,
agitando cum bacillo vitreo, donec liquor colorem fuscum acceperit; quo facto ad siccum evaporat. Massa residua in crucibulo porcellaneo vel platinico tecto supra ignem, sensim augendum, liquatur et liquata habetur, quamdiu ferveat; deinde effunditur,

ut refrigescat. Post refrigerium deminuta in vase clauso statim servatur.

JULAPIUM E MOSCHO.

Mixtura Moschi.

Rec. *Moschi tunquinensis* grana quattuor, . . p. 1.
Sacchari albi,
Gummi arabici, singulorum pulveratorum grana duodecim, ... p. 3.
Aquæ Rosæ uncias duas. . . . . p. 240.

Teritur Moschus primum cum Saccharo, deinde cum Gummi, instillando paullatim Aquam Rosæ.

KERMES MINERALIS.

Hydrosulphuretum stibiosum.

Rec. *Sulphureti stibici præparati* unciam, . . . p. 1.
Sodæ depuratæ crystallisatæ libras duas, p. 24.
Aquæ destillatæ libras viginti. . . . . . p. 240.

In Aqua solvitur Soda depurata; solutioni in olla ferrea, munda, ebullienti, additur Sulphuretum, quo facto liquor, agitando cum spathula lignea, per horam dimidiam ulterius ebullit et, etiamnunc fervidus, in vas jam calefactum colatur. Refrigeratus a præcipitato sponte nato, chartæ bibulæ ope, separatur, et Sulphureto residuo rursus affunditur, denuo per horæ dimidium decoquitur et percolatur. Præcipitata, his laboribus comparata, Aquâ destillatâ frigidâ seduló abluuntur et ad gradum caloris +25° C. haud superantem cautissime siccantur. In vase vitreo sicco, bene obturando, mixta servantur.

Julapium Antimonii

R. Syrup. Altheæ ʒj
Oxymell. Scillæ ʒij
Vin. Stibiat. ʒj
M.

Julapium Anodynum.

R. Syrup. Altheæ ʒj
Oxymell. Scillæ ʒij
Vin. [illegible]. Theb. ʒj
M.

Rx. Lact. ferros. gr ij – v.
Lactucarii gr j – ij
Sacch. alb. gr x.
Dr. tal. dos. No.
S. 1 p. 3 t. c Chloros.

Rx. Lact. ferros. gr ij
Extr. Nicot. gr 1/8 – 1/6
Sacch. alb. gr v.
S. 1 p. 4 dd. Spinal irritation – anæmi –

LACTAS FERROSUS.

Rec. *Sacchari Lactis* pulverati unciam, ... p. 1.
Ferri Limaturæ, oxido haud inquinatæ, unciam, ... p. 1.
Oxygalactos vaccini libras duas. . . . . . p. 24.

Digeruntur in lagena sæpius agitanda, cujus apertura clauditur subere, tubum vitreum in acumen eductum includente, ad temperaturam +30°—40° C., per dies aliquot vel donec Saccharum Lactis evanuerit; cujus quum nova deinceps uncia addita est, totum ulterius digeritur, usque dum Lactas ferrosus, pulveris instar albidi, deponi incipiat. Tum liquor una cum depositis ad ebullitionem calefit et bulliens in lagenam, deinde claudendam, percolatur.

Quum Lactas ferrosus, e liquore refrigerato depositus, post dies quosdam non amplius crescit, liquor supernatans defunditur et crustæ crystallinæ, Aquâ frigidâ aliquoties elotæ, calore blandissimo inter chartæ plagulas citissime siccantur.

Servatur in vase, optime claudendo.

LAPILLI CANCRORUM PRÆPARATI.

Præparantur *Lapilli Cancrorum*, ut Bolus præparata.

LAPIS DIVINUS.

Cuprum aluminatum.

Rec. *Vitrioli de Cypro*,
Nitratis kalici depurati,
Aluminis crudi, singulorum unciam . . . p. 16.

Pulverata et inter se mixta in vase fictili vitreato liquefiunt modico calore. Liquatis et ab igne remotis admiscetur

Camphoræ depuratæ drachma dimidia; . . p. 1.
quo factó massa, super porphyritem effusa et refrigerata, in frustula diffringitur et in vase clauso servatur.

LICHEN ISLANDICUS PRÆPARATUS.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* drachmas duas,
Aquæ libras viginti quattuor.
Fit solutio, quæ
Lichenis islandici mundati libræ uni
superinfunditur. Post macerationem per duodecim horas, quod liquidum est, decanthatur; lichen vero, aquâ frigidâ, quamdiu hæc sapore imbuatur, ablutus, siccatur et servatur.

LINCTUS.

Non nisi ad usum parantur.

LINCTUS BORACICUS.

Linctus Boratis natrici.

Rec. *Boracis pulveratæ* drachmam, ... p. 1.
Mellis Rosæ drachmas decem. . . . . . . p. 10.
Conteruntur, donec Borax soluta sit.

LINCTUS HYPOCHLORITIS CALCICI.

Linctus Oxymuriatis calcici.

Rec. *Solutionis Hypochloritis calcici* drachmam, p. 1.
Mellis depurati,
Aquæ destillatæ, singulorum drachmas sex. p. 6.
Agitando miscentur.

Linctus Aluminosus

Re. Sulph. Kalii. Aluminii ℥j
Aquæ. Fluv. fervid.
Mell. commun. āā ℥j
Mr.

Linctus pectoralis
Rx. Syrup. Althea.
Mucilag. G. arab. āā part. æqu.
Mr.

Linctus pectoralis
(Nosocomial. simplex)
Rx. Hbæ Hyssop. officinal.
Rad Althææ
— Glycyrrhizæ
Summitat. Millefolii āā ℥j
Aquæ fluviat. ℔iij
Coque per horam lente ad remanent.
℔ij. Exprime et adde
Oxymell. ℔ij.
Deinque blando igne ad consistentiam Mellis.

Liniment. Stokii
Rx. Ætherol. Terebinth. depur. ℥ij
Acid. Acetic. dilut. ℥ß
Vitell. ovor. N: j
Aquæ Rosæ ℥ijß v. Aq. menth. piper. ℥iß
Ol. Citri Medic. ʒj v. Ol. Junip. ʒij v. Juniperi
Mr.

Frost Liniment.
Rx. Sol. camph. sp. ℥ß
Ætherol. Tereb.
Bitum. Naphtæ āā ʒj
Acid. Nitric. pur.
Ætherol. Chamom.
— Rosmarini āā gr xv
M. f. Linim.

Linimentum Strömbergii
Rx. Balsam. Peruvian. ʒij
Solv. in
Alkohol. pur. ℥j
M. f. Linim.

Linimentum Afrodisiacum
Rx. Balsam. Peruvian. ʒij
Ol. Lauri ℥ß
— Origani ʒj
Tᵗᵘʳᵃ Aloës
— Myrrhæ āā q. sat. ut f. Liniment. S. Att ingnidas på korsryggen i regio pubis

Linimentum Excitans Smithii
Rx. Tᵗᵘʳᵃ Canthard. ʒj
Ol. Tereb. rect.
— Camphor. āā ℥ß
Ingnides omkring ögat
(Mydriasis paralytica)

Liniment. contra ascitid. Richter
Rx. Fol. Digital. ʒij
inf. per hor. ½ c. suff. qu. aqu. bull. ut f. Colat. ʒj cui adde
Ætherol. Tereb. ʒj
Vitell. ovor. N: j
Syrup. Scillæ ʒj ut f. Lin.
S. Ingnides på buken 2. ggr dagl.

LINCTUS MELLITUS.

Rec. *Olei Olivarum provincialis* unciam, . . . p. 1.
Mellis depurati uncias tres. . . . . p. 3.
Miscentur.

LINCTUS OLEOSUS.

Mucilago oleosa.

Rec. *Gummi arabici* pulverati unciam dimidiam, p. 1.
Aquæ Amygdalarum amararum dilutæ,
Olei Amygdalarum recentis, singulorum unciam. . . . . p. 2.
In mortario lapideo triturando mixtis additur sensim
Syrupi Althææ uncia et semis, ... p. 3.
ut fiat linctus.

LINIMENTUM AMMONICUM.

Rec. *Ammoniaci caustici* unciam dimidiam, . . p. 1.
Olei Olivarum communis unciam. . . . . . p. 2.
Miscentur quassando. Non nisi ad usum paratur.

LINIMENTUM CALCICUM.

Rec. *Olei Lini frigide expressi,*
Aquæ Calcis, singulorum partes æquales.
Miscentur. Ad usum paratur.

LINIMENTUM SAPONIS CAMPHORATUM.

Rec. *Saponis albi hispanici* uncias quattuor, . p. 16.
Spiritus diluti libras duas. . . . . p. 96.
Digeruntur, donec sapo solutus sit; tum adduntur
Olei Rosmarini drachmæ duæ, ... p. 1.
Camphoræ depuratæ uncia. . . . . p. 4.

Servatur loco, ubi temperatura gradibus +15° C. non est inferior.

LIQUOR ACIDUS HALLERI.

Elixir acidum Halleri.

Rec. *Spiritus concentrati,*
Acidi sulphurici destillati, singulorum uncias tres vel partes æquales.

Acidum sensim et caute in Spiritum instillatur, cavendo, ne nimis calefiat mixtura, quæ, post refrigerationem, in vase vitreo, epistomio vitreo munito, servatur.

LIQUOR AMMONIACI ANISATUS.

Spiritus Salis ammoniaci anisatus.

Rec. *Ætherolei Anisi* unciam dimidiam, ... p. 2.
Spiritus concentrati libram. . . . . p. 48.
Solutis adduntur
Ammoniaci caustici unciæ duæ et drachmæ sex. . . . . p. 11.

Servatur in vase bene clauso.

LIQUOR AMMONIACI AROMATICUS.

Spiritus volatilis aromaticus.

Rec. *Olei Cassiæ* scrupulum dimidium, ... p. 1.
Olei de Cedro scrupulum, ... p. 2.
Ætherolei Piperis jamaicensis scrupulos duos, p. 4.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ uncias sex. . . . . p. 288.

Miscentur, ut solvantur ætherolea, et servantur in vase bene clauso.

Rp. Liqu. Acid. Halleri ʒijβ ×
L.L. Sydenhami ʒβ ×
T:rae Cinnamomi ʒj
Sr. 25–50 dropp. hvar halft. hel
time (Metrorrhagia) (Most)

LIQUOR AMMONIACI SUCCINATUS.

Alkali ammoniacum succinatum. Ammoniacum succinatum. Aqua Luciæ.

Rec. *Olei Succini empyreumatici rectificati* scrupulum; . . . . p. 1.
solvitur in
Spiritus concentrati uncia, ... p. 24.
et solutioni colatæ adjiciuntur
Ammoniaci caustici unciæ quattuor. . . . p. 96.
In vase probe clauso servatur.

LIQUOR CORNUS CERVI.

Liquor Subcarbonatis ammonici.

Rec. *Cornus Cervi* rasi quantum placet.

E vase destillatorio ferreo apto, cui adaptatum est vas excipiens amplum cum tubo intermedio, fit destillatio, igne sensim ad summum fere aucto. Transeunt *Liquor alkalinus, Oleum empyreumaticum* et *Sal.* Liquor purificatur, quum colando per chartam bibulam humidam ab oleo et sale separatur.

Pondus specificum 1.06 erit; quod si majus sit, liquor Aquâ destillatâ diluendus est, ut justam habeat densitatem. In vasis parvis, bene obturatis, loco obscuro servatur.

Paratur etiam ex *Ossibus Pecorum* contusis et, coquendo cum Aqua, a pinguedine liberatis.

LIQUOR CORNUS CERVI ACETATUS.

loco Liquoris Tartratis ammonici.

Rec. *Liquoris Cornus Cervi* libram, ... p. 48.
Acidi acetici concentrati quantum sufficit ad saturandum.

Saturatione peractâ et Acido carbonico ope lenis caloris fugato, inter agitandum adduntur

Olei Succini empyreumatici rectificati drachmæ duæ; . . . . p. 1.

et fit, post horas viginti quattuor, colatio. Servatur in vase bene clauso.

LIQUOR CORNUS CERVI SUCCINATUS.

Liquor Succinatis ammonici.

Rec. *Liquoris Cornus Cervi* quantum placet.

Acidi succinici quantum ad plenam saturationem requiritur.

Saturatione peractâ et Acido carbonico lenis caloris ope fugato, post viginti quattuor horas colantur et in lagena, bene clausa, servantur.

LIQUOR PYROTARTARICUS.

Tartarus crudus retortæ ferreæ aptæ immittitur, ut hujus duas tertias partes occupet, et igne sensim aucto fit destillatio. In recipiens vas, quod capacissimum sit, transibit *Liquor acidus* una cum *Oleo*, ab illo per chartam bibulam humidam separandus.

LITHARGYRIUM PRÆPARATUM.

Præparatur *Lithargyrium* eodem modo, quo Bolus præparata.

MAGNESIA USTA.

Magnesia alba uritur in crucibulo, donec cum acidis dilutis non effervescat, et in vitro, sollicite clauso, servatur.

Liquor Nitrat. Hydrargyri.

Rc. Acid. Hydrargyri rubr ℥j
Solv in ~~Acid.~~ qu. sat. postea adde
Aqu. destill. qu. sat. ut pondus
totum fit ℥viij

Liquor Sedativus (Prof Han)

Rc. Opii depur. ℥ij ʒß
Acid. Acet. Concent. ℥j ʒß
Aqua dest. ℥x ℈ xxiij
Sent. digestione vase clauso
per quattuor dies. Colatur
Dr. 5–6 drop. om quali.

MEL DEPURATUM.

Rec. *Mellis* libras sex . . . . p. 1.
Aquæ destillatæ libras duodecim . . . . p. 2.

Aqua cum *Albumine Ovorum* sex in spumam agitata, cum Melle semel ebullit, quo facto liquor, per pannum laneum trajectus, evaporando in balneo vaporis, ad pondus specificum 1.44 redigitur. Loco frigido servatur.

MEL ROSÆ.

Rec. *Rosæ domesticæ petalorum* siccatorum unciam, p. 1.
Aquæ destillatæ uncias sex. . . . . p. 6.

Macerantur per duodecim horas, et liquori colato admiscetur

Mellis depurati libra. . . . . p. 12.

Servatur loco frigido.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

Submurias ammonico-hydrargyricum.
Mercurius cosmeticus.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi,*
Salis ammoniaci depurati, singulorum partes æquales.

In *Aquæ destillatæ* pondere octuplo solvuntur; quo facto solutioni colatæ

Solutio Carbonatis kalici

additur, quamdiu aliquid præcipitatur. Quod fundum petit, a liquido separatum et Aquâ destillatâ non calidâ ablutum, siccatur et servatur.

☿ MIXTURA ARSENICALIS FOWLERI.

Mixtura mineralis Fowleri. Solutionis Arsenitis kalicæ loco.

Rec. *Arsenici albi* pulverati,
Carbonatis kalici puri, singulorum grana sedecim, ... p. 4.
Aquæ destillatæ uncias duas. . . . . p. 240.
Coquuntur in vase vitreo, donec Arsenicum solutum sit. Solutioni refrigeratæ admiscentur
Spiritus Lavendulæ drachma, ... p. 15.
Aquæ destillatæ tantum,
ut liquidum pondus unciarum quattuor (p. 480) habeat. Cautissime asservatur.

☿ MIXTURA MERCURIALIS.

Solutio Muriatis hydrargyrici corrosivi.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi*,
Salis ammoniaci depurati, singulorum grana sex, ... p. 1.
Solvuntur in
Aquæ destillatæ unciis decem. . . . . . p. 800.
Solutioni colatæ adduntur
Syrupi Sacchari unciæ duæ. . . . . p. 160.
Vase clauso caute servatur.

MIXTURA PYROTARTARICA CAMPHORATA.

Mixtura diatrion vel simplex.

Rec. *Acidi sulphurici diluti* unciam, ... p. 4.
Liquoris pyrotartarici uncias tres, ... p. 12.
Solutionis Camphoræ spirituosæ uncias quinque. . . . . p. 20.

Mixtura antihydrop. Hufel.

Rec. Elaterii albi gr j
Aqu. Petroselini ℥vj
Aeth. nitr. spir ʒij
Oxymell. Scillæ ℥ij
Tᴿᵉ Aromat. ʒj
Sr. 1 m 3–4 dd.

Mixtura antidiarrh. Nos.

Rec. Tinct. Opii ʒj
Infusi Rhei ℥ij
Aqu. Menth. Pip. ℥vj
Mr. Sr. 1 Matsked 2t

= Ges med fördel i dos af en thesked vid fyrsningens början i intermitt. febris hos gravida då man gerna vill undvika Chinin'salt

Mixtur. Camphor. Acida Bangii (Nos).

Rᴇ Camphor. depur. ʒß x
Alkohol. gtt. viij
Tere et adde
Pulv. Gᴵ Arab. ʒij
— Sacch. alb. ʒiij
Acet. commun. ℥ij
Aqu. puræ Lb j
M. l. art. f. Mixt.

Mixtur. Camphor. Phosporica

R. Camphor. depur. gr xij
tere c.
Mucil. Gᴵ Arab. ℥iß x
affundendo
Sol. acid. Phosphor. ʒß x
adde
Decoct. Althea ℥x.
Dr.

Mixtura Chopartii

R. Balsam. Copaivæ,
Aquæ flor. Aurantii ʒij Tolufen
— Menth. piper.
Spirit. Vini rectificat. āā ℥ij
Aeth. nitr. spir. ʒj.
Mr Dr. Sr. 1 m. 2–6 dd.

Mixtura Diuretica.

R. Fol. Digital. ʒß x.
— Card. Bened. ʒj
infund. c. aqu. fervid. q. s. ad Colatur.
℥viij adde
Oxymell. Scillæ ℥ij
Spirit. Juniperi. comp. ʒj
Aether Nitr. spirit ʒij
Mr.

Mistura pectoralis

℞. Tartrat. stibii. kalii. gr. ij
solv. in
Aqu. destill. ℥j
adde
Syrup. Altheæ ℥j
M.

Mist. Sal. Ammoniac.

℞. Muriat. Ammon
Sacch. alb. āā ʒij
Decoct. Altheæ ℔j
M.

Mixta tinguntur

Myrtilli baccarum drachmis duabus; . . . p. 1.

deinde colantur.

MORPHINA. ☿

Rec. *Opii levantici* concisi libram, ... p. 6.

Aquæ destillatæ libras tres. . . . . p. 18.

Macerantur sæpius agitando per biduum; quo facto liquor defunditur et massa residua cum

Aquæ destillatæ libris tribus . . . . p. 18.

denuo maceratur; quod, liquore defuso, tertium etiam fit vel donec Opium exhaustum sit.

Liquores commixti balnei vaporis calore ad pondus specificum 1.02—1.03 rediguntur; tum colantur. Colaturæ claræ adjicitur inter agitandum solutio e

Bicarbonatis kalici unciis duabus . . . . . p. 1.

et *Aquæ destillatæ* unciis decem . . . . p. 5.

confecta. Mixtura, per dies aliquot seposita, iterum colatur, et liquor clarus per horæ quadrantem ebullit; quo facto per dies quattuor iterum seponitur.

Morphina, post hæc excreta, colligitur et ope

Acidi sulphurici diluti, guttatim et inter agitandum addendi,

in *Aquæ destillatæ* libra . . . . p. 6.

solvitur. Solutio clara et paullum acida, admixtâ

Spiritus concentrati librâ, ... p. 6.

cum *Carbonis animalis* tanta copia, quanta sufficit ad decolorandum,

digeritur et, denuo colata, cum

Ammoniaci caustici tanta copia

miscetur, ut id leniter excedat. Tum in vase aperto per aliquot dies seponitur, ut Ammoniacum excedens avolet; deinde Morphina deposita colligitur et Aquâ destillatâ lavatur. Siccata servatur. Liquor ille, qui

Morphinam deposuit, vaporando novam ejus tradit copiam.

Si non plane alba est, repetitâ e Spiritu concentrato crystallisatione purificatur.

MORSULI AROMATICI.

Rec. *Sacchari albi* libram; . . . . p. 288.
cum *Aquæ destillatæ* parva copia
incoquitur, donec gutta excepta indurescat; tum adjiciuntur

Zingiberis radicis pulveratæ scrupulus, . . p. 1.
Cinnamomi ceylanici corticis contusi uncia dimidia, ... p. 12.
Amygdalarum dulcium decorticatarum et minutim concisarum,
Conditi Aurantii concisi, singulorum uncia. p. 24.

Fiunt morsuli.

MORSULI CITRICI.

Rec. *Sacchari albi* pulverati uncias quattuor; . p. 8.
leniter calefactis adjicitur

Citri Succi uncia dimidia. . . . . p. 1.

Fiunt morsuli.

MORSULI STIBIATI.

Morsuli antimoniales vel restaurantes Kunkelii.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* pulverati drachmas duas, ... p. 1.
Sulphureti stibici præparati unciam dimidiam, p. 2.
Amygdalarum dulcium, decorticatarum et minutim concisarum, unciam. . . . . . . p. 4.

Miscentur cum
Sacchari albi, in *Aquæ destillatæ* quantitate sufficiente soluti et ad debitam spissitudinem cocti, unciis septem. . . . . p. 28.
Formantur inde morsuli æquales sedecim.

MUCILAGINES.

Non nisi ad usum parantur.

MUCILAGO CRETACEA.

Potio cretacea.

Rec. *Sacchari albi* pulverati drachmam et semis, p. 3.
Gummi arabici pulverati,
Cretæ præparatæ, singulorum drachmas duas, p. 4.
Aquæ destillatæ uncias sex. . . . . p. 96.

Teruntur pulveres mixti cum parva Aquæ parte in pultem tenuem, illâ, quæ superest, Aquæ copiâ diluendam.

MUCILAGO CYDONIORUM.

Rec. *Cydoniorum seminum*, aquâ aliquoties elotorum, drachmam. . . . . p. 1.
Vitro injectis affunduntur
Aquæ Rosæ unciæ octo. . . . . p. 64.

Fit per quartam horæ partem quassando mucilago, quæ per linteum exprimendo colatur.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

Rec. *Gummi arabici* pulverati unciam, ... p. 1.
Aquæ destillatæ uncias duas. . . . . p. 2.

Gummi cum Aqua, paullatim instillata, in mortario vitreo teritur, donec in mucilaginem abierit.

MUCILAGO SALEB.

Rec. *Saleb radicis* pulveratæ drachmam, . . p. 1.
Aquæ destillatæ frigidæ uncias duas. . . p. 16.
In mortario vitreo contritis et dein in lagenam capacem inditis adduntur
Aquæ destillatæ ferventis unciæ decem. p. 80.
Mixta conquassantur, donec refrixerint.

NITRAS ARGENTICUS.

Argentum purum
in *Acido nitrico diluto*

solvitur; solutio, si necesse est, colanda, ope balnei vaporis ad siccum vaporat. Massa sicca in patina porcellanea supra balneum arenæ liquata habetur, quamdiu ferveat; effunditur deinde et post refrigerationem in vase opaco, clauso, servatur.

Si autem massa liquata in fistulas ferreas idoneas secundum leges artis effunditur,

NITRAS ARGENTICUS IN BACILLIS,

Causticum lunare vel Lapis infernalis vocatur.

NITRAS KALICUS DEPURATUS.

Nitrum depuratum.

Rec. *Nitri crudi* quantum placet;
in *Aquæ destillatæ* quadruplo pondere

solvitur; solutio colata et vaporando ad pelliculam consumpta cum *Aquæ destillatæ* frigidæ duodecima circiter voluminis sui parte, commiscetur et quam citissime, inter continuam liquidi agitationem, re-

Rep. Nitr. Argent. gr ij — x
Unguent. cetac. ℥j
Aceti Saturni gr xv
f. Ungv. (Guthrie) Ingnides på ögon-
locksrändarne hvar 3-8. dag (decom-
poneras lätt) (Blepharoadenitis catar-
rhalis).

Rep. Nitr. argent. gr v
Solv. in Aqu. dest. q.s.
Axungiæ ℥j
M. terendo exactissime.
Sarcomatosa utvärtes på conjunc-
tivan

Oleum Camphoræ. ? i.e. Sol. Camph. oleosa.

Rx. Camphor. ʒj

Ol. Lini ℥iij

M.

frigeratur. Pulvis crystallinus, hoc modo ortus, cum Aquæ frigidæ parva copia abluitur et deinde siccatur. Quod si non plane albus sit, denuo simili modo purificatur.

Qui in muria et aqua lotionis manet Nitras, vaporando et refrigerando recuperatur.

OLEUM AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum dulcium*, non rancidarum, quantum vis.

In mortario lapideo vel ferreo contusis et sacculo inclusis, exprimitur oleum, prelo primum frigido, postremo aquâ fervente calefacto, post quietem a fæcibus ~~caute defundendum.~~ (colatione separandum)

Oleum, frigide expressum, separatim servatur.

OLEUM CACAO.

Cacao de Caracas semina, quot placet, leni igne torrentur, ut eo facilius a cortice mundari possint. Dein in pulverem comminuuntur et in olla ferrea cum *Aquæ destillatæ* sufficiente quantitate coquuntur, ut oleum separetur; tum, aquâ refrigeratâ, oleum concretum eximitur et loco calido per colum chartaceum trajicitur. In capsulis ferreis, stanno obductis, refrigeratum denuo concrescit.

OLEUM CANTHARIDUM INFUSUM.

Rec. *Cantharidum contusarum* uncias duas, . . p. 1.
Olei Olivarum communis uncias octo. . . p. 4.

Digeruntur, ope balnei vaporis, in vase vitreo per horas viginti quattuor; colatur deinde oleum, primum exprimendo per linteum, tum per chartam, et servatur.

OLEUM CHABERTI.

Oleum anthelminticum. Oleum Cornu Cervi terebinthinatum Ph. Veterin.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici* unciam, p. 1.
Ætherolei Terebinthinæ depurati uncias tres. p. 3.

Quibus retortæ vitreæ immissis, adjuncto excipulo, destillatione eliciuntur unciæ tres (p. 3.), in vasa vitrea parva, bene obturanda, statim immittendæ atque loco obscuro servandæ.

OLEUM CORNUS CERVI EMPYREUMATICUM RECTIFICATUM.

Oleum animale Dippelii.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici*,
Carbonis vegetabilis præparati, singulorum par pondus.

Mixta in retortam vitream tubulatam injiciuntur, et oleum igne lenissimo destillat, quamdiu destillatum colore caret.

Quod destillavit, si flavidum habet colorem, modo præscripto iterum purificandum est.

In lagenis vitreis, perparvis ac bene clausis, loco obscuro, servatur.

☿ OLEUM CROTONIS.

Rec. *Granorum Tiglii*, in pulverem grandiusculum redactorum, uncias sex,
Spiritus concentrati quantum satis.

Grana Tiglii in apparatu idoneo, qualis ad Acidum quercitannicum præcipitur, Spiritu extrahuntur. E liquore spirituoso destillatione elicitur Spiritus, ad

aliam

aliam talem operationem conservandus; quod vero restat oleum, per dies aliquot, ut Spiritus omnis avolet, seponitur et deinde colatum servatur.

OLEUM FILICIS MARIS.

Extractum Filicis Maris æthereum.

Rec. *Filicis Maris radicis*, recens siccatæ et in pulverem redactæ, quantum vis,
Ætheris sufficientem quantitatem.

Pulvis radicis Æthere ter quaterve extrahitur in apparatu idoneo, ita instructo, ut ad Acidum quercitannicum jam monitum est. Æthere deinde e liquoribus æthereis per destillationem elicito, residuum in balneo vaporis ad consistentiam mellis comminuitur et in lagena, amplo orificio prædita atque epistomio vitreo munita, servatur.

OLEUM HYOSCYAMI INFUSUM.

Rec. *Hyoscyami foliorum recentium* libram, . . p. 1.
Olei Olivarum communis libras tres. . . . p. 3.

Digeruntur leni calore, inter assiduam agitationem, per duodecim horas. Oleum exprimitur, colatur et servatur.

OLEUM LINI FRIGIDE EXPRESSUM.

E *Lini seminibus* eodem modo exprimitur, atque Oleum Amygdalarum, sed prelo semper frigido.

OLEUM OVORUM.

Ova gallinacea recentia, quot placet, coquuntur, ut penitus indurescant; dein vitelli eximuntur et comminuti, in lagena clausa, interdum agitanda, cum *Ætheris* sufficiente quantitate macerantur per horas duodecim. Solutione æthereâ defusâ, residuum cum nova Ætheris copia est macerandum, donec omnis, quæ quæritur materia, evocata sit. Liquores commixti ad Ætherem recuperandum destillant; deinde quod restat in balneo vaporis liquatum detinetur et, quum ne vestigium quidem Ætheris observare licet, per chartam trajicitur. In lagenis haud magnis, bene obturatis, loco frigido servatur; ubi dabitur oleum, lagena antea calefacienda est, ita ut nulla olei pars concreta sit.

OLEUM SUCCINI EMPYREUMATICUM RECTIFICATUM.

Oleum Succini crudum eodem modo, atque Oleum Cornus Cervi empyreumaticum, rectificatur.

☿ OPIUM DEPURATUM.

Extractum thebaicum. Extractum Opii gummosum.

Opium levanticum, contusum et in frustula minuta dissectum, cum sextupla *Aquæ destillatæ* frigidæ quantitate per duodecim horas maceratur; Opio deinde, agitando cum spathula, quantum fieri potest, in liquorem dispertito, fit denuo per horas duodecim maceratio. Solutum, fortiter expressum, per linteum trajicitur; residuum vero cum sextupla Aquæ copia iterum maceratur solutumque colatur. Solutiones mixtæ in balneo aquæ evaporant ad consistentiam extracti,

Rp. Opii pulv. gr ¼ – ½ – j
Sulph. kalic ℈j
S. 1 p. 3–4. t. (Morb. saturnin)

#

Rp. Opii pulv. gr j
Sal C.C. gr x v. Camph. v March.
i nerffebron

#

Rp. Opii gr j
Tartar. kali stib. gr j – ij
S. 1 p. 2 t. (Delir tremens)

#

Rp. Opii gr j
Acetat. plumbic. gr ij
Sacchar. alb. gr x.
S. 1 p. 2 t. Lr. Diarrhoe vid slutet af lungsot. Morb. Brighti – At minska uppkastningen. Istad af Pneumonie ö Tuberc. (cui bonum?)

#

Rp. Opii depur. gr j – ij
Aqua Rosar. ℥iv
Mucilag. Gi Arab. ℥ij
S. Till indroppning i ögat 4–5 dd.
(Blepharitis glandulos.)

#

Rp. Opii depur. ℈j – ʒß
Ol. Amygdal. ℥ij
Aetherol. Chamomill ʒß

(Blepharospasmus)

#

Rp. Opii depur. ℈ij
Axungiæ Porci ℥ß
Acet. Saturn. ℈j
f. Ungv. På carcinomatösa sår

Ol. Ricini

Rp. Ol. Ricini
– Lini frig. express. āā part.

quod in octuplo Aquæ destillatæ pondere denuo solvitur. Jam miscela, ut subsidat, seponitur, quo facto liquor denuo colatur, in balneo vaporis ad siccum redactus pulveratur et in lagena, probe obturanda, servatur.

OPODELDOC.

Linimentum saponato-camphoratum.

Rec. *Camphoræ depuratæ* unciam unam et dimidiam, ... p. 12.
Saponis e Butyro uncias sex, ... p. 48.
Spiritus concentrati libras tres. . . . . . p. 288.

Digeruntur in vase clauso, interdum agitando; solutioni adduntur

Ætherolei Thymi,
Olei Origani cretici, singulorum drachma, p. 1.
Olei Rosmarini uncia dimidia, ... p. 4.
Ammoniaci caustici unciæ duæ et semis. p. 20.

Liquor, etiamnunc calidus, in lagenas altas, ore amplo præditas, colatur, quæ suberibus probis statim obturantur.

OXIDUM FERRICO-FERROSUM.

Æthiops martialis præcipitatus.

Rec. *Acidi Vitrioli* unciam unam et semis, . . p. 3.
Sulphatis ferrosi uncias decem, ... p. 20.
Aquæ destillatæ uncias viginti vel plures. p. 40.

Calefiunt in vase vitreo vel porcellaneo amplo inter agitandum, usque dum ebulliant; tum sensim et guttatim admiscetur

Aqua fortis,

donec color liquoris badius evanuerit et ferrum omne oxydatum sit, cavendo tamen, ne major, quam requiratur, Aquæ fortis copia addatur. Solutio deinde

refrigerata Aquâ destillatâ diluitur et, additâ solutione, e

Sulphatis ferrosi unciis quinque . . . . p. 10.
et *Aquæ destillatæ* unciis quindecim . . . p. 30.

confectâ, cum solutione *Sodæ depuratæ* excedente præcipitatur; quo facto miscela, inter assiduam agitationem, in vase ferreo mundo coquitur, donec effervescentia cessaverit et præcipitatum in pulverem subtilem, nigrum, conversum sit, qui, colo collectus et bene lotus, exprimitur, celeriter siccatur et in vase clauso servatur.

☿ OXIDUM HYDRARGYRICUM.

Mercurius præcipitatus ruber.

Acidum nitricum dilutum cum *Hydrargyro destillato* coquendo digeritur, et solutio saturata in vase vitreo vel porcellaneo ad siccum vaporat. Massa sicca, in pulverem tenerrimum contrita, cum

Hydrargyri destillati duobus ponderis sui trientibus

intime et usque ad plenam Hydrargyri exstinctionem conteritur. Quo facto massa in crucibulo argillaceo, inter carbones, qui jamdudum ab omni parte, ne nimis augeatur ignis, accensi fuerunt, uritur, inter continuam cum bacillo figulino agitationem, donec odorem Acidi nitrosi emittere cesset.

Loco obscuro vel in vitro opaco servatur.

☿ OXIDUM HYDRARGYRICUM PRÆCIPITATUM.

Chloretum hydrargyricum corrosivum, *Aquâ destillatâ* solutum,

Solutione Hydratis kalici

Rp. Bytyri insulo ℥ij
Oxid. hydr. praec. gr iv
Vitrioli albi gr j
Tutiæ ppt. gr v
M. exactiss. f. Ungv.
#
R. Oxid. hydr. praec. ∂ß x
Sulph. Zinci ∂j
Axungiæ ℥j
Mr.

Rp. Oxid. hydrarg. praecip.
Opii depur. āā gr iß x
Axungiæ Porci ℥j
M. exactissime f. Ungv. Hertill kan sättes Boli armen gr iß x + oxid. Zinci gr iv. Dr. Ingnider på ögonlocksranden, då pat. lägger sig att sofva.
#
R. Bytyri insulo ℥ij
Ceræ alb. ℥ij
Oxid. hydr. praec. gr. XLV (45).
M. f. Ungv. (Hordeolum)
Ex Ögonlockränderna bestrykas härmed en längre tid hvar eller hvarannan dag.
#
Rp. Axungiæ recent. ℥ij
Mercur. ~~praec.~~ ~~albi~~ rubr. gr vj
Rℓ opii crocat.
Acet. Saturni āā ℥ß x
M. f. Ungv.

#
Rp. Oxid. hydr. praec. gr vj
Acet. Plumb.
Aerugin. chrystall. āā gr ij
Boli alb. gr jv
Bytyri rec. insulo. ℥ij
Mr. f. Ungv. (Hordeolum scrophulos.)
#
Rp. Oxid. hydr. praec. gr jß - ij
Boli Armen.
Flores Zinci āā gr iij
Axungiæ porci ℥j
M. f. Ung. ℞ Anbringes så mycket som ett knappnålshufvud på fläckar på cornea.
#
R. Hydrarg. praec. rubr. gr ij
Axungiæ porci ℥ij
Ceræ albæ gr xij
M. exactiss. f. Ung. (Hordeolum scroph.)

præcipitatur, et præcipitatum cum superflua ejus quantitate digeritur, donec oxidum colorem habeat e rubro flavum. Tum colo colligendum et Aquâ destillatâ calidâ abluendum est, quamdiu hæc *Solutione Nitratis argentici* turbetur, et caute siccatum in vase cooperto, opaco, servandum.

OXIDUM HYDRARGYROSUM. ☿

Mercurius solubilis Moschati.

Rec. *Chloreti hydrargyrosi*, nondum siccati, quantum placet,

Solutionis Hydratis kalici majorem quantitatem, quam ad Chloretum decomponendum requiritur.

Solutioni, in lagenam inditæ, Chloretum sensim et inter agitandum additur. Oxidum nigricans, quod per quietem loco obscuro subsederit, *Aquâ destillatâ frigidâ* diligenter abluitur et in loco, accessum luminis defendente, inter chartæ plagulas caute siccatur. In vase clauso, opaco, asservatur.

OXIDUM STIBICUM.

Oxidum stibiosum.

Antimonium crudum pulveratum in vase e ferro fuso vel argilla lato, inter agitandum cum baculo figulino et cavendum, ne massa, calorem nimis augendo, liquefiat, uritur, donec odorem Acidi sulphurosi emittere cesset et in pulverem cinereum conversum sit. Oxidum, hoc modo exortum, in crucibulo ignis ope liquatur; si autem liquescere recusat, in pulverem tenerrimum teritur et cum *Antimonii crudi* pulverati vigesima vel sedecima parte

commiscetur; quo facto, igne liquatur et liquatum effunditur, ut refrigescat.

OXIDUM ZINCICUM.

Rec. *Sulphatis zincici* libram. . . . . p. 1.
Solvitur in
Aquæ destillatæ libris viginti. . . . . . . p. 20.
Solutioni *Gase Chlori* saturatæ et dein, ad Chlorum fugandum, calefactæ additur sensim et caute solutionis *Sodæ depuratæ* parva copia, quamdiu hæc præcipitatum non album efficit. Tum, præcipitato colatione secreto, liquor clarus inter agitandum miscetur cum solutione e *Sodæ depuratæ crystallisatæ* libra (p. 1.) et *Aquæ destillatæ* libris decem (p. 10) confecta. Præcipitatum, per quietem demissum, colo colligitur et probe eluitur; siccatum deinde et in pulverem contritum in catillo argillaceo tecto, calore non nimis aucto, candefit, donec residuum cum *Acido hydrochlorico*, Aquâ satis diluto, non amplius effervescat. Servatur in vase clauso.

OXYMEL.

Rec. *Aceti Vini* uncias quattuor, ... p. 1.
Mellis depurati uncias octo. . . . . p. 2.
Miscentur.

OXYMEL ÆRUGINIS.

Linimentum Acetatis cuprici.

Rec. *Æruginis* tritæ uncias quinque, ... p. 5.
Aceti Vini uncias septem, ... p. 7.
Mellis depurati uncias quattuordecim. . . . p. 14.
Lento igne, inter assiduam cum spathula lignea agitationem, ad spissitudinem unguenti decoquuntur.

OXYMEL SCILLÆ.

Rec. *Aceti Scillæ* uncias quattuor, ... p. 1.
Mellis depurati uncias octo. . . . . p. 2.
Miscentur.

PASTA ALTHÆÆ.

Rec. *Althææ radicis* incisæ uncias sex, ... p. 6.
Aquæ destillatæ ferventis tantum,
ut, post macerationem per horam, fiat colatura librarum sex (p. 72), quæ per diem noctemque seponitur. Liquidum deinde cautissime defunditur, in quo calefacto solvuntur
Gummi arabici pulverati libræ duæ cum dimidia, ... p. 30.
Sacchari albi pulverati libræ tres, ... p. 36.
omniaque post horas aliquot per pannum laneum trajiciuntur et, continue spathulâ ligneâ agitando, evaporant in balneo vaporis ad mellis spissitudinem. Massa, ab igne remota, agitatur multum et celeriter, ut albescat; cui paullatim admiscentur
Ovorum albumina, in spumam quassata, viginti quattuor.

Exiguo adhibito calore continue agitatur massa, donec manibus non adhæreat, cui denique additur
Aquæ Aurantii uncia; . . . . p. 1.
quo facto formantur Pastæ, pulvere *Amyli* conspergendæ et loco calido exsiccandæ.

PASTA AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum amararum* decorticatarum drachmas duas, ... p. 1.
Amygdalarum dulcium decorticatarum uncias sex. . . . . p. 24.

Mixta contunduntur in mortario lapideo, adjectâ sensim

Aquæ Aurantii sufficiente quantitate;

deinde admiscentur

Sacchari albi pulverati unciæ sex. . . . . p. 24.

Fit massa, quæ, manibus tractata, eis non adhæreat.

PASTA LIQUIRITIÆ.

Pasta Glycyrrhizæ.

Rec. *Liquiritiæ radicis* incisæ uncias quattuor et semis, ... p. 9.

Aquæ destillatæ fervidæ sufficientem quantitatem, ut, post macerationem horæ unius, fiat colatura librarum quinque (p. 120), quæ per dies et noctes duas seponuntur. In liquore limpido, defuso et calefacto,

Gummi arabici pulverati

Sacchari albi, singulorum libra et semis p. 36.

solvitur. Post diem noctemque liquor limpidus, iterum defusus, balnei vaporis calore sine agitatione vaporat, donec gutta, in lamina vitrea frigida excepta, gelatinæ instar concrescat. Tum, detractâ pelliculâ, in patellas, *Oleo Cacao* illitas, effunditur massa, calore modico siccanda.

PHOSPHAS CALCICUS STIBIATUS.

Pulvis Jacobi (James Powder).

Rec. *Antimonii crudi*, in pulverem crassum triti,

Cornus Cervi rasi, singulorum uncias sex.

Miscentur et injiciuntur ollæ ferreæ latæ, igne rubenti, et assidue agitantur, donec in materiam coloris cinerei urendo abierint. Massa, ab igne remota, in pulverem teritur et in crucibulum immittitur; huic

Pasta Viennensis

Rp. Hydrat Kalis p. v.
Calcis viv. p vj
f. c. Alkohole pasta
Paratur ad usum

Rp. Phosph. Calc. Stib. gr v
Ipecacuanhae gr j.
Opii gr ½.

Morb. Brightii

crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjungitur, ignisque subministratur, ad incandescentiam sensim augendus; post binas horas ab igne removetur, et massa frigefacta in pulverem subtilissimum teritur.

PHOSPHAS NATRICUS.

Soda phosphorata.

Rec. *Cornus Cervi usti* vel *Ossium Bovis* ustorum et pulveratorum libras quinque, . . p. 10.
Acidi Vitrioli libras quattuor et semis, . p. 9.
Aquæ destillatæ libras viginti. . . . . . p. 40.

Mixta digeruntur in vase fictili vitreato per aliquot dies, mixturam sæpius agitando. Solutio, Aquam affundendo diluta, per linteum fortiter exprimendo colatur, et Sulphas calcicus remanens Aquâ destillatâ abluitur, quamdiu hæc sapore acido imbuatur.

Liquori colato, cum aqua lotionis mixto, *Gas Sulphidi hydrici* (e *Sulphureto ferroso* et *Oleo Vitrioli, Aquâ* diluto, extricatum) immittitur, quamdiu hoc efficit præcipitatum, quod a liquore, dum odorem Sulphidi hydrici amiserit, calefacto, colatione separatur. Liquidum, vaporatione ad trientem consumptum, a sulphate calcico deposito colatione liberatur et

Sodæ depuratæ, in *Aqua destillata* solutæ, tantâ copiâ

præcipitatur, ut alkali instar colorem chartæ exploratoriæ mutet. Tum iterum colatur et ad crystallos formandas vaporando et refrigerando cogitur. Sal concretum chartâ bibulâ celeriter siccatur et in vase clauso servatur.

PILULÆ.

In pilulis faciendis substantiæ, quæ jubentur, quotquot siccæ sunt et friabiles, tenuissime pulveratæ ponderantur et in mortario vitreo vel porcellaneo intime conteruntur; et quidem primum illæ, quarum minima jubetur copia, sive friabiles sunt sive non friabiles (e. g. extracta). Tum adduntur ceteræ substantiæ et, si præscriptum fuerit, materiæ cujusdam copulantis tantum, ut massa, diligentissime subacta, (ita ut omnia mixta sint, et nullum partium discrimen observare liceat), fundo mortarii nequaquam digitisque non multum adhæreat. Formantur deinde pilulæ, præscripto numero vel pondere, *Lycopodio*, nisi aliud dicitur, conspergendæ et in vase bene obturato asservandæ.

Major pilularum copia simul non est paranda, ne inter servandum exsiccentur vel vim amittant. *Pilulas Chloreti hydrargyrici corrosivi*, *Pilulas Nitratis argentici* et *Pilulas Sulphatis cuprici ammoniacalis* non nisi ex præscripto Medici parare licet. Dantur in vase obturando.

PILULÆ ALOËS AMARÆ.

Pilulæ e Gentiana crocatæ.

Rec. *Extracti Gentianæ* drachmas duas, ... p. 2.
Massæ Pilularum Aloës crocatarum drachmas tres. . . . . p. 3.

Formantur hinc pilulæ trecentæ æquales.

Pilulæ anticachecticæ

Rx. Sapon. Amygdalin ℥ß

Gmi. Ammoniac. ℨij

Mass. pil. Aloës Crocat ℥ß

Tinct. Myrrhæ. qv. sat. ut f. M.

ex qva form. pil pond gr. iij

Ds. Sr.

Pilulæ Asæ foetid. Martiales

Rx. Asæ foetid. pulver

Extract. Gentianæ

Limaturæ Ferri āā ℨj

Mr. f. pil. No. LX. Sr. 4p. 3–4. dd.

Pil. asiaticæ Prof. Hass.

Rx. Acid Arsenicos. gr iv

Piper. Nigr. ℨj

in pulv. subtilis. redact. adde

Pulv. Gi. arab. ℥ß

Aqua destill. qv. sat. ut f. Massa

ex qva form. pil aqval No. XLVIII

Pulv. Cort. Cinnamom. consperg.

Ds. Sr.

Pilul. antichlorot. Kempfii

Rx. Galbani

Myrrhæ āā ℨiij

Sulphat. ferros. ℥ß–j

Syrup. Aurant. qu. s. ut f. pil

No. 240. Sr. 8p. 3–4 dd.

Pilulæ Antidysentericæ

Rx. Ceræ flavæ ℥ß
Sperm. Ceti liquefactis
uni calore adde
Catechu pulv. āā ℥j
Ol. aether. Caryophyll. gtt. xij
M. f. pil. pond. gr. vj
S. 3–4 eller flere på dagen.

Pilulæ Anticardialgicæ

Rx. Bilis bovin. inspissat.
Subnitr. Bismuthi.
Rhei Sibiric. āā ℥jß
Extr. Nuc. Vomic. gr. xij
M. f. pill. No. XCvj.
S. 2-4-8 p. 2-4 ggr. d. d.

Pil. Fætid Succinat

Rx. Extr. Gentianæ.
Pulv. Assæ Fætid
Chloret. Ferric. Ammon.
āā ℥j
Ol. Succin. Empyreumat.
rectificat. gtt. iij
M. f. pil. No. LX.

Pil. Antihystericæ

Rx. Gi. Galban. ℥j ℥
Sagapeni
Myrrhæ āā ℥ß
Assæ Fætid. ℥ß
M. f. c Tinct. Myrrhæ. pill. pond.
(90 pil.) gr. iij.

Pil. Antihysteric. Rosénii

Rx. Assæ Foetid ℥ij
Sal. C. C.
Castor. angl. āā ℥ß
Opii gr. vj
M. f. pil. pond. gr. ij
S. 10 p. 2 d. d.

Pilulæ anticardialgica.

Rx. Extr. trifol. aquat.
Pulv. resin. Guajac. āā ℥ij
— Rhei indic. ℥j
Extr. nuc. vomic. gr. XV.
M. f. pil. N. CXX. S. 4 pil. 3–4
d. d.

Pil. antihyster. Fowleri

Rx. Galbani.
Assæ foetid.
Myrrhæ. āā ℥j
Castor.
Camphor.
Acid. Succinic. āā gr. x.
f. c. suff. quant. spirit. pil. pond.
gr. ij S. 6 p. 3–4 d. d.

PILULÆ ALOËS CROCATÆ.

Pilulæ rufi. /Rufi/

Rec. *Myrrhæ electæ,*
Croci orientalis, singulorum drachmas duas, p. 1.
Aloës lucidæ unciam dimidiam, ... p. 2.
Syrupi Sacchari quantum satis,
ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero trecentæ æquales.

PILULÆ CHLORETI HYDRARGYRICI ☿ CORROSIVI.

Pilulæ e Hydrargyro corrosivo albo. loco Pilularum Muriatis hydrargyrici corrosivi. /r/

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi,*
Salis ammoniaci depurati, singulorum scrupulum. . . . . p. 1.
Solvuntur in
Aquæ destillatæ fervidæ quantitate sufficiente, ut additis
Sacchari albi scrupulo, ... p. 1.
Althææ radicis drachmis duabus, ... p. 6.
fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero centum et sexaginta æquales.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS COMPOSITÆ.

Pilulæ catharticæ.

Rec. *Caryophyllorum* scrupulum, ... p. 2.
Extracti Jalappæ scrupulos duos, ... p. 4.
Chloreti hydrargyrosi drachmam, ... p. 6.
Extracti Colocynthidis compositi drachmas duas et semis, ... p. 15.
Extracti Absinthii drachmam sesquialteram vel quantum satis. . . . . p. 9.

Formantur pilulæ numero centum et triginta quinque æquales.

PILULÆ FOETIDÆ SUCCINATÆ.

Pilulæ foetidæ.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici rectificati* scrupulum dimidium, ... p. 1.
Acidi succinici drachmam dimidiam, . . . p. 3.
Castorei canadensis,
Assæ foetidæ, singulorum drachmam unam et dimidiam, ... p. 9.
Tincturæ Myrrhæ quantum sufficit,
ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero centum et decem æquales.

PILULÆ GUMMI AMMONIACI THEBAICÆ.

Rec. *Opii levantici* grana sex, ... p. 3.
Scillæ radicis grana decem, ... p. 5.
Myrrhæ electæ drachmam dimidiam, . . p. 15.
Gummi ammoniaci drachmam. . . . . . . p. 30.
Mixta cum guttulis aliquot *Spiritus concentrati* formantur in pilulas triginta æquales.

PILULÆ GUMMI GUTTÆ ALOËTICÆ.

Rec. *Gummi Guttæ*,
Gummi arabici, singulorum scrupulos duos, p. 2.
Galbani drachmam, ... p. 3.
Aloës lucidæ scrupulos quinque. . . . . . p. 5.
Cum *Ætherolei Carvi* scrupulo . . . . p. 1.
et *Syrupi Sacchari* quantitate sufficiente subiguntur in massam, ex qua formantur pilulæ numero octoginta æquales.

PILULÆ

Pilulæ Crotonis

℞. Ol. Crotonis gtt. iv
Pulv. rad. Althææ
Syrup. Sacchar. aa ʒß
M. f. pil. N: XXIV.

Pilulæ Fœtidæ

℞. Assæ foetid.
Sapon. dur.
Bilis bovin. inspissat āā ʒj
M. f. pil. N: LX

Pil. Foetid. Aloëticæ

℞. Mass. pil. foetid ʒiij
Pulv. Aloës Socotrin ʒß

Pil. Deobstruentiæ

℞. Gmi Ammoniac.
- Sapon. Amygdalin āā ʒjß
Pulv. Rad. Scillæ
— Aromat. aa ʒß
Syrup. Sacch qv. sat. ut f.
M. ex. qua form. pil pond. gr iv

Pil. drasticæ.

℞. Olei croton gtt. ii
— foenicul. gtt. j.
farin. secal. cereal. q. s.
Divid. in duas part. aequal.

Pil. Emmenagoga.

Rx. Galban. ʒij
Extr. Hellebor. nigr. ʒj
Croci sativ. gr X
Aloës ãã gr X
M. f. c. Tinct. Aloës Crocat. pil Aequal. N: LX.

Pilulæ Hahni

Rx. Pulv. fol. Digital
— Rad. Scillæ
— Ipecacuanhæ ãã ℈j
Sulphat Quiniæ ℈ij
Extract. Enulæ ʒj
M. fiat. pil N: LXXX.
Conspurg. pulv. rad Glycyrrhizæ.

Pilulæ Creosoti

Rx. Creosoti ʒj
Gi arab.
Sacchar. alb. ãã ʒij
Syrup. Sacch. q. s. ut. f. pil. N: CXX.

Pilulæ Creosoti Prof Hass.

Rx. Creosoti ʒj
Rad. Althea pulv. ℥i℈ x
Syrup. Althea q. sat. u f. pil N: LX.

Pilulæ ad. Decoct. Zittmanni

Rx. Calomel. gr xij
Pulv. rad. Jalappæ ʒvj
Syrup. Sacch. q. sat. ut. f pil N: XL.
Dr. Gr.

PILULÆ HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmas duas, . . p. 2.
Conservæ Rosæ drachmas tres. . . . . . . p. 3.
Mixtis et contritis, donec globuli Hydrargyri prorsus disparuerint, adjicitur
Liquiritiæ radicis drachma, ... p. 1.
et fit massa, in pilulas ducentas et quadraginta æquales statim dividenda.

PILULÆ MYRRHÆ FERRATÆ.

Rec. *Sulphatis ferrosi* drachmam dimidiam, . . p. 1.
Carbonatis kalici puri drachmam, ... p. 2.
Myrrhæ electæ drachmas duas. . . . . . . p. 4.
Ex his cum parva *Mucilaginis Gummi arabici* copia formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ NICOTIANÆ.

Rec. *Extracti Nicotianæ* drachmam dimidiam, p. 1.
Liquiritiæ Succi unciam dimidiam. . . . . p. 8.
Cum *Aceti Scillæ* quantitate sufficiente fit massa, in pilulas nonaginta æquales dividenda.

PILULÆ NITRATIS ARGENTICI.

Rec. *Nitratis argentici* scrupulum dimidium. . p. 1.
Solvitur in
Aquæ destillatæ sufficiente quantitate.
Solutioni additis
Althææ radicis drachmis duabus, ... p. 12.
fit, si opus est cum exigua copia *Syrupi Sacchari*, massa, quæ in sexaginta pilulas æquales dividitur.

PILULÆ SAPONIS.

Pilulæ saponaceæ.

Rec. *Extracti Betulæ* drachmam, ... p. 1.
Saponis amygdalini drachmas duas. . . . p. 2.
Formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ STYRACIS THEBAICÆ.

Pilulæ e Styrace.

Rec. *Opii levantici* drachmam, ... p. 1.
Styracis depurati drachmas duas, ... p. 2.
Liquiritiæ Succi drachmas tres. . . . . . . p. 3.
Formantur pilulæ centum et octoginta æquales.

PILULÆ SULPHATIS CUPRICI AMMONIACALIS.

Pilulæ e Cupro ammoniaco.

Rec. *Sulphatis cuprici ammoniacalis* scrupulum dimidium, ... p. 1.
Solvitur in quantitate sufficiente
Aquæ destillatæ, cum
Ammoniaci caustici pari portione mixtæ.
Solutio optime subigitur cum
Extracti Gentianæ drachmis duabus. . . p. 12.
et *Cinchonæ regiæ corticis* quantitate sufficiente, ut fiat massa, quæ in pilulas æquales numero sexaginta dividitur.

PULPA TAMARINDORUM DEPURATA.

Rec. *Tamarindorum pulpæ* libras duas, ... p. 4.
Aquæ destillatæ fervidæ libras quattuor. . p. 8.

Pil. Pectorales Nos.
Rec. Semin. Phellandrii ℥
Gi. Galbani ℥
Extract. Dulcamar.
- Card. benedict. āā ʒii
- Conii spir. ʒß.
M. f. pil. N: CXX

Pilulæ Plameri
℞. Calomel. ʒj
Sulphur. Aurat. Antimon. ʒij
Succ. liquir. q. s. ut f. pil. pond. gr ij
Dr. Sr.

Pilulæ Foetid. c Martiales Nos.
℞. Chlorid. ferric. Ammon. ʒij
Asa foetid
Galbani āā ʒj
Tinct. Valerian. q. s. ut f. pil. (Ol. aether. Cymini gutt. xxx)
N: CXX. Sr 5–10 p. 2–3 dd.

Rec. Mass. pill. Myrrhæ ferrat. ʒß.
Extr. Nuc. Vomic. gr XV.
f. pil. N: CXX Sr 3 p. 3 q. dd.

Rec. Massæ pil. foetid. Martial. ʒß.
Extr. Nuc. Vomic. spir. gr xij
M. f. pil. N: CXX Sr 9 p. 3 dd.

Pilulæ Picis

℞. Picis liquidæ
Rad. Althææ pulv. āā ʒß
M. f. c. Mucilag Gmi Arab.
pil pond. gr iij

Pilulæ Saponis fetidæ

℞. Massæ ad pil. Saponis ʒiij
Assæ foetidæ ʒj
M. f. pil. pond. gr iv

Pilulæ Scilliticæ

℞. Pulv. Gmi ~~Ammoniaci~~ Ammoniaci
– Succ. Liquiritiæ
– Cardamom. Min. āā ʒj
– Scill. Maritim ℈viij
M. f. M. ex qua form. pil pond gr ij

Pilulæ Taëreæ

℞. Ol. Empyreumatic ex ligno fossil.
Sulphuret. Stib. nigr. prep. āā ʒj
Pulv. Resin. Oliban. ʒiv
– Stipit. Dulcamar q. s. ut f. pil. pond. gr iij

Pilulæ Solani.

Recip. Fermentol. Solan. gr x
Pulv. rad. Althææ q. s. f. massa
e qua form. pil. N. XX.
S. 2 pr. die [illegible]

Inter agitandum macerantur, donec refrixerint; tum per linteum firmum exprimendo colantur, et residuum cum

Aquæ destillatæ libris duabus . . . . p. 4.

eodem modo bis tractatur. Liquores collecti per diem noctemque seponuntur, quo facto humor clarus defunditur et per linteum colatur; deinde in vase porcellaneo, additâ

Sacchari albi librâ dimidia, ... p. 1.

evaporat ope balnei vaporis, donec pondus specificum 1.50 teneat. Servatur in vase murrhino vel porcellaneo, loco frigido.

PULVERES SIMPLICES.

Omnis materia, in pulverem redigenda, primum ab humoribus, quæ pulverationi officiant, liberanda est, quod quidem siccando fit ita, ut adhibeatur calor paullatim augendus nec umquam +100° C. superans.

Fit contusio in mortariis tectis, tali natis materiâ, ut nec facile adedantur nec duritiâ cedant iis rebus, quæ contundenda immittuntur.

Ad cernendum adhibentur cribra, filis bombycinis contexta, et ea, in ipso opere, supra infraque obtecta.

Quoties fit, ut pulvis, quum incipiat contusio, alius, alius, quum desinat, recipi soleat, tenendum est, ut omnis pulveris copia, antequam in vas suum ingeratur asservanda, bene commisceatur.

Omnes pulveres, simul atque contusi sunt et parati, in vasis bene clausis adservantur depositi, ne vario umquam aëre afficiantur. Quæ pellucida sunt pulveribus conservandis vasa, ita collocari oportet, ut ad ea, quæ immissa servantur, nullus sit radiis solis adeundi locus.

Accuratior singulorum descriptio.

Classis prima.

Hac continentur eæ materiæ, quarum pulvis cernendus est cribro ita contexto, ut singuli pollices decimales capiant fila circiter 120 (hoc est, pedis duodecima pars (werktum) capiat 100) vel ut singuli pollices quadrati decimales 14400 foramina habeant (hoc est, pars duodecima pedis (werktum) quadrata habeat 10000).

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Filicis maris, quæ prius est decorticanda.
Radix Jalappæ.
Radix Rhei indici.
Radix Serpentariæ.
Radix Valerianæ, quæ ope pistilli lignei ab humo est purganda.
Cortex Cinchonæ.
Cortex Cinnamomi.
Cina levantica.
Guajaci resina.
Gummi Gutta.
Indigo.
Opium.
Sanguis Draconis.
Scammonium aleppense.
Succinum.
Colophonium.
Olibanum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aconiti; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres ponderis foliorum quartas partes æquat, contusioni finis imponitur. Exigua tantum hujus pulveris copia simul paranda est.

Folia Belladonnæ,
Folia Digitalis,
Folia Hyoscyami,
Folia Nicotianæ, } ut Folia Aconiti.
Folia Sennæ,
Folia Stramonii,
Herba Conii,

Radix Belladonnæ; contunditur, donec fasciculus quasi fibrarum relinquatur.

Radix Ipecacuanhæ; ejus nihil, nisi cortex radicis, in pulverem redigitur.

Radix Zingiberis, ut Radix Belladonnæ.

Castoreum; cujus membranæ detrahendæ sunt.

Classis secunda.

Hac continentur eæ materiæ, quarum pulvis cernendus est cribro ita contexto, ut pollex decimalis fila capiat circiter 96 (hoc est, pedis duodecima pars (werſtum) capiat 80) vel ut singuli pollices quadrati decimales 9216 fere foramina habeant (pars duodecima pedis (werſtum) quadrata habeat 6400).

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Angelicæ.

Radix Artemisiæ ope pistilli lignei ab humo purganda.

Radix Ari.

Radix Calami.

Radix Chinæ.

Radix Columbo.

Radix Enulæ.

Radix Iridis florentinæ.

Radix Pyrethri.

Radix Saleb.

Radix Scillæ, in vasis parvis ac bene clausis asservanda.

Radix Zedoariæ.
Cortex Canellæ albæ.
Cortex Cascarillæ.
Cortex Quercus.
Semina Anisi.
Semina Cardamomi minoris.
Semina Carvi.
Semina Coriandri.
Semina Cymini.
Semina Foeniculi.
Semina Petroselini.
Semina Phellandrii.
Semina Sabadillæ.
Acidum citricum.
Acidum tartaricum.
Agaricus.
Aloë.
Anisum stellatum.
Arsenicum album.

Assa foetida; et in frigore contundenda et pulverata loco frigido asservanda.

Aurantii fructus immaturi.
Benzoë.

Camphora; contunditur additâ parvâ Spiritus concentrati copiâ.

Cantharides; pulveranti os velo madido obligatum esse debet.

Caryophylli.
Catechu.
Coccionella.
Crocus.
Cubebæ.
Elaterium.

Euphorbium; huc pertinet illud, quod de Cantharidibus monitum est.

Flavedo Aurantii.

Flavedo citri.
Folia Uvæ ursi.
Fuligo.
Gallæ turcicæ.
Graphites.
Galbanum, } ut Assa foetida.
Gummi ammoniacum, }
Gummi arabicum.
Kino.
Lauri baccæ.
Magnesium nigrum.
Macis.
Mastix.
Myrrha.
Nux vomica.
Nux moschata.
Ossa Sepiæ.
Pechurim faba.
Piper album.
Piper hispanicum.
Piper jamaicense.
Ratanhiæ extractum.
Sales omnes.
Saccharum.
Saccharum lactis.
Sapo.

Secale cornutum; hujus ne habeatur jam pulverata major copia, et quod est pulveratum in vasis admodum parvis ac bene clausis asservandum.

Succus Liquiritiæ.
Sulphur citrinum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aurantii; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres foliorum quartas partes æquat, contusioni finis imponitur.

Folia Bucco,
Folia Cardui benedicti,
Folia Trifolii aquatici,
Summitates Absinthii,
Summitates Centaurii minoris,
Summitates Millefolii,
Summitates Rosmarini sylvestris,
Summitates Tanaceti,
Flores Arnicæ,
Flores Chamomillæ,
Flores Lavendulæ,
Herba Cerefolii,
Herba Fumariæ,
Herba Gratiolæ,
Herba Hyssopi,
Herba Mari,
Herba Meliloti,
Herba Melissæ,
Herba Menthæ crispæ,
Herba Menthæ piperitidis,
Herba Scordii,
Herba Thymi,
Herba Violæ tricoloris,

} ut Folia Aurantii.

Radix Althææ; contunditur, donec fasciculus quasi fibrarum reliquus sit.

Radix Arnicæ,
Radix Caryophyllatæ,
Radix Galangæ,
Radix Gentianæ,
Radix Hellebori albi,
Radix Hellebori nigri,
Radix Imperatoriæ,
Radix Liquiritiæ,
Radix Ligustici,
Radix Pimpinellæ,
Radix Saponariæ,

} ut Radix Althææ.

Pulvis. Alkalin. stibiat

Rp. Sulphur. Aurat. Antimon.
Pulv. Rad. Zingiber āā gr ij
Bicarbon. kalii.
Rad. Glycyrrhiza pulv. āā gr x

Radix Senegæ,	ut Radix Althææ.
Radix Tormentillæ,	
Stipites Dulcamaræ,	
Sabinæ ramuli,	
Cortex Fraxini,	
Cortex Hippocastani,	
Cortex Padi,	
Cortex Salicis,	
Cortex Simarubæ,	

Classis tertia.

Huc pertinent eæ materiæ, quæ contundendo et trajiciendo per cribrum setaceum in farinam redigendæ sunt.

Semina Lini.

Semina Sinapis nigræ; oleo antea expresso.

PULVERES COMPOSITI.

Parantur diligenter conterendo et intime commiscendo partes, unde conficiantur, seorsim pulveratas (Pulveres simplices) et ponderatas; in quo faciendo tenendum est, ut illæ, quarum copia minima præscripta sit, primum conterantur, ceteræ deinde admisceantur. Ubi in pulvere composito conficiendo præscribitur materia quædam haud friabilis, e. g. extractum, hæc cum friabilium parva copia primum conteritur, quo facto omnia miscentur, ut pulverem æquabilem habeas.

Non nisi exiguæ pulverum compositorum quantitates simul parandæ sunt, nec servandæ, nisi in vasis vel vitreis vel porcellaneis, arcte claudendis.

PULVIS ALUMINIS KINOSATUS.

Pulvis stypticus.

Rec. *Kino*,
Pulveris aromatici, singulorum drachmas duas, p. 1.
Aluminis crudi unciam dimidiam. . . . . p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS AMARUS FERRATUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum*,
Sulphatis ferrosi, singulorum drachmas duas, p. 1.
Cinæ levanticæ,
Tanaceti summitatum, singulorum unciam dimidiam. . . . . p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS ARI ALKALINUS.

Pulvis Ari compositus.

Rec. *Carbonatis kalici puri* scrupulos duos, . . . p. 2.
Canellæ albæ corticis drachmam, ... p. 3.
Calami aromatici radicis,
Pimpinellæ radicis,
Ari radicis, singulorum drachmas duas. p. 6.
Fit pulvis.

PULVIS AROMATICUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum*,
Zingiberis radicis, singulorum unciam dimidiam, ... p. 1.
Cinnamomi ceylanici corticis unciam. . . . p. 2.
Fit pulvis.

Pulv. Caryophyllat. Comp.

Rx Carbon. Calcis praeparat.
Pulv. Cort. Cascarillae
Rad. Gei urban. pulv.
Gummi Arab. āā gr. v–xv
M. f. pulv. Dr. 4–6 p. dd.

Pulv. Digital. Comp.

Rx Pulv. fol. Digital ℈iv gr. xvj
Nitr. depurat. pulv.
Bitartr. Kalic. depulv. āā ℥ij
M. f. pulv.

Pulvis Diureticus
(Ph. Pauper. Hufelandi)

Rx Rad. Scillae
Fol. Digital. āā gr. j
Aethiop. Juniperi gtt. ij
Tartar. Boraxat.
Rad. Glycyrrhizae āā ℈j
Cort. Cinnamom. gr. ij
M. f. pulv.

PULVIS BICARBONATIS NATRICI TARTARICUS.

Rec. *Bicarbonatis natrici*,
Acidi tartarici sicci, singulorum partes quinque,
Sacchari albi partes sex.
Paratur ex tempore.

PULVIS CHLORETI HYDRARGYROSI THEBAICUS.

Pulvis Muriatis hydrargyrosi thebaicus.

Rec. *Opii levantici* drachmam, ... p. 1.
Chloreti hydrargyrosi drachmas duas, . . p. 2.
Sacchari albi drachmas septemdecim. . . p. 17.
Fit pulvis.

PULVIS ENULÆ AROMATICUS.

Rec. *Angelicæ radicis* drachmas duas, ... p. 1.
Pulveris aromatici drachmas sex, ... p. 3.
Enulæ radicis unciam sesquialteram. . . . p. 6.
Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS.

Rec. *Althææ radicis* unciam, ... p. 1.
Gummi arabici,
Sacchari albi, singulorum uncias duas. . p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS STIBIATUS.

Rec. *Kermetis mineralis* drachmam, ... p. 1.
Sacchari albi drachmas septem, ... p. 7.
Pulveris gummosi uncias quattuor. . . . p. 32.
Fit pulvis.

PULVIS HÆMOSTATICUS BONAFOUX.

Rec. *Carbonis ~~ligni~~ præparati,*
Gummi arabici, singulorum unciam, . . . p. 1.
Colophonii uncias quattuor. . . . . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ HYDRARGYRATUS.

Rec. *Chloreti hydrargyrosi* drachmas duas, . . p. 1.
Jalappæ radicis drachmas sex. . . . . . . p. 3.
Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ SALINUS.

loco Pulveris Jalappæ compositi.

Rec. *Zingiberis radicis* drachmas duas, ... p. 1.
Jalappæ radicis,
Gentianæ rubræ radicis, singulorum unciam, p. 4.
Salis cathartici uncias duas. . . . . p. 8.
Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ TARTARICUS.

Rec. *Jalappæ radicis* unciam, ... p. 1.
Tartari depurati uncias duas. . . . . p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS IPECACUANHÆ THEBAICUS.

loco Pulveris Doveri.

Rec. *Opii levantici,*
Ipecacuanhæ radicis, singulorum drachmam, p. 1.
Sulphatis kalici unciam. . . . . p. 8.
Fit pulvis.

PULVIS

Pulv. Hæmorrhoidalis Carlandri

Rep. Resin. Guajaci gr X–XV.
Supertartrat. Kalicy ℈j–3ß.
Elæosacch. Carvi gr viij
Fr. 1 p. morg. a ft. (Hæmorrh. Vertig)

Pulv. Lenitivus Tartarisat

Rp. Pulv. Fol. Sennæ
Elaeosacchar. Foeniculi āā
ʒij
Bitartr. Kalic. ʒß
M. f. pulv.

Pulvis Nitros. Ph. Mil.

Rp. Pulv. Nitr. depur.
- Bitartr. Kalic. āā ʒj
- Sacchar. alb. ʒiv

M. f. pulv.

PULVIS MAGNESIÆ COMPOSITUS.

Pulvis galactopoeus Rosenii.

Rec. *Flavedinis Aurantii*,
Foeniculi seminum,
Sacchari Lactis, singulorum drachmas duas, p. 1.
Magnesiæ albæ unciam. . . . . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS MAGNESIÆ TARTARICUS.

Pulvis aërophorus.

Rec. *Acidi tartarici* sicci,
Magnesiæ albæ, singulorum unciam dimidiam, p. 1.
Sacchari albi uncias duas. . . . . p. 4.

Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto Medici datur, unciæ cuique *Ætherolei Menthæ piperitidis* guttæ duæ admiscendæ sunt.

PULVIS NITRI OXALICUS.

Pulvis nitrosus Ph. Suec. Ed. IV vel
Pulvis refrigerans Rosensteinii.

Rec. *Salis Acetosellæ* drachmas duas, ... p. 1.
Nitratis kalici depurati drachmas sex, . p. 3.
Sacchari albi uncias duas et dimidiam. . p. 10.
Fit pulvis.

PULVIS NITRI TARTARICUS.

loco Pulveris nitrosi Ph. Milit.

Rec. *Magnesiæ albæ* drachmam, ... p. 1.
Acidi tartarici sicci drachmas duas, . . . p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas decem, p. 10.
Sacchari albi uncias tres et drachmas sex. p. 30.

Acidum tartaricum primo cum Magnesia teritur; dein Saccharum, et postremo Nitras adduntur, et omnia teruntur, ut fiat pulvis.

PULVIS NITRI THEBAICUS.

Pulvis thebaicus vel sedativus.

Rec. *Opii levantici* scrupulum dimidium, . . . p. 1.
Nitratis kalici depurati scrupulos quinque et dimidium, ... p. 11.
Sacchari albi unciam. . . . . p. 48.
Fit pulvis.

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA.

(P. Infantum Rosensteinii)

Rec. *Magnesiæ albæ,*
Fœniculi seminum,
Sacchari albi, singulorum unciam dimidiam, p. 1.
Rhei indici radicis unciam. . . . . p. 2.
Fit pulvis.

PULVIS RHEI SALINUS.

Pulvis digestivus.

Rec. *Rhei indici radicis,*
Salis cathartici, singulorum unciam vel pares portiones.
Fit pulvis.

PULVIS SACCHARI ACIDULUS.

Rec. *Acidi tartarici* drachmam, ... p. 1.
Sacchari albi, Flavedine Citri recente confricati, unciam unam et dimidiam. . . . . . . p. 12.
Fit pulvis.

PULVIS SCILLÆ BORAXATUS.

Rec. *Scillæ radicis* grana sex, ... p. 1.
Boracis drachmam, ... p. 10.
Sacchari albi drachmas tres, ... p. 30.
Tartari depurati unciam. . . . . p. 80.
Fit pulvis.

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

Rec. *Scillæ radicis* drachmam, ... p. 1.
Pulveris aromatici drachmas duas, ... p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas tres, . . . p. 3.
Tartari depurati unciam dimidiam. . . . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS SENNÆ COMPOSITUS.

Rec. *Scammonii aleppensis* drachmas duas, . . . p. 1.
Sennæ alexandrinæ unciam dimidiam, . . . p. 2.
Tartari depurati unciam. . . . . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS TARTARI COMPOSITUS.

Pulvis dentifricius.

Rec. *Coccionellæ*, cum guttis aliquot *Succi Citri* tritæ, drachmam, ... p. 1.
Iridis florentinæ radicis,
Myrrhæ electæ,
Kino singulorum unciam, ... p. 8.
Tartari depurati uncias tres. . . . . p. 24.
Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto datur, unciæ cuique admiscendæ sunt
Ætherolei Caryophyllorum guttæ quattuor.

QUERCITANNAS PLUMBICUS.

Rec. *Quercus corticis* contusi uncias sex. . . . . p. 1.

Fit cum

Aquæ destillatæ sufficiente quantitate decoctum librarum quattuor et semis (p. 7), cui inter agitandum instillatur

Solutio Subacetatis plumbici,

quamdiu præcipitatum prodeat, quod, colo collectum et Aquâ destillatâ elotum, in lagenam amplioris orificii etiamnunc humidum inditur. Deinde affunditur

Spiritus diluti tantum,

ut is non nihil superemineat, clauditurque lagena.

SAL CORNUS CERVI.

Subcarbonas ammonicum empyreumaticum.

Sal, quod una cum Liquore Cornus Cervi prodit, cum *Carbonis vegetabilis præparati* quarta parte commiscetur, et, in apparatu idoneo, igne lenissimo sublimatur.

Servatur loco obscuro in vase bene clauso.

SAPO AMMONIACATUS.

Emplastrum Saponis ammonici.

Rec. *Salis ammoniaci depurati* in pulverem redacti,
Saponis viridis, singulorum partes æquales.
Miscentur.

SAPO AMYGDALINUS.

Sapo medicatus.

Rec. *Sodæ depuratæ crystallisatæ* libram, . . p. 3.
Aquæ destillatæ libras quinque. . . . . p. 15.

Fit solutio, quæ cum *Calce usta*, in hydratem conversa, caustica redditur, ut ad Solutionem Hydratis kalici præceptum est. Liquor causticus, subsidendo in vase clauso depuratus, evaporat, donec pondus specificum 1.33 habeat.

Liquori frigefacto in vase figulino admiscentur

Olei Amygdalarum unciæ quattuor. . . . p. 1.

Seponitur vas loco temperato, et massa per vices agitatur spathulâ ligneâ, donec homogenea appareat et spissescat. Tum effunditur in cistulas ligneas planas; indurata scinditur in talos, calore modico siccandos.

SERICUM ADHÆSIVUM.

Emplastrum anglicanum.

Rec. *Ichthyocollæ* rasæ quantum placet.

Coquitur cum

Aquæ destillatæ sufficiente quantitate, ut solutio, ad calorem +4° C. refrigerata, vix concrescat et gelatina fiat.

Hac solutione, iterum calefaciendâ, *Sericum*, aut colorem faciei referens aut nigrum, tendiculæ ope expansum, illinitur, cavendo simul, ne solutio in aversam serici partem permeet; quo facto, loco mediocriter calido reponitur, ut siccetur. Quæ illinendi opera deinde duodecies vel sedecies repetenda est cum solutione tam calida, quam manus ferre queant. Postremo aversa serici pars cum *Tinctura Tolu* illinitur.

SERICUM EPISPASTICUM.

Taffetas vesicatorium.

Rec. *Cantharidum* pulveratarum uncias tres, . . p. 3.

Resinæ flavæ uncias quattuor, ... p. 4.

Olei Terebinthinæ uncias sex. . . . . p. 6.

Resinæ, in vase cupreo liquefactæ, sensim additur Oleum; digeruntur deinde in lagena vitrea cum pulvere Cantharidum per horas duodecim. Cum liquido, per linteum colato, illinitur *Sericum* extensum coloris nigri; quod per quattuor dies, bis in die, faciendum.

Servatur sericum in vase clauso inter chartæ ceratæ plagulas.

SOLUTIO ACETATIS AMMONICI.

Alkali ammoniacum acetatum, loco Spiritus Mindereri.

Rec. *Acidi acetici diluti* quantum placet.
Additur
Ammoniaci caustici tantum,
ut liquor saporem acidum omnino perdat, quamquam acidi instar etiamnunc reagat. Servatur in vase vitreo, bene clauso.

Non magna simul hujus solutionis copia paranda est; si autem inter servandum alkalina evaserit, id Acido acetico addito corrigendum.

SOLUTIO ACETATIS KALICI,

loco Mixturæ salinæ Ph. Paup.

Rec. *Carbonatis kalici puri* scrupulos octo, . . p. 1.
Aceti Vini quantum sufficit ad saturandum.
Saturatis adduntur
Syrupi Sacchari uncia, ... p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,
ut solutio pondus habeat libræ unius (p. 36.).

Ad usum paratur.

SOLUTIO ACIDI PHOSPHORICI.

Si in præparando Phosphate natrico *liquor acidus* et ope *Sulphidi hydrici* a metallis liberatus, loco

Diaphoreticum o slemlösande
Vid Catarrh. Rheumat. Hydrops
o andra sjukdomar der man vill
befordra hudutdunstningen
äfven diureticum.

Rx Solut. Acet. Ammon. ℥iß
——— Kalii ℥iß
Sr. 1 m. 2 t.

Rx Solut. acet. ammon. ℥j
Aquæ Sambuci ℥ij
Sr. 1 m. 2 t.

Till befordrande af hudens verksamhet. Anasarca acutum.

<u>Sol. Acet. Strychnini</u>
Rx Acetat Strychnini gr ij
Acid. Acet. dilut ℥j
Aquæ destill. ℥vij
M. f. Solutio Sr 10 dr. 3 dd

Solut. Alkalin. Amara

Rp. Carbon. Kalic. dep. ℥vj
Extract. Trifolii ℥ij
Aqu. Carvi ℔ij
M. S. 1 m 3 t.

Rp. Sol. Camph. spirit.
Tra. Lyttae aa ℥6 +
Ammon. caust. ℥ij
S. Liniment att ingnida på förlamade delar.

Sodæ depuratæ, *Ammoniaco caustico* saturatur, et colatura una cum Aqua lotionis ad siccum vaporat, Phosphas ammonicus habetur, qui in catillum platinicum, modico igne calefactum, per vices ingeritur ibique uritur, usque dum, igne ad rubedinem aucto, ammoniaci odorem emittere cessaverit, et massa liquata tranquille fluat. Tum effunditur massa, quæ etiamnunc calida in

Aquæ destillatæ trecuplo pondere

solvitur. Solutio colata servatur.

SOLUTIO CAMPHORÆ OLEOSA.

Oleum camphoratum.

Rec. *Camphoræ depuratæ* uncias sex. . . . . . p. 1.

Solvuntur digerendo et agitando in

Olei Olivarum communis libra una et semis. p. 3.

SOLUTIO CAMPHORÆ SPIRITUOSA.

Spiritus Vini camphoratus.

Rec. *Camphoræ depuratæ* unciam unam cum dimidia, ... p. 1.

Spiritus concentrati libras duas. . . . . . . p. 16.

Solvitur inter agitandum Camphora.

SOLUTIO CAMPHORÆ SPIRITUOSO-ÆTHEREA.

Liquor nervinus.

Rec. *Camphoræ depuratæ* uncias duas, ... p. 1.

Ætheris spirituosi libram. . . . . p. 6.

Camphorâ inter agitandum solutâ, liquor in vitro optime claudendo servatur.

SOLUTIO CARBONATIS AMMONICI SPIRITUOSA.

Spiritus Salis ammoniaci Ph. Suec. Ed. 1.

Rec. *Salis ammoniaci depurati* triti,
Carbonatis kalici depurati, singulorum libram, p. 1.
Spiritus diluti libras duas, ... p. 2.
Aquæ destillatæ libram. . . . . p. 1.
Destillant leni calore libræ duæ (p. 2), quæ in vase probe clauso servantur.

SOLUTIO CARBONATIS KALICI.

Solutio Subcarbonatis kalici puri. Lixivium Tartari.

Rec. *Carbonatis kalici puri* uncias quattuor, . . p. 1.
Aquæ destillatæ uncias octo. . . . . p. 2.
Solvuntur, et solutio per chartam colatur. Si inter servandum turbida fiat, iterum colanda est.

SOLUTIO CHLORETI FERRICI ÆTHEREA.

Solutio Muriatis ferriciætherea. Æther martialis.

Rec. *Chloreti ferrici*,
Aquæ destillatæ, singulorum drachmas sex. p. 3.
Solvuntur. Solutioni adduntur
Ætheris unciæ duæ cum dimidia, ... p. 10.
quo facto, diligenter agitantur in lagena et conjuncta stant per noctem diemque. Solutio ætherea defusa in vase bene occluso, loco obscuro, servatur.

Rp. Sol. Chlor. ferr. spir
Tra Digital aa ʒs.
Mot ischuri af retensin o
incontinentia urina

SOLUTIO CHLORETI FERRICI SPIRITUOSA.

Solutio Muriatis ferrici spirituosa, loco Tincturæ Martis.

Rec. *Chloreti ferrici* unciam, ... p. 1.
Spiritus diluti uncias sex. . . . . p. 6.
Fit solutio, loco obscuro servanda.

SOLUTIO CHLORETI FERRICI SPIRITUOSO-ÆTHEREA.

Solutio Muriatis ferrici spirituoso-ætherea. Æther martialis spirituosus.

Rec. *Solutionis Chloreti ferrici æthereæ* uncias duas, p. 1.
Spiritus concentrati uncias quattuor. . . . . p. 2.
Mixta in vase vitreo, bene clauso, servantur loco obscuro.

SOLUTIO CITRATIS KALICI.

loco Mixturæ salinæ Ph. Suec.

Rec. *Carbonatis kalici* puri scrupulos octo, . . p. 1.
Acidi citrici, in Aquæ destillatæ debita quantitate soluti, quantum sufficit ad saturandum.
His admiscentur
Syrupi Sacchari uncia, ... p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,
ut solutio pondus habeat libræ unius (p. 36.)
Ad usum paratur.

SOLUTIO FULIGINIS ALKALINA.

Tinctura Fuliginis.

Rec. *Fuliginis splendentis contritæ* uncias duas, p. 2.
Carbonatis kalici depurati uncias sex, . . p. 6.
Aquæ destillatæ libras tres. . . . . . . p. 36.
In vase occluso inter agitandum per triduum digesta colantur. In colatura solvitur
Salis ammoniaci depurati triti uncia. . . . p. 1.

SOLUTIO FULIGINIS FOETIDA.

Tinctura foetida Ph. Milit.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ unciam unam cum dimidia, ... p. 1.
Solutionis Fuliginis alkalinæ libram. . . . p. 8.
Conterendo mixta per nycthemeron in vase clauso macerantur et per linteum colantur.

SOLUTIO GUMMI GUTTÆ ALKALINA.

Elixir Gambogiæ alkalinum.

Rec. *Gummi Guttæ* contritæ drachmas duas; . p. 1.
diluuntur cum
Solutionis Carbonatis kalici unciis duabus. p. 8.

SOLUTIO HYDRATIS KALICI.

Lixivium Saponariorum.

Rec. *Carbonatis kalici puri* libram, ... p. 1.
Calcis recens ustæ, Aquâ adspersâ, in hydratem conversæ libram, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras duodecim. . . . . p. 12.
Macerantur in vase clauso, sæpissime agitando, ad temperaturam +15°—25° C., per diem unum al-

terumve, vel donec lixivium causticum redditum sit; id vero ex eo cognoscendum est, quod Aquâ Calcis non turbetur. Deinde, quum calx subsederit, liquor clarus defunditur atque in vase ferreo mundo vel argenteo puro vaporat, donec refrigeratus pondus specificum 1.33 exhibeat.

In lagenis vitreis servatur, quæ epistomiis, *Sevi* portiuncula obductis, optime sunt claudendæ.

SOLUTIO HYPOCHLORITIS CALCICI.

Solutio Oxymuriatis calcici.

Rec. *Hypochloritis calcici* unciam dimidiam, . . p. 1.
Aquæ destillatæ uncias decem. . . . . . . p. 20.

Conteritur in mortario vitreo vel porcellaneo Hypochloris cum aliqua parte Aquæ, quæ, Hypochloritis portione in Aquam bene dispertitâ, defunditur; tum affundenda est alia Aquæ pars, cum residuo terenda et deinde defundenda; in quo faciendo pergitur, dum sal omne in Aquam distributum sit. Liquores collecti subsidentiâ et colatione clarificantur.

Non nisi ad usum paratur.

SOLUTIO HYPOCHLORITIS NATRICI.

(Liqueur de Labarraque).

Rec. *Sodæ depuratæ crystallisatæ* uncias sex, p. 3.
Aquæ destillatæ uncias sedecim. . . . . . p. 8.

Fit solutio colata, in quam introducitur *Gas Chlori*, ut ad Aquam Chlori jam præceptum est, parandum ac lavandum, usque dum Gas Acidi carbonici cum effervescentia abire incipiat. Tum solutio in vitris, epistomiis vitreis obturandis, loco frigido servatur.

☿ SOLUTIO NITRATIS HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* uncias duas et semis, p. 10.
Acidi nitrici diluti uncias sex et semis, p. 26.

Solvitur digerendo Hydrargyrum in acido; quo facto, solutio evaporat ad remanentiam unciarum et drachmarum sex (p. 27), quæ servantur.

SOLUTIO SUBACETATIS FERRICI.

Liquor Ferri acetici.

Rec. *Hydratis ferrici in Aqua* quantum vis; colo colligitur et inter chartæ plagulas fortiter exprimitur, quamdiu illæ humectantur. Tum Hydras extemplo cum
Acidi acetici diluti pari pondere
in vase clauso macerantur, quamdiu acidum aliquid solvit. Solutio colata ad usum servatur.

SOLUTIO SUBACETATIS FERRICI SPIRITUOSO-ÆTHEREA.

Tinctura Martis Klaprothi.

Rec. *Ætheris acetici* drachmas duas, ... p. 1.
Spiritus concentrati unciam dimidiam, . . p. 2.
Solutionis Subacetatis ferrici uncias duas cum drachmis duabus. . . . . p. 9.

Mixta servantur in vase vitreo, optime clauso.

SOLUTIO SUBACETATIS PLUMBICI.

Acetum saturninum.

Rec. *Lithargyrii præparati* uncias tres, ... p. 3.
Sacchari Saturni crystallisati uncias decem, p. 10.
Aquæ destillatæ libras quattuor. . . . . . p. 48.

In

Sol. Phosphori (Norocom.)

Rp. Phospor. gr i—v
Spirit concentr. pur. ℥j
Mr.

Sol. Phosphor. Oleosa.

Rp. Phosphor. gr iv
Solv. leni calore in
Ol. Olivar. ℥j
Mr. Ds. Gr 5-6 dr. ½-1-2 t.

Sol. Phosph. Ol. Prof. Hass.

℥ij Phosfor i bitar lägges i en flaska omdragen med svart papper o försedd med inslipad glaspropp, hvarpå slås ℥ij Mandelolja som sedan får stå 14 dagar på tempereradt ställe

Sol. Phospor. Æther.

Rp. Phosphor gr ij
Æther. ℥ij
Ætherol. Menth. Piper. ℥j
M.f. solutio

In lagena clausa, interdum agitanda, macerantur, donec color sedimenti ruber plane evanuerit. Tum colatur solutio et in lagena, bene obturata, servatur.

SOLUTIO SULPHATIS MAGNESICI CARBONICA.

Rec. *Salis cathartici* libras septem. . . . . . . p. 7.
Solvuntur in
Aquæ fontanæ (indolis ad Aquam Acidi carbonici præscriptæ) libris triginta sex. p. 36.
Solutio colata *Gase Acidi carbonici* saturatur et in lagenis vitreis, aquæ circiter libram capientibus, bene obturatis, asservatur.

SOLUTIO SUPERJODETI KALICI.

Solutio jodurata.

Rec. *Jodi* scrupulum, ... p. 1.
Jodeti kalici scrupulos duos, ... p. 2.
Aquæ destillatæ uncias tres. . . . . p. 72.
Fit solutio. Paratur ex tempore.

SPECIES AMARÆ HJÆRNERI.

Rec. *Croci orientalis* drachmam, ... p. 1.
Zedoariæ radicis,
Agarici, singulorum drachmas duas, . . . p. 2.
Rhei indici radicis drachmas quattuor, . . p. 4.
Gentianæ radicis,
Myrrhæ electæ, singulorum unciam, . . . p. 8.
Aloës hepaticæ,
Theriacæ, singulorum uncias duas. . . . p. 16.
Contusa et concisa miscentur.

SPECIES EMOLLIENTES.

Species ad Fomentum emolliens.

Rec. *Chamomillæ nostratis florum* unciam, . . p. 1.
Malvæ foliorum uncias quattuor. . . . . . p. 4.
Incisis admiscentur
Lini seminum pulveratorum unciæ duæ. . p. 2.

SPECIES PECTORALES.

Species ad Infusum pectorale.

Rec. *Anisi stellati* unciam, ... p. 1.
Verbasci florum uncias quattuor, ... p. 4.
Althææ radicis,
Hyssopi herbæ, singulorum uncias octo, p. 8.
Cerefolii hispanici herbæ uncias sedecim. p. 16.
Incisa et contusa commiscentur.

SPECIES PRO VAPORIBUS ACIDI ACETICI.

Rec. *Acidi Vitrioli* unciam dimidiam, ... p. 1.
Sacchari Saturni pulverati unciam unam et semis. p. 3.
Separatim dantur.

SPECIES PRO VAPORIBUS CHLORI.

Species pro vaporibus Superoxidi muriatosi.

Rec. *Magnesii nigri* pulverati unciam unam, . p. 1.
Acidi muriatici crudi uncias quattuor. . . p. 4.
Separatim dantur.

Species ad Fam. Gentian. Aromat.

Rx. Rad Galangæ
– Gentianæ
– Tormentillæ
Cort. Canell. alb.
Rad Zedoariæ āā part.
M. f. spec.

SPECIES RESOLVENTES.

Species ad Fomentum resolvens.

Rec. *Lupuli strobilorum* libram dimidiam, . . . p. 1.
Menthæ crispæ herbæ,
Absinthii summitatum, singulorum libram. p. 2.
Incisa commiscentur.

SPIRITUS CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi libram, p. 3.
Spiritus Vini gallici uncias octoginta, . . p. 20.
Aquæ destillatæ quantum sufficit ad prohibendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quattuor; tum lento igne destillant unciæ octoginta (p. 20).

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

Rec. *Cochleariæ herbæ recentis* concisæ libras decem, ... p. 5.
Spiritus Vini gallici libras octo. . . . . . p. 4.

Balnei vaporis calore destillant libræ quattuor (p. 2).

SPIRITUS CONCENTRATUS.

Spiritus Vini rectificatissimus.

Spiritus dilutus ex alembico æneo, capitello et refrigeratorio æneis instructo, leni calore destillat. Ea destillati pars, quæ primum prodit et pondus specificum 0.84 habet, excipitur et servatur in vasis clausis.

SPIRITUS DILUTUS.

Spiritus Frumenti, qualis vulgo in merce est, bonæ tamen notæ, supra *Carbonem vegetabilem præparatum*, cum illo antea maceratus, rectificatur. Servatur illa destillati pars, quæ pondus specificum 0.90 habet.

SPIRITUS FRUMENTI DEPURATUS.

Rec. *Spiritus Frumenti* quantum placet.

Purificatur ope Carbonis vegetabilis præparati. Pondus specificum 0.94 habebit.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

Spiritus Juniperi.

Rec. *Foeniculi seminum*,
Carvi seminum, singulorum contusorum unciam sesquialteram, ... p. 3.
Juniperi baccarum immaturarum contusarum libram, ... p. 24.
Spiritus Vini gallici uncias octoginta, . p. 160.
Aquæ destillatæ quantum sufficit ad prohibendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quattuor; tum lento igne destillant unciæ octoginta (p. 160).

SPIRITUS LAVENDULÆ.

Rec. *Lavendulæ florum* libras duas et semis, p. 3.
Spiritus Vini gallici libras tredecim cum unciis quattuor. . . . . p. 16.

Balnei vaporis calore, destillando eliciuntur unciæ octoginta (p. 8).

Rc. Spir. Lavendul ℥j
Ol. Cajeput.
Atherol. Foeniculi āā ℈ij
Mr. D. S. Ögonspiritus
#.
Rc. Spir. Lavendul
— Rosmarini āā ℥j
Tct. Canthorid gtta x
M. Chalazion. Ingnides på örat.
Sthen flere ggr de dee

Rc. Spir Lavendul.
— Anthos
— Lilior.
— Salis commun. āā ℥j
Balsam. vit. Hoffman ℨß
S. Ögonspiritus. Ingnides: händerna, som derefter hallas för ögonen

Spiritus Tabaci Infus.

Rx Fol. Tabaci ℥ß
infund per horam cum
Aqu. ferrid ℥vj
Colat. refrigerat adde
Spirit concentrat. ℥j
D.

SPIRITUS ROSMARINI.

Rec. *Rosmarini foliorum* uncias quadraginta, p. 1.
Spiritus Vini gallici uncias centum et sexaginta. . . . . p. 4.

Balnei vaporis calore destillant unciæ octoginta (p. 2).

SPIRITUS ROSMARINI COMPOSITUS.

Spiritus vulnerarius vel aromaticus.

Rec. *Millefolii summitatum*,
Thymi herbæ, singulorum uncias quinque, p. 1.
Rosmarini foliorum uncias quindecim, . . p. 3.
Spiritus Vini gallici uncias centum et sexaginta. . . . . p. 32.

Destillando eliciuntur unciæ octoginta (p. 16).

SPONGIA CERATA.

Spongiæ marinæ tenues, siccatæ et ab arenulis aliisque heterogeneis purgatæ, immerguntur in *Ceram flavam* liquefactam et prelo calefacto fortiter exprimuntur. Refrigeratæ servantur.

STANNUM PULVERATUM.

In pyxide commoda, Cretâ intus obducta, vel in mortario ferreo, paullum calefacto, *Stannum* igne liquefactum assidue agitatur, donec redigatur in pulverem, separandum a metalli particulis grandioribus, quæ, iterum liquefactæ, eodem modo tractantur.

☿ STRYCHNINA.

Rec. *Nucum vomicarum* libras quinque, ... p. 20.
Acidi Vitrioli uncias tres, ... p. 1.
Aquæ destillatæ tantum, ut superemineat.

Per duodecim horas macerata in vase leviter cooperto inter agitandum coquuntur, aquam dissipatam semper restituendo, per horas octodecim ad viginti quattuor, vel donec nuces mollescant; tum in pultem rediguntur, quæ, exprimendo separata a liquore, cum *Aqua destillata* iterum decoquitur et exprimendo colatur.

Liquores commixti, post subsidentiam defusi, in balneo vaporis ad dimidium vaporant et cum

Calcis ustæ, in hydratem conversæ, quantitate excedente

per horam digeruntur. Defuso post quietem liquore, præcipitatum, colo collectum, fortiter exprimitur et cum

Spiritu concentrato

iteratis vicibus decoquitur, quamdiu hic aliquid solvit.

Solutiones spirituosæ colatæ destillando et refrigerando Strychninam tradunt impuram, quæ, liquore supernatante defuso, cum *Alkohole Vini* in vase clauso bis maceratur et ope *Carbonis animalis* repetitâque e *Spiritu concentrato* fervente crystallisatione pura redditur.

Cautissime asservanda est.

STYRAX DEPURATUS.

Styrax Calamitus digeritur *Spiritu diluto*, quamdiu hic aliquid solvit; tum solutum per chartam colatur et ope balnei vaporis ad extracti tenuioris spissitudinem vaporat.

Rp. Subcarb. ferri. ferros. ℈ ℥ij
Extr. Aloës aquos. gr xij
Extract. Gentian. ℥ij
M. f. pill. N. 96. S. 4 p. d. d.
vid. Chloros.

SUBCARBONAS FERRICO-FERROSUS.

Crocus Martis aperitivus.

Rec. *Sulphatis ferrosi* quantum placet.
Solvitur in
Aquæ destillatæ sufficiente quantitate.
Liquor colatus instillando
Solutionem Carbonatis kalici, Aquâ destillatâ dilutam,
inter agitandum præcipitatur. Præcipitatum, Aquâ destillatâ calidâ sedulo ablutum, caute siccatur et in vase, bene clauso, servatur.

SUBNITRAS BISMUTHICUS.

Magisterium Bismuthi.

Rec. *Bismuthi* in frustula comminuti uncias tres, p. 1.
Acidi nitrici diluti uncias novem. . . . . . p. 3.
Digeruntur, quamdiu aliquid solvitur; solutio, additâ caute, ne turbetur, *Aquæ destillatæ* parvâ copiâ, colatur et, vaporando in vase porcellaneo refrigerandoque, ad crystallos ponendas cogitur. Crystalli, muriâ liberatæ et pulveratæ,
Aquæ destillatæ fervidæ libris decem . . p. 40.
inter continuam agitationem superfunduntur. Quod hinc oritur præcipitatum, quiete demissum, a liquido supernatante separatur et, Aquâ destillatâ in liquoris locum ter quaterve et affusâ et defusâ, in vase lavatur; colo deinde collectum eluitur, quo facto, inter chartæ plagulas siccatum servatur.

SUCCUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

Succus Armoraciæ cum Spiritu.

Rec. *Armoraciæ radicis Succi expressi* unciam, p. 1.
Aceti Vini uncias duas, ... p. 2.
Spiritus Frumenti depurati uncias sex. . . p. 6.
Miscentur.

SUCCUS BERBERIDIS.

Rec. *Berberidis baccarum recentium* quantum placet.
In mortario lapideo contunduntur ope pistilli lignei. Massa inde profecta, in cella per horas viginti quattuor seposita, per linteum exprimitur et succus expressus, subsidendo clarefactus, semel ebullit; deinde per linteum colatur et refrigeratus in lagenas immittitur, libras duas capientes atque suberibus selectis et Colophonio obturandas. Servatur in cella.

Parantur eodem modo:

SUCCUS CERASORUM

e *Cerasis acidis recentibus,* cum nucleis contundendis;

SUCCUS OXYCOCCI

ex *Oxycocci baccis recentibus;*

SUCCUS RIBIS NIGRI

e *baccis recentibus Ribis nigri;*

SUCCUS RIBIS RUBRI

e *baccis recentibus Ribis rubri;*

SUCCUS RUBI IDÆI

e *Rubi idæi baccis recentibus.*

SULPHAS CUPRICUS AMMONIACALIS.

Subsulphas ammonico-cupricum.
Cuprum ammoniacum.

Rec. *Vitrioli de Cypro* pulverati quantum placet,
Ammoniaci caustici quantum sufficit ad Vitriolum solvendum.

Solutioni colatæ et refrigeratæ additur
Spiritus concentratus,

quamdiu aliquid præcipitatur. Sal præcipitatus, a liquido separatus, inter chartæ bibulæ plagulas celeriter siccatur et statim in vas vitreum, optime obturandum, ingeritur.

SULPHAS FERROSUS.

Vitriolum Martis vel Sal Martis.

Rec. *Acidi Vitrioli* libram dimidiam, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras duas et semis. . . p. 5.

Caute mixtis in vase vitreo vel murrhino adjicitur
Ferri Limaturæ vel *Rasuræ* libra circiter dimidia vel major quantitas, quam quæ in acido, post digestionem per duodecim horas, solvi possit.

Liquor deinde, si opus est, adjectâ Aquæ destillatæ parvâ copiâ, calefit, ut crystalli forte depositæ solvantur, et etiamnunc calens per chartam, *Acido sulphurico diluto* humectatam, colatur; quo facto, loco frigido seponitur, ut crystallos demittat, quæ, inter chartæ plagulas celeriter siccatæ, in vase optime claudendo servantur. Liquor remanens leniter vaporat, ut crystallos iterum deponat.

SULPHAS KALICUS.

Tartarus vitriolatus vel Arcanum duplicatum.

Massa post Acidi nitrico-nitrosi destillationem in retorta remanens, *Aquâ destillatâ* fervidâ soluta, colatur et vaporatione ad crystallisationem redigitur. Sal depositus, repetitâ in Aquæ destillatæ fervidæ partibus quattuor solutione et crystallisatione, refrigerando ab omni Bisulphate kalico depuratur.

SULPHAS QUINICUS.

Rec. *Cinchonæ regiæ corticis* pulverati libras quinque, ... p. 10.
Aquæ destillatæ libras viginti quinque, p. 50.
Acidi hydrochlorici libram dimidiam. . . p. 1.

In vase figulino mixta inter continuam agitationem coquuntur per horæ quadrantem. Liquor deinde defunditur, et residuum cum eâdem Aquæ destillatæ quantitate, *Acidi hydrochlorici* unciis tribus acidulatâ, pari modo tractatur; quod tertium etiam, cum expressione residui, est faciendum.

Liquores collecti in balneo aquæ coquentis vaporant ad remanentiam librarum circiter decem (p. 20.), quæ, ut aëri opportunæ sint, per dies aliquot sepositæ, colantur. Tum admiscetur liquori claro inter continuam agitationem

Calcis ustæ, in hydratem recens conversæ et cum sufficiente Aquæ destillatæ copiâ in pultem redactæ, tantum,

quantum requiritur ad perfectam Quininæ præcipitationem, inde agnoscendam, quod liquidum alkali instar reagat. Præcipitatum post subsidentiam colligitur et exprimitur; cum Aqua frigida humectatum iterum exprimitur et cum

Rp. Sulphat. Natri ℥β
Opii gr 6
Fr. 1 p. 6 t. Mot blödningar från
aemes. uterus. blodhostning.

Rp. Sulphat. Quinin. ℈j
Extr. Absinthii ℈viij
f. Pil. No. XL. Gr. 4 p. 4 dd.
Paralysma Lienis.
#
Rp. Sulphat. Quinin. ℈j
Extr. Gentianae
pulv. rad. Liquirit. aa qu. sat. ut
f. l. art. pil. No. X.
#
Rp. Sulphat. Quinin. gr XV.
s. in Aqu. Cinnamom ℥ij
Acid. sulph. dil. gtt XV
Syrup. rub. idaei ℥β.
Fr. att taga på en gång.
#
Rp. Sulph. Quin. gr iij
Opii gr 1/8.
P. rad. Ipecacuanh. gr j
[illegible] med [illegible] o torr tunga
#
Rp. Sulph. Quinin. gr XV
Extr. Trifol ℈j
P. rad. Calami s. qu. ut f. p.
No. XV Consp. pulv. Cinnamom.

Rp. Sulph. Quin. gr.
Bicarb. kalic.
pulv. aromat. aa gr vj
Sulph. Aurat. Antimon gr ij
f. pulv. Dr. tal. dos No. X.
Fr. 1 pulv. 6 t. under apyrexien
utan hvar morgon.
#
Rp. Sulph. Quin. gr XX.
Solv. in Aqu. font. ℥vβ
Mellis ℥β
Fr. 1 m. 3. dd.
#
Rp. Sulph. Quin. ℈j No. 1. No. 2. gr viij - No. 3. gr vj
Aqua font. - Aq. Cinn. ℥ij - Acid. Kal. ℥β
— Cinnamom — ℥β. Aq. font. ℥ij
Mellis aa ℥vj - Syr. cort. aur. ℥vj - Syr. sach. ℥vj
Fr. 2 tt. 3 dd. - 1. dos. 4 t. - 1. Thsk. 2 t.
#
Rp. Sulph. Quin. gr XXIV
Infus. Ros. acid. ℥ijβ
Fr. 1 m. 2 t.
#
Rp. Sulph. Quin. gr j
Extr. Rhei gr ij
Sapon. Med. gr j
Dr. dos. tal. No. XV Skakande [illegible]
de pulver i 4 dygn.

Rec. Sulph. quin. gr. x viij
Sodr. kalic. gr. XL viij
Extr. Gentian. ℈j.
f. pil. XX. S: 5 p. 4 ggr.
Neuralgia inter costalis (Bonde)

Rp. Sulph. Zincic gr. iv
solv. in Aqu. Rosar. ℥iv
adde L. L. Sydenhami ℈j

#

Rp. Sulph. Zincic gr. ij
Aqu. Rosar. ℥iv
Acet. Saturni ʒß
Mucilag. Gmi arab. ℥ij
S. Ögonvatten (Blepharo-adenitis catarrhalis)

#

Rp. Sacchar. albi ℥ij
Alum. usti gr. XV.
Vitriol. alb. gr. iv
f. pulv. (Eircanthis fungos).

Rp. Sulph. Zincic alkohol. gr. ij
Axung. porc. recentis. ℥ij
Ceræ alb. gr. xij
M. exact. f. Ungv. Sr. Ingnides på ögonlockranden så mycket som en ärt. morgon o afton.

Spiritus concentrati libris tribus . . . . . p. 6.
in cucurbita longicolli vel retorta coquendo digeritur. Colato deinde liquore loto que residuo insolubili cum Spiritus concentrati sufficiente quantitate, ex his liquoribus commixtis abstrahitur Spiritus, destillando in balneo aquæ coquentis; jam restat Quinina impura, Aquæ destillatæ frigidæ parvâ quantitate lavanda.

Quinina tali modo adquisita cum
Aquæ destillatæ libris quattuor . . . . . . p. 8.
ad ebullitionem aquæ calefit; cui instillatur, inter agitandum, sensim et caute
Acidi sulphurici diluti, quantum ad Quininam solvendam requiritur, nec plus;
quo facto, solutioni adduntur
Carbonis animalis unciæ duæ, vel quantum sufficit ad solutionem decolorandam,
quæ per duo minuta coquenda est et, etiamnunc fervens, colanda.

Inter refrigerationem Sulphas quinicus in crystallos coalescit, quæ collectæ, inter chartæ plagulas, lenissimo calore, in umbra siccantur et in vasis, bene obturatis, loco umbroso servantur.

E liquore residuo nova Sulphatis copia evaporatione elici potest, quæ, si colorata est, cum Carbone animali iterum tractari debet.

SULPHAS ZINCICUS.

loco Vitrioli albi purificati.

E *Zinco*, in frustula comminuto, paratur eodem modo, quo Sulphas ferrosus.

SULPHIDUM STIBICUM.

loco Hydrosulphureti stibiosi cum Sulphure Ph. Suec. Ed. V vel Sulphuris aurati Antimonii.

Rec. *Sulphuris sublimati eloti* uncias sex, . . . p. 1.
Calcis ustæ libram vel quantum sufficit,
Sulphureti stibici præparati libram sesquialteram, ... p. 3.
Sodæ depuratæ crystallisatæ libras quattuor cum dimidia, ... p. 9.
Aquæ destillatæ libras viginti. . . . . . . p. 40.

Sodâ depuratâ in Aqua solvitur; dein solutioni, in vase ferreo mundo ebullienti, additur sensim Calx, affusâ Aquâ, in pultem redacta, donec lixivium causticum fiat; tum Sulphuretum et Sulphur, intime mixta, lixivio etiamnunc fervido adduntur, quod per tres horæ quadrantes inter agitationem continuam coquendum est. Liquor, subsidendo et colando depuratus, evaporat, ut crystalli coalescant, quæ, exprimendo inter chartæ bibulæ plagulas, a muria liberantur.

Harum crystallorum, nuper præparatarum, unciæ decem

in *Aquæ destillatæ* libris quinque solvuntur; quæ solutio, colata, in miscelam refrigeratam, ex

Acidi sulphurici destillati unciis tribus
et *Aquæ destillatæ* libris octo

confectam, inter strenuam agitationem infunditur. Liquore post subsidentiam decanthato, præcipitatum aurantiacum, Aquam destillatam iterum iterumque et affundendo et defundendo, in vase penitus eluitur et, colo denique collectum, leni calore quam citissime siccatur.

SULPHO-

Rx. Sulph. Auraf. Antim
gr. ii
Bicarb kalic. gr. vj—x.
S. sp. 3t. (7 pronor).

SULPHOHYDRAS AMMONICUS.

Hydrosulphuretum ammonicum.

Ammoniaci caustici quantum placet
in lagenam vitream angustioris orificii inditur. Tum
Gas Sulphidi hydrici, e *Sulphureto ferroso* et
Acido Vitrioli, *Aquâ* diluto, paratum et
per Aquam transadactum,
tubi vitrei ope per liquidum alkalinum refrigeratum, dum saturatum sit, ducitur.

Servatur loco frigido in vitris parvis, inde replendis, quæ epistomiis *Sevo* obductis arctissime claudenda sunt.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

Lac Sulphuris.

Rec. *Calcis ustæ* libras duas cum dimidia, . . p. 5.
Aquæ destillatæ libras viginti quinque. . p. 50.

Calci, in ollam ferream, mundam et satis capacem, immissæ et deinde, Aquæ portione affusâ, in pultem conversæ, affunditur quod superest Aquæ. Mixturæ ebullienti admiscentur per vices, inter agitandum cum spathula ferrea,
Sulphuris citrini pulverati libræ quattuor vel
quantum solvitur.

Solutio, post subsidentiam colata, cum illa commiscetur solutione, quæ in residuo lavando adquiritur. Liquoribus commixtis in vase apto, vel fictili vel ligneo,
Acidum hydrochloricum, Aquæ destillatæ decuplo pondere dilutum,
sensim et inter continuam agitationem additur, donec portio quædam liquoris colata colorem subflavum habeat, cavendo semper, ne Acidum in excessu ad-

misceas. Tum præcipitatum, quiete subsidens, colo colligitur et, Aquâ destillatâ probe ablutum, leni calore siccatur.

SULPHUR SUBLIMATUM ELOTUM.

Flores Sulphuris edulcorati.

Rec. *Florum Sulphuris* quantum placet.

Cum *Aquæ destillatæ* parva copia in pultem redacti, Aquam destillatam ferventem iterum iterumque admiscendo et defundendo, lavantur, quamdiu Aqua defusa colorem chartæ exploratoriæ coeruleæ mutat; tum Sulphur, colando et exprimendo, ab humore liberatur et siccatur.

SULPHURETUM FERROSUM.

Sulphuretum Ferri.

Sulphur citrinum, in crucibulum commune inditum, *rudiculâ e Ferro cuso*, igne vehementi ad albedinem calefactâ, ut scintillas spargat, agitatur; quæ, quum non amplius excandescit, igni iterum immittenda est et alia rudicula, similiter candefacta, in ejus locum substituenda, donec Sulphur consumptum sit; in quo faciendo semper cavendum, ne major vel superflua Sulphuris copia crucibulo simul indetur. Tum Sulphuretum post refrigerium eximitur et, si placet, contusum, in lagena bene clausa servatur.

Fit etiam Sulphuretum ferrosum, et quidem melius, frustula *Sulphuris citrini* supra *Ferri Rasuram*, in crucibulo ad albedinem calefactam, conjiciendo.

Rp. Superstib. Kalie
Chlor. Ammonii. āā gr XIJ
Congest at Lung med Eastri.

Rp. Supersulph. Kalie. ℈ij
Aqua Rosar. ℥iv.
Extr. Hyoscyam. ℈j
Till compress på carcinomatösa sår

SULPHURETUM STIBICUM PRÆPARATUM.

Antimonium præparatum.

Eodem modo, ac Bolus præparata, ex *Antimonio crudo* paratur.

SUPERSTIBIAS KALICUS.

Calx Antimonii elota.
Superstibiis kalica.

Rec. *Stibii metallici* libram dimidiam, ... p. 1.
Nitratis kalici depurati libram . . . . . . p. 2.

Pulverata commiscentur et in crucibulum candefactum sensim injiciuntur. Deflagratione peractà in igne detinetur massa per horæ dimidium, cavendo tamen, ne liquetur; refrigerata teritur in pulverem, qui, *Aquâ destillatâ* frigidâ perfecte ablutus, siccatur et servatur.

SUPERSULPHURETUM KALICUM.

Sulphuretum kalicum vel Hepar Sulphuris.

Rec. *Carbonatis kalici depurati,*
Sulphuris citrini pulverati, singulorum partes æquales.

Intime mixta in crucibulo coöperto vel olla ferrea, operculo prædita, calore moderato calefiunt, usque dum massa liquata tranquille fluat. Tum massa effusa in mortario ferreo obtecto refrigescit; refrigerata in vase vitreo, bene obturato, servatur.

SYRUPI.

Parantur syrupi, nisi alia præparandi ratio præscribitur, e Saccharo, quod, in frustula redactum,

cum Infuso vel Succo ad unam ebullitionem calefit; quo facto, solutum per pannum laneum colatur.

Servantur in cella.

SYRUPUS ACETI.

Rec. *Aceti Vini* libram dimidiam, ... p. 1.
Sacchari albi libram. . . . . p. 2.
Fit solutio.

SYRUPUS ACIDI SULPHURICI.

Syrupus vitriolatus Ph. Milit.

Rec. *Acidi sulphurici diluti* drachmam, ... p. 1.
Syrupi Sacchari unciam. . . . . p. 8.
Miscentur.

SYRUPUS ALLII.

Rec. *Allii bulbi* concisi libram, ... p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas. . . . p. 2.

Fit, macerando per horam in vase clauso, infusum, quod, exprimendo percolatum, in syrupum convertitur, addito
Sacchari albi duplo pondere.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

Rec. *Althææ radicis* incisæ uncias tres, ... p. 3.
Aquæ destillatæ tantum,
ut, post macerationem per horas viginti quattuor, fiat colatura librarum duarum (p. 24.), quæ subsidentiâ et decanthatione depurata, cum
Sacchari albi libris tribus . . . . p. 36.
in syrupum convertitur, cui refrigerato adjicitur
Aquæ Aurantii uncia. . . . . p. 1.

Rx. Syrup acid. Sulph. ʒij
Infus. Lini ℥viij (viij)
Sr. 1 in 3t.
(Mucilag. Salep vid Dearake)

SYRUPUS AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum amararum* decorticatarum drachmas duas, ... p. 1.
Amygdalarum dulcium decorticatarum uncias tres. . . . . p. 12.
Fit cum *Aqua destillata* emulsio unciarum sex (p. 24.), quæ cum
Sacchari albi libra . . . . p. 48.
in syrupum convertitur, cui, per pannum colato, additur post refrigerium
Aquæ Aurantii uncia. . . . . p. 4.

SYRUPUS AURANTII.

Syrupus Aurantii corticis.

Rec. *Flavedinis Aurantii* concisæ uncias tres, p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ quantum satis.
Fit, digerendo per horam, infusum libræ sesquialterius (p. 6.), quod cum
Sacchari albi libris tribus . . . . p. 12.
in syrupum convertitur.

SYRUPUS CERASORUM.

Syrupus Cerasi nigri.

Rec. *Succi Cerasorum* libras duas, ... p. 4.
Sacchari albi libras tres cum dimidia. . . p. 7.
Fit syrupus.

SYRUPUS CITRI CORTICIS.

Rec. *Flavedinis Citri* recentis incisæ unciam. p. 2.
Maceratur per horam in vase clauso cum
Aquæ destillatæ fervidæ tanta copia,

ut fiat infusum libræ unius (p. 24.), cui, cum
Sacchari albi libris duabus . . . . p. 48.
in syrupum converso, additur post refrigerium
Aquæ Aurantii uncia dimidia. . . . . . . p. 1.

SYRUPUS CITRI E SUCCO.

Rec. *Citri Succi,* recens expressi et defæcati, libram, ... p. 1.
Sacchari albi libras duas. . . . . p. 2.
Fit syrupus.

☿ SYRUPUS EMETINÆ.

Rec. *Emetinæ* granum, ... p. 1.
Syrupi Sacchari unciam. . . . . p. 480.
Conteruntur, ut unum fiant.

SYRUPUS HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmam, ... p. 1.
Gummi arabici,
Sacchari albi, singulorum pulveratorum drachmas tres, ... p. 3.
Aquæ Rosæ drachmas duas. . . . . p. 2.
Hydrargyrum cum Gummi et Saccharo, Aquam Rosæ sensim addendo, in mortario vitreo conteritur, donec globuli illius omnino visum effugerint. Deinde paullatim admiscentur
Syrupi Sacchari unciæ quattuor. . . . . p. 32.
Non nisi ad usum paratur.

SYRUPUS JUNIPERI.
Roob Juniperi.

Rec. *Juniperi baccarum maturarum,* paullum contusarum, quantum vis.

Syrupus Giberti

Rec. Jodet. Hydrargyrii gr j v
" Kalii ℥ ij
Aqu. destill ℥ j v
Syrup. Sacchari ℥ vj
M. l. a.

Syrupus Jodeti Hydr.^ii Nos.

Rec. Jodet. Hydr.^ci gr iij
– Kalii ℥ iij
solve in
Aqu. destill ℥ j
adde
Syrup. Sacchari ℥ xiij

Affusâ Aquâ destillatâ macerantur per diem unum alterumve in vase ligneo apto, cujus fundus foramine, obturamento clauso, instructus, bacillis ligneis et stramine mundo contectus est. Liquor deinde defusus toties superinfunditur, donec baccæ exhaustæ sint; postremo colatur et in balneo vaporis ad mellis spissitudinem consumitur.

SYRUPUS OXYCOCCI.

Paratur e *Succo Oxycocci* eodem modo, quo Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS RHEI.

Rec. *Infusi Rhei* libram, ... p. 1.
Sacchari albi libras duas. . . . . p. 2.
Fit syrupus.

SYRUPUS RIBIS NIGRI.

E *Succo Ribis nigri* paratur, ut Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS RUBI IDÆI.

Paratur e *Succo Rubi idæi* eodem modo, quo Syrupus Cerasorum.

SYRUPUS SACCHARI.

Rec. *Aquæ destillatæ* quantum placet, ... p. 1.
Sacchari albi duplum pondus. . . . . . . p. 2.
Fit syrupus.

SYRUPUS SAMBUCI.

Roob Sambuci.

Rec. *Sacchari albi* libram, ... p. 1.
Sambuci baccarum succi expressi libras octo. p. 8.
In balneo vaporis rediguntur ad syrupi spissitudinem.

SYRUPUS SCILLITICUS.

Syrupus Scillæ.

Rec. *Zingiberis radicis* unciam dimidiam, . . . p. 1.
Scillæ radicis unciam, ... p. 2.
Hyssopi herbæ uncias duas. . . . . p. 4.
Contusa et concisa in vase clauso per diem noctemque macerantur cum
Aquæ Menthæ piperitidis tanta copia,
ut liquor, exprimendo colatus, pondus habeat libræ sesquialterius (p. 36.), ex qua cum
Sacchari albi libris tribus . . . . p. 72.
fit syrupus.

SYRUPUS SENEGÆ.

Rec. *Senegæ radicis* concisæ unciam. . . . . . p. 1.
Fit, secundum regulas supra traditas, decoctum unciarum decem (p. 10.), cui adduntur
Sacchari albi unciæ viginti, ... p. 20.
ut fiat syrupus.

☿ SYRUPUS THEBAICUS.

Rec. *Tincturæ Opii* drachmam dimidiam, . . . p. 1.
Syrupi Sacchari uncias sex. . . . . p. 96.
Commiscentur.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

Rec. *Zingiberis radicis* contusæ unciam, . . . p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ tantum,
ut, post digestionem in vase clauso per horas sex, fiat infusum unciarum novem (p. 9.), cum
Sacchari albi libra una et semis . . . . p. 18.
in syrupum convertendarum.

TARTARUS BORAXATUS.

Rec. *Boracis* uncias duas, ... p. 1.
Aquæ destillatæ fervidæ libras duas. . . p. 12.

Fit solutio, cui, etiamnunc fervidæ, adduntur per vices et inter continuam agitationem cum spathula lignea

Tartari depurati, in pulverem redacti, unciæ sex vel quantum solvitur. . . . . p. 3.

Solutio, post horas viginti quattuor colata, balnei vaporis calore vaporat, donec pars exempta et refrigerata in pulverem facile redigatur. Tum eximitur sal, qui, refrigeratus et per horas duas vel tres ad temperaturam +30° C. siccatus, pulveratur et in vase, bene obturato, servatur.

TARTRAS KALICUS.

Tartarus tartarisatus.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* libram, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras quattuor. . . . . . p. 4.

Lixivio ferventi sensim adjicitur

Tartari depurati pulverati quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, etiamnunc calens per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec dimidia ejus pars

consumpta sit; tum, si Tartrate calcico turbida est, iterum colatur, si opus est, additâ Aquâ destillatâ, et in balneo vaporis exsiccatur. Massa, plane sicca et in pulverem redacta, servanda est in vase vitreo, bene obturato.

TARTRAS NATRICO-KALICUS.

Sal Seignetti.

Rec. *Sodæ depuratæ* libram, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras tres. . . . . p. 3.
Lixivio fervido sensim adjicitur
Tartari depurati, in pulverem redacti, quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, post horas viginti quattuor per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec pellicula appareat; tum loco frigido seponitur, ut crystallos ponat, quæ siccatæ servantur.

☿ TARTRAS STIBICO-KALICUS.

Tartarus emeticus vel antimonialis.

Rec. *Tartari depurati*,
Oxidi stibici, singulorum pulveratorum uncias tres, ... p. 1.
Aquæ destillatæ libras duas. . . . . p. 8.

In vase vitreo vel figulino coquendo digeruntur per quartam horæ partem; tum liquidum fervens percolatur et loco frigido seponitur, ut crystalli concrescant. Solutio remanens vaporatione et refrigeratione ad crystallos ponendas cogitur. Si Tartras calcicus, crystallorum instar minutissimarum, solutionem quasi gelatinosam faciat, hæ crystalli a Tartrate stibico-kalico, qui ad fundum et latera vasis adfixus manet, liquorem agitando et defundendo,

facillime separantur. Quo facto liquor, antequam vaporat, per chartam colatur.

Crystalli Tartratis stibico-kalici collectæ, si ope tubi ferruminatorii exploratæ, arsenicales deprehenduntur, purificentur necesse est; quod quidem fit, solvendo in Aquæ destillatæ ferventis quanta minima requiritur copia, et solutionem, si opus est, etiamnunc fervidam colatam, inter continuam agitationem refrigerando. Qui inter hæc demittitur pulvis crystallinus, colo colligitur, Aquâ destillatâ frigidissimâ aliquoties abluitur et inter chartæ plagulas exprimendo siccatur. Si, exploratione iterum institutâ, Arsenicum adesse senseris, sal eodem modo iterum est purificandum; quod denuo est faciendum, quamdiu aliquid redoleat Arsenicum. Tartras denique purus in vase vitreo, bene clauso, servatur.

Qui in liquoribus solutus manet Tartras, vaporando et refrigerando recuperatur.

TESTÆ OSTREARUM PRÆPARATÆ.

Præparantur eodem modo, quo Bolus præparata, *Testæ Ostrearum.*

THERIACA.

Rec. *Opii levantici,*
Myrrhæ electæ,
Liquiritiæ Succi,
Croci orientalis, singulorum drachmam, p. 1.
Zedoariæ radicis,
Cardamomi minoris seminum, singulorum drachmas duas, ... p. 2.
Valerianæ minoris radicis drachmas tres, p. 3.
Gentianæ rubræ radicis drachmas sex, . . p. 6.
Angelicæ radicis unciam, ... p. 8.
Mellis depurati uncias novem et drachmas tres. p. 75.

Liquiritiæ Succus, Myrrha et Opium, cum *Vino de Malaga* diluta, primo miscentur cum Melle, paullum calefacto; deinde inter continuam agitationem paullatim adjiciuntur cetera, in pulverem tenuem trita.

Servatur in vase obturato.

TINCTURÆ.

Fiunt tincturæ fere omnes digerendo vel, si jubetur, macerando substantias, rei convenienter deminutas, cum copia præscripta Spiritus in lagena vel ampulla vitrea, subere clausa et interdum agitanda. Post digestionem vel macerationem per triduum, solutum refrigeratum defunditur et residuum exprimitur; quo facto, liquores conjuncti, in infundibulo obtecto, per chartam colantur.

Fiat omnis digestio ad temperaturam $+60^0$ C.

Ubi alia observanda est præparandi ratio, ea expressis verbis præscribitur.

Servantur tincturæ in vitris obturatis loco non frigido, ubi aër calorem saltim $+15^0$ C. teneat.

TINCTURA ABSINTHII.

Rec. *Absinthii summitatum* incisarum libram, p. 1.
Spiritus Frumenti depurati libras sex, . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA.

Tinctura amara.

Rec. *Cardui benedicti foliorum* incisorum,
Aurantii fructus immaturi,
Galangæ radicis, singulorum pulveratorum unciam, ... p. 1.

Ab-

Absinthii summitatum incisarum uncias quattuor, ... p. 4.
Spiritus diluti libras quattuor. . . . . . . p. 48.
Fit tinctura.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

Elixir Aloës saponaceum.

Rec. *Croci orientalis* unciam dimidiam, ... p. 1.
Aloës lucidæ contusæ,
Acetatis kalici,
Bilis bovinæ inspissatæ,
Myrrhæ electæ contusæ, singulorum unciam, p. 2.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 24.
Fit tinctura.

TINCTURA ALOËS CROCATA.

Elixir aloëticum.

Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ,
Croci orientalis, singulorum unciam dimidiam, p. 2.
Aloës lucidæ contusæ drachmas sex, . . . p. 3.
Spiritus diluti uncias sedecim. . . . . . . p. 64.
Fit tinctura.

TINCTURA AROMATICA.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* pulveratorum unciam dimidiam, ... p. 1.
Canellæ albæ corticis,
Cinnamomi ceylanici corticis,
Galangæ radicis, singulorum contusorum unciam, ... p. 2.
Spiritus diluti libras duas. . . . . p. 48.
Fit tinctura.

TINCTURA AROMATICA ACIDA.

Tinctura aromatica vitriolata.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* uncias duas, . . p. 1.
Tincturæ aromaticæ libram. . . . . p. 6.
Sensim commixta stant per dies aliquot; postea tinctura colatur.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

Rec. *Assæ foetidæ* pulveratæ uncias duas et dimidiam, ... p. 5.
Spiritus concentrati libram. . . . . p. 24.
Fit tinctura.

TINCTURA AURANTII.

Rec. *Flavedinis Aurantii* concisæ uncias tres, p. 1.
Spiritus diluti libram sesquialteram. . . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS.

Rec. *Benzoës amygdaloidis* contritæ uncias duas, p. 1.
Spiritus concentrati libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS ALOËTICA.

Balsamum e Benzoë vel traumaticum.

Rec. *Aloës lucidæ* contritæ drachmas duas, . . p. 1.
Balsami peruviani unciam, ... p. 4.
Benzoës amygdaloidis contritæ unciam sesquialteram, ... p. 6.
Spiritus concentrati uncias sedecim. . . . p. 64.
Fit tinctura.

Rp. Tinct. Cantharid

Tinct. Cascarillæ compos.

Rp. Tr. Cascarill ℥j

Extr. Cascarill ʒß

Tinct. Aurantii ʒß

Mr. #

Rp. Tr. Castor.

— Valerianæ aa part.

Mr. Sr. 8 dr. pr dos. mot hän-
diga efterwärkar (Dr Elliot)

TINCTURA CANTHARIDUM. ☿

Rec. *Cantharidum* contritarum drachmam unam cum dimidia, ... p. 3.
Spiritus diluti uncias sedecim. . . . . . p. 256.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA CASCARILLÆ.

Rec. *Cascarillæ corticis* contusi uncias duas, . p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA CASTOREI.

Rec. *Castorei canadensis* pulverati uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA CASTOREI THEBAICA.

Elixir foetidum.

Rec. *Opii levantici* pulverati drachmam unam cum dimidia, ... p. 1.
Salis Cornus Cervi drachmas tres, ... p. 2.
Assæ foetidæ pulveratæ drachmas sex, . . p. 4.
Castorei canadensis pulverati unciam sesquialteram, ... p. 8.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 64.
Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ.

Rec. *Cinchonæ regiæ corticis* contusi uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram unam et dimidiam. p. 9.
Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ AMARA.

Elixir Whyttii.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis,*
Flavedinis Aurantii, singulorum concisorum unciam unam cum dimidia, ... p. 3.
Cinchonæ regiæ corticis contusi uncias quattuor, ... p. 8.
Spiritus diluti libras quattuor. . . . . . . p. 96.
Fit tinctura.

TINCTURA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi unciam, p. 1.
Spiritus diluti uncias decem. . . . . p. 10.
Fit tinctura.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS COMPOSITA.

Tinctura Colocynthidis.

Rec. *Anisi stellati* contusi drachmam, ... p. 1.
Colocynthidis pulpæ minutim incisæ unciam, p. 8.
Spiritus diluti uncias quattuordecim. . . p. 112.
Fit tinctura.

☿ TINCTURA DIGITALIS.

Rec. *Digitalis foliorum* comminutorum unciam sesquialteram, ... p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 8.
Macerando fit tinctura.

Tinct. Ferri pomata

Rp. Extract. ferri pomat. Ʒii
Aqu. Cinnamom. ~~℥~~ Ʒj
Mr.

Tinctura Jodi
Rec. Jodi gr. xxviij
Spir. concentrat. ℥i
Mr.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

loco Tincturæ Guajaci Ph. Suec. Ed. V.

Rec. *Guajaci resinæ* pulveratæ uncias duas, . . p. 1.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ libram. . . . . p. 6.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA.

Rec. *Ætherolei Foeniculi* unciam dimidiam, . . p. 1.
Guajaci resinæ pulveratæ unciam, ... p. 2.
Spiritus concentrati unciam. . . . . p. 2.
Resinæ et Ætheroleo per horas viginti quattuor in vase clauso digestis Spiritus additur, et tinctura colatur.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI. ☿

Rec. *Hellebori nigri radicis* concisæ unciam sesquialteram, ... p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 8.
Fit tinctura.

TINCTURA HYOSCYAMI. ☿

Rec. *Hyoscyami foliorum* siccatorum et comminutorum unciam sesquialteram, ... p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 8.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA LACCÆ MYRRHATA.

Tinctura Laccæ composita.

Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ drachmas tres, . . p. 3.
Laccæ in granulis contritæ unciam, . . . p. 8.
Spiritus Cochleariæ libram unam cum dimidia. . . . . p. 144.
Fit tinctura.

TINCTURA LAVENDULÆ AROMATICA.

Spiritus Lavendulæ compositus.

Rec. *Santali rubri* rasi drachmas tres, ... p. 3.
Cinnamomi ceylanici corticis,
Nucis moschatæ, singulorum contusorum unciam dimidiam, ... p. 4.
Spiritus Rosmarini libram, ... p. 96.
Spiritus Lavendulæ libras tres. . . . . . p. 288.
Fit tinctura.

Paratur etiam sine *Santalo rubro*.

TINCTURA LUPULI.

Rec. *Lupuli strobilorum* uncias duas et dimidiam, p. 5.
Spiritus diluti uncias sedecim. . . . . . . p. 32.
Fit tinctura.

TINCTURA MYRRHÆ.

Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ uncias duas, . . . p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

☿ TINCTURA OPII.

Tinctura thebaica vel sedativa vel hypnotica.

Rec. *Opii levantici* pulverati unciam, ... p. 1.
Aquæ Cinnamomi uncias quattuor, ... p. 4.
Spiritus diluti uncias sex. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

Rx. Tinct. Pyrethri ʒj
— Opii ʒij
Camphor. gr xviij
odontalgia

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

Elixir paregoricum.

Rec. *Ætherolei Anisi* grana quindecim, ... p. 3.
Camphoræ depuratæ scrupulum, ... p. 4.
Acidi benzoici,
Opii levantici pulverati, singulorum drachmam dimidiam, ... p. 6.
Spiritus diluti uncias sedecim. . . . . p. 1536.
Fit tinctura.

TINCTURA PIMPINELLÆ.

Rec. *Pimpinellæ radicis* concisæ uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

TINCTURA RATANHIÆ.

Rec. *Ratanhiæ corticis radicis* contusi unciam sesquialteram, ... p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 8.
Fit tinctura.

TINCTURA RHEI AMARA.

Elixir Rhei amarum spirituosum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, ... p. 1.
Gentianæ rubræ radicis drachmas duas, p. 2.
Rhei indici radicis unciam. . . . . p. 8.
E contusis et concisis fit tinctura cum
Spiritus diluti libra. . . . . p. 96.

TINCTURA SCILLITICA.

Tinctura Scillæ.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi unciam dimidiam, ... p. 1.
Scillæ radicis, siccatæ et minutim incisæ, uncias duas, ... p. 4.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 24.
Fit tinctura.

TINCTURA SENNÆ AROMATICA.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum drachmam dimidiam, ... p. 1.
Carvi seminum contusorum drachmam unam et dimidiam, ... p. 3.
Sennæ alexandrinæ unciam unam et dimidiam, ... p. 24.
Passularum majorum, demptis acinis, uncias duas, ... p. 32.
Spiritus diluti uncias sedecim. . . . . p. 256.
Fit tinctura.

TINCTURA STRAMONII.

Rec. *Stramonii seminum* contusorum unciam sesquialteram, ... p. 1.
Spiritus diluti libram. . . . . p. 8.
Fit tinctura.

TINCTURA SUCCINI.

Rec. *Succini flavi*, in pulverem tenerrimum triti, unciam, ... p. 1.
Ætheris spirituosi uncias quattuor. . . . . p. 4.
Fit tinctura, macerando ad temperaturam circiter +30° C. per octo dies.

Tinct. Scillæ composita

Rx. Tinct Scillæ

— Opii

Æther. Nitric spirit. aa partes

Mx Ls 60 dr. p. d.

TINCTURA SUCCINI AROMATICA.

Balsamum Vitæ vel nervinum.
Tinctura balsamica.

Rec. *Ætherolei Caryophyllorum,*
Olei Cassiæ,
Olei Lavendulæ,
Olei Macidis, singulorum scrupulum, . . p. 1.
Tincturæ Succini uncias quattuor. . . . . p. 96.
Solvuntur.

TINCTURA TOLU.

Tinctura Tolutana.

Rec. *Balsami tolutani* unciam unam et dimidiam, p. 1.
Spiritus concentrati libram. . . . . p. 8.
Fit tinctura digerendo, donec solutum sit Balsamum.

TINCTURA VALERIANÆ.

Rec. *Valerianæ minoris radicis,* recens pulveratæ, uncias duas, ... p. 1.
Spiritus concentrati libram. . . . . p. 6.
Fit tinctura, quæ concutiendo cum
Ætheris spirituosi unciis quattuor . . . . . p. 2.
miscetur.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

Rec. *Valerianæ minoris radicis,* recens pulveratæ, uncias duas, ... p. 1.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ libram. . . . . p. 6.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA VANILLÆ.

Rec. *Vanillæ siliquarum*, minutim concisarum, unciam, ... p. 1.
Spiritus concentrati uncias sex. . . . . p. 6.
Fit tinctura.

TROCHISCI BICARBONATIS NATRICI.

Tabulæ d'Arcet vel de Vichy.

Rec. *Bicarbonatis natrici* unciam, ... p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias novem, . . . p. 9.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ destillatæ* fervidæ octuplo pondere in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Bicarbonas et Saccharum, simul contrita, cum mucilagine in massam justæ spissitudinis coguntur, ex qua fiunt trochisci numero quadringenti octoginta æquales.

TROCHISCI IPECACUANHÆ.

Rec. *Ipecacuanhæ radicis* pulveratæ grana sex, p. 1.
Sacchari albi pulverati unciam, ... p. 80.
Tragacanthæ electæ, in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Coguntur in massam, in trochiscos sexaginta æquales dividendam.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ.

Rec. *Extracti Liquiritiæ*,
Gummi arabici pulverati, singulorum unciam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias quattuor. . . p. 4.

Cum *Aquæ destillatæ* guttulis fit massa æquabilis, ex qua formantur trochisci numero ducenti octoginta octo æquales, pulvere *Liquiritiæ radicis* conspergendi.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ THEBAICI.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ thebaïcorum.

Rec. *Opii levantici* grana triginta duo, ... p. 8.
Tincturæ Tolu drachmam, ... p. 15.
Extracti Liquiritiæ,
Gummi arabici pulverati, singulorum unciam, p. 120.
Sacchari albi pulverati uncias duas. . . p. 240.

Opio cum Tinctura contrito adduntur cetera, quo facto, in massam coguntur, quæ in trochiscos centum nonaginta duos æquales dividenda est.

TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Ætherolei Menthæ piperitidis* drachmam dimidiam, ... p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias octo, . . p. 128.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ Menthæ piperitidis* in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Fit, Ætheroleum sub finem addendo, massa justa, in trochiscos trecentos octoginta quattuor dividenda.

VINA.

Vina, quæ dicuntur, medicata parantur digerendo vel macerando in vase clauso per quatriduum et colando cum expressione.

In cella servantur, in lagenis clausis.

VINUM CINCHONÆ AMARUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis*,
Flavedinis Aurantii, singulorum concisorum drachmas tres, ... p. 3.
Cinchonæ regiæ corticis, minutim contusi, unciam, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, ... p. 80.
Spiritus Vini gallici uncias duas. . . . . p. 16.

Fit ex præscripto, jam dato, vinum.

VINUM COLCHICI.

Rec. *Colchici seminum* contusorum uncias duas, p. 1.
Vini de Xeres uncias decem. . . . . p. 5.
Per dies quattuor macerata colantur.

VINUM FERRATUM.

Vinum chalybeatum.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* pulverati drachmas tres, ... p. 3.
Ferri Limaturæ unciam, ... p. 8.
Vini rhenani libram. . . . . p. 96.
Digeruntur per quatriduum; postea defunditur vinum.

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Vinum Gentianæ.

Rec. *Piperis albi* drachmam dimidiam, ... p. 1.
Flavedinis Aurantii drachmas sex, . . . p. 12.
Gentianæ rubræ radicis unciam. . . . . . p. 16.
Ex contusis et concisis fit vinum, digerendo cum
Vini de Malaga unciis decem . . . . . p. 160.
et *Spiritus Vini gallici* unciis duabus. . . . p. 32.

VINUM IPECACUANHÆ.

Rec. *Ipecacuanhæ radicis* contusæ unciam unam et semis, ... p. 1.
Vini de Malaga libram. . . . . p. 8.
Fit vinum.

VINUM

VINUM LIQUIRITIÆ THEBAICUM.

Vinum Glycyrrhizæ thebaicum.
Elixir Papaveris.

Rec. *Opii levantici* pulverati,
Croci orientalis,
Extracti Liquiritiæ, singulorum drachmas duas, p. 1.
Vini de Malaga libram. . . . . p. 48.
Per quatriduum digesta colantur.

VINUM OPII. ☿

Rec. *Opii depurati* unciam, ... p. 1.
Vini gallici albi uncias sex. . . . . p. 6.
Macerantur per quatriduum; dein colatur vinum.

VINUM OPII CROCATUM. ☿

Laudanum liquidum Sydenhami.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis*,
Caryophyllorum, singulorum contusorum drachmam, ... p. 1.
Croci orientalis unciam, ... p. 8.
Opii levantici pulverati uncias duas, . . . p. 16.
Vini de Malaga libram. . . . . p. 96.
Digestione per quatriduum factâ, fit, humectando residuum cum Vino et exprimendo, colatura libræ unius. . . . . p. 96.

VINUM RHEI AMARUM.

Elixir Rhei amarum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, ... p. 1.
Gentianæ rubræ radicis drachmas duas, . p. 2.
Rhei indici radicis unciam. . . . . p. 8.

Contusa et incisa per quatriduum digeruntur cum
Vini de Malaga unciis decem, ... p. 80.
Spiritus Vini gallici unciis duabus, . . . p. 16.
et dein colatur vinum.

VINUM RHEI AROMATICUM.
Elixir Rhei compositum.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum unciam dimidiam, ... p. 8.
Rhei indici radicis incisæ unciam unam et semis, ... p. 24.
Passularum majorum, acinis exemptis, uncias tres, ... p. 48.
Spiritus Vini gallici uncias tres, ... p. 48.
Vini de Malaga uncias quindecim. . . . p. 240.

Post digestionem per quatriduum fit colatura, cui adduntur
Macidis pulveratæ drachma dimidia, . . . p. 1.
Bicarbonatis kalici drachma, ... p. 2.
Extracti Enulæ uncia dimidia, ... p. 8.
Sacchari albi unciæ quattuor. . . . . . . p. 64.

VINUM RHEI DULCE.
Elixir Rhei dulce.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum drachmas duas, ... p. 1.
Rhei indici radicis incisæ uncias duas, . . p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, ... p. 40.
Spiritus Vini gallici uncias duas. . . . . p. 8.

Fit vinum.

Vinum Sambuci

Rx. Cort. interior. Sambuci concis. ℥ij

Vin. Gallic. alb. lbj

digere per nychthemeron the cola.

Unguentum Autenriethianum

Rx. Tartrat. Stibiq. Kaliq. ʒj

Axungiæ curat ʒj

M. f. Ungt.

VINUM SCILLITICUM.

Vinum Scillæ.

Rec. *Zingiberis radicis* contusæ drachmam dimidiam, ... p. 1.
Scillæ radicis, siccatæ et concisæ, unciam dimidiam, ... p. 8.
Vini gallici albi libram. . . . . p. 192.
Fit vinum.

VINUM SENNÆ COMPOSITUM.

Vinum Sennæ. Elixir Sennæ.

Rec. *Coriandri seminum*,
Foeniculi seminum, singulorum contusorum drachmas duas, ... p. 1.
Sennæ alexandrinæ comminutæ uncias quattuor, ... p. 16.
Vini de Malaga libras duas cum dimidia. p. 120.
Digeruntur per triduum; tum adduntur
Passularum majorum, acinis exemptis, unciæ tres. . . . . p. 12.
Digeruntur iterum per diem et exprimendo colantur.

VINUM STIBIATUM. ☿

loco Vini antimoniati.

Rec. *Tartratis stibico-kalici* grana duodecim, . p. 1.
Vini de Malaga tepefacti uncias sex. . p. 240.
Fit solutio.

UNGUENTA.

Parantur unguenta vario modo, ut exhibeat formula uniuscujusque; ubi tamen semper caven-

dum, ne calor inter liquefaciendum +100° C. umquam superet.

Servantur in vasis porcellaneis vel figulinis vitreatis, loco non admodum calido.

UNGUENTUM CALAMINÆ COMPOSITUM.

Unguentum exsiccans Acrelii.

Rec. *Solutionis Camphoræ oleosæ* unciam unam et semis, ... p. 3.
Sacchari Saturni pulverati;
Minii, singulorum uncias tres, ... p. 6.
Cerussæ albæ pulveratæ;
Lithargyrii præparati;
Calaminæ præparatæ, singulorum uncias sex, p. 12.
Olei Lini uncias sex et semis, ... p. 13.
Sevi hircini curati libram. . . . . p. 24.

Calamina et Plumbi præparata, inter se bene mixta, cum Sevo, supra ignem liquefacto, et Oleo intime commiscentur; paullum refrigeratis, Solutio Camphoræ oleosa addenda est.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

Unguentum Cantharidis colatum Ph. Suec. Ed. V.

Rec. *Cantharidum* pulveratarum uncias tres, . . p. 1.
Unguenti Terebinthinæ resinosi libram. . . p. 4.

Digeruntur in vase clauso per triduum eo caloris gradu, ut unguentum semper liquatum sit; deinde per linteum colantur.

<u>Unguent. ad Combustiones</u>

Rp. Cera flava ℥j ß ×
Ol. Olivar. ℥vij ß ×
Vitell. ovor. № vj
M. f. Ungu.

<u>Ungv. contra Scabiem</u>

Rp. Sulphur. sublimat. ʒj ℥iij
Sapon. Viridis (crossed out: affiricht ℥ij)
Axungiæ āā ℥j ℥ij
Picis liquid ℥ß ℥iij
M. f. Ungv.

<u>Ungv. Scabiei (Malmsten)</u>

Rp. Cretæ ℥j
Sulph. sublim ℥j ß ×
Sapon.
Axungiæ āā ℥iiß
M. f. Ungv. Sr Skabbsalfva att, efter att ha tagit ett varmt bad, under 3–4 dagars tid ingnida kring hand- och fotleder. Huden bör betäckas med ylle o pat hållas vid sängen.

#

Rp. Kali Caustici ʒj
Solv. in Aqu. destill. ℔j
Sr Att pålägga här blöta lappar på sinnandära skabb pustler.

Unguent Phos Phos. Novae;
Rec. Phos Phori pulv. ʒj
Axung. cur. liquef. ʒvj
Camfora dep. pulv. ʒvj
Dig. in lag. vitri sub. claus. et
interdum agitand per dies XIV.

Digeruntur in balneo arenæ ad solutionem, quæ, etiamnunc calidissima, bene miscetur cum

Axungiæ curatæ, liquefactæ et in densitatem denuo coëuntis, libra, ... p. 12.

ut fiat unguentum, quod in capsulas transfunditur.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRICI.

Rec. *Butyri recentis*, non saliti, unciam. . . . p. 8.

Huic, leni igne liquefacto, additur

Oxidi hydrargyrici præcipitati drachma. . p. 1.

In mortario vitreo exactissime commiscentur, donec refrixerint.

Non, nisi requisitum, paratur nec datur, nisi in vase opaco.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

Rec. *Secalis farinæ* uncias duas; . . . . p. 2.

coquitur cum

Aceti communis unciis quattuor, ... p. 4.

ut fiat puls, cui additur

Resinæ flavæ,

Picis liquidæ, singulorum uncia. . . . . . p. 1.

In balneo vaporis coquuntur, miscendo et agitando cum spathula, usque ad justam spissitudinem.

UNGUENTUM ROSACEUM.

Rec. *Axungiæ curatæ* unciam, ... p. 8.

Continue instillando

Aquæ Rosæ drachmam, ... p. 1.

subigitur pistillo ligneo, donec Axungia niveam habeat albedinem.

UNGUENTUM SUBACETATIS PLUMBICI.

Unguentum Saturni.

Rec. *Ceræ albæ* uncias quattuor. . . . . p. 4.
Liquefactis adduntur
Solutionis Subacetatis plumbici unciæ quattuor p. 4.
Olei Olivarum communis unciæ novem. . . p. 9.
Ab igne remota subiguntur bacillo ligneo, donec omnium unitas fiat.

UNGUENTUM TEREBINTHINÆ RESINOSUM.

Unguentum basilicum.

Rec. *Resinæ flavæ*,
Sevi ovilli curati,
Terebinthinæ communis,
Ceræ flavæ, singulorum uncias sex, . . . p. 1
Olei Olivarum communis libras duas. . . p. 4.
Simul liquata et mixta colantur.

Ungv. Superjodeti Kalici

Rc. Jodet. Kalic. 3j
Jodi gr x.
Axungiae 3j
M. f. ung.

Ungv. Basilicum.

Rc. Cerae flav. Lbj
Resin. Elemi 3vj
Ol. Olivar Lbj 3iij
M. f. Ungv.

Ungt. Cetaceum (Prof. Ston)
℞. Sperma Ceti ʒj ß ×
Ceræ alb. ʒj ×
Ol. Olivar. alb. ℥vj
Mx. igne modico ut f. Ungt.

Ungu. Cosmeticum
℞. Sulfuret. Hydrargyri
Sublimat. ℥ij
Cineris gr viij
Resin. dracon. gr xij
Acid. Arsenicos. gr XL
Aqu. destill. qu. s. ut f. Ung.

℞. Ungt. Hydr. c. ʒj
Camphor. Trita
Extr. Conii aa gr xij
Cholasion

UNGUENTUM CEPÆ.

Linimentum Cepæ vel Unguentum suppurans.

Rec. *Resinæ flavæ,*
Ceræ flavæ, singulorum uncias sex; . . . p. 1.
liquefactis adjiciuntur
Saponis viridis unciæ sex. . . . . p. 1.
Cepæ bulbi, sub cineribus assati, decorticati et contusi,
Mellis depurati, singulorum libræ duæ cum dimidia. . . . . p. 5.

Mixta in balneo aquæ coquentis detinentur, donec humor consumptus sit; tum subiguntur bacillo ligneo, ut omnium unitas fiat.

UNGUENTUM CERUSSÆ.

Unguentum e Cerussa Ph. Milit.

Rec. *Cerussæ albæ,* in pulverem tenerrimum tritæ, uncias octo, ... p. 2.
Axungiæ curatæ libram. . . . . p. 3.

Miscentur triturando.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

Rec. *Hellebori albi radicis* pulveratæ unciam, p. 1.
Axungiæ curatæ uncias quattuor, ... p. 4.
Olei de Cedro guttas decem.

Miscentur triturando.

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

Rec. *Sevi hircini curati,*
Axungiæ curatæ, singulorum uncias sex, p. 1.
Hydrargyri destillati libram. . . . . p. 2.

Hydrargyrum cum Sevo et Axungia, quæ, ubi supra ignem liquata jam spissescunt, sensim admiscenda sunt, in mortario lapideo paullum calefacto, diligentissime subigitur, donec oculo armato non cernatur.

UNGUENTUM LAURI TEREBINTHINATUM.

Unguentum nervinum vel Lauri compositum.

Rec. *Olei Succini empyreumatici rectificati* unciam dimidiam, ... p. 1.
Olei Terebinthinæ unciam, ... p. 2.
Sevi ovilli curati uncias octo, ... p. 16.
Olei Lauri libram. . . . . p. 24.

Sevo, liquefacto et ab igne remoto, adjiciuntur cetera, quo facto mixta subiguntur, ut in unum coëant.

UNGUENTUM MEZEREI.

Pomatum episprasticum.

Rec. *Ceræ flavæ* unciam dimidiam, ... p. 8.
Axungiæ curatæ uncias quattuor et semis, p. 72.

Liquefactis et mixtis adjicitur
Extracti Mezerei drachma dimidia, . . . p. 1.
in *Spiritus concentrati* uncia dimidia soluta. p. 8.

In balneo vaporis detinentur, donec Spiritus avolaverit; tum colatur unguentum et servatur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRICI.

Unguentum Hydrargyri compositum vel citrinum.

Rec. *Hydrargyri destillati* unciam, ... p. 1.
Acidi nitrico-nitrosi uncias duas. . . . . p. 2.

Ungvent. du Canges.

Re. Emplastr. Acid. Plumbic.
Picis solid.
Ricin. commun.
Ceræ flavæ āā ℥j
M. l.a ut f. Ungv.

Ungv. Jodeti Hydrargyros.

Re. Jodi gr. x (gr. v)
Ungv. Hydrargyr. ℥ß
M. f. Ungv.

Ungv. Narcotico Balsamicum.

Re. Balsam. Peruvian nigr.
Extract. Conii āā ℥ij
Acetat. Plumbic. ℈ij
Tinct. Opii camphor. ℈j
Ungv. Cepæ ℥ij
M. f. Ungv.

TABULA,

exhibens proportionem medicaminum efficaciorum in quibusdam Pharmacis præparandis.

Acetum Scillæ;
ejus drachma continet quod solubile est e *Scillæ radicis* granis fere quinque.

Acidum hydrocyanicum dilutum;
ejus grana triginta octo continent *Acidi hydrocyanici anhydri* granum, vel grana tria grani fere duodecimam partem (gr. $\frac{1}{12}$).

Ammoniacum causticum;
ejus uncia continet *Ammoniaci anhydri* circiter drachmam.

Amygdalinum;
ex ejus granis septemdecim gignitur cum sufficiente Emulsionis amygdalinæ copia *Acidi hydrocyanici anhydri* granum.

Aqua Amygdalarum amararum concentrata;
ejus uncia continet *Acidi hydrocyanici anhydri* fere granum.

Aqua Supercarbonatis kalici;
ejus unciæ decem continent *Bicarbonatis kalici* grana triginta et unum.

Aqua Supercarbonatis natrici;
ejus unciæ decem continent
Bicarbonatis natrici grana triginta et quattuor.

Cyanetum kalicum;
ejus granum dimidium respondet
Acidi hydrocyanici anhydri grani quintæ parti (gr. $\frac{1}{5}$).

Electuarium Scordii;
ejus scrupuli decem continent
Opii fere granum.

Electuarium Sennæ;
ejus drachmæ duæ continent
Sennæ alexandrinæ fere scrupulum.

Emulsio Assæ foetidæ;
ejus uncia dimidia continet
Assæ foetidæ grana fere quattuordecim.

Emulsio camphorata;
ejus uncia continet
Camphoræ depuratæ fere granum.

Emulsio guajacina;
ejus uncia dimidia continet
Guajaci resinæ grana decem.

Emulsio Gummi ammoniaci;
ejus uncia dimidia continet
Gummi ammoniaci grana fere quattuordecim.

Emulsio hydrocyanica;
ejus uncia continet
Acidi hydrocyanici anhydri grani fere tertiam partem (gr. $\frac{1}{3}$).

Emulsio Myrrhæ ferrata;
ejus uncia dimidia continet
Myrrhæ grana fere quattuor,
Sulphatis ferrosi, in Carbonatem transmutati, granum et ejus tertiam partem (gr. $1\frac{1}{3}$).

Extractum Colocynthidis compositum;
ejus grana septem continent
Extracti Colocynthidis grani tres quartas partes,
Aloës lucidæ grana quattuor,
Scammonii aleppensis grana duo.

Hydrargyrum cum Creta;
ejus grana quattuor continent
Hydrargyri granum et semis.

Julapium e Moscho;
ejus uncia dimidia continet
Moschi fere granum.

Liquor Ammoniaci anisatus;
ejus drachma continet
Ammoniaci caustici grana undecim
vel *Ammoniaci anhydri* granum et ejus tres octavas partes (gr. $1\frac{3}{8}$).

Mixtura arsenicalis Fowleri;
ejus grana decem continent
Arsenici albi, cum Oxido kalico juncti, grani duodecimam partem (gr. $\frac{1}{12}$).

Mixtura mercurialis;
ejus uncia dimidia continet
Chloreti hydrargyrici corrosivi grani quartam partem (gr. $\frac{1}{4}$).

Morsuli stibiati;
eorum unus continet
Sulphureti stibici præparati grana quindecim.

Oxymel Scillæ;
ejus drachma respondet
Scillæ radicis grano fere et duobus ejus trientibus (gr. $1\frac{2}{3}$).

Pilulæ Aloës amaræ;
earum quinque continent
Aloës lucidæ granum et semis.

Pilulæ Aloës crocatæ;
earum quinque continent
Aloës lucidæ grana quattuor.

Pilulæ Chloreti hydrargyrici corrosivi;
earum una continet
Chloreti hydrargyrici corrosivi grani octavam partem (gr. $\frac{1}{8}$).

Pilulæ Colocynthidis compositæ;
earum quinque continent
Extracti Colocynthidis compositi grana quinque et semis,
Chloreti hydrargyrosi grana circiter duo,
Extracti Jalappæ granum unum et semis.

Pilulæ foetidæ succinatæ;
earum quinque continent
Assæ foetidæ grana fere quattuor,
Castorei grana fere quattuor,
Acidi succinici granum et ejus trientem (gr. $1\frac{1}{3}$).

Pilulæ Gummi ammoniaci thebaicæ;
earum quinque continent
Opii granum.

Pilulæ Gummi Guttæ aloëticæ;
earum quattuor continent
Aloës lucidæ grana quinque,
Gummi Guttæ grana duo.

Pilulæ Hydrargyri;
earum duæ continent
Hydrargyri granum.

Pilulæ Myrrhæ ferratæ;
earum quinque continent
Myrrhæ grana decem,
Sulphatis ferrosi, in *Carbonatem* transmutati, grana duo et semis.

Pilulæ Nicotianæ;
earum sex continent
Extracti Nicotianæ grana duo.

Pilulæ Nitratis argentici;
earum una continet
Nitratis argentici grani sextam partem (gr. 1/6).

Pilulæ Styracis thebaicæ;
earum tres continent
Opii granum.

Pilulæ Sulphatis cuprici ammoniacalis;
earum una continet
Sulphatis cuprici ammoniacalis grani sextam partem (gr. 1/6).

Pulvis Aluminis kinosatus;
ejus scrupulus continet
Aluminis crudi grana decem.

Pulvis amarus ferratus;
ejus drachma dimidia continet
Sulphatis ferrosi grana quinque.

Pulvis Chloreti hydrargyrosi thebaicus;
ejus scrupulus dimidius continet
Chloreti hydrargyrosi granum,
Opii granum dimidium.

Pulvis gummosus stibiatus;
ejus scrupulus continet
Kermetis granum dimidium.

Pulvis Jalappæ hydrargyratus;
ejus scrupulus continet
Jalappæ radicis grana quindecim,
Chloreti hydrargyrosi grana quinque.

Pulvis Jalappæ salinus;
ejus scrupulus continet
Jalappæ radicis grana fere quinque.

Pulvis Jalappæ tartaricus;
ejus drachma dimidia continet
Jalappæ radicis grana decem.

Pulvis Ipecacuanhæ thebaicus;
ejus scrupulus dimidius continet
Ipecacuanhæ radicis granum,
Opii granum.

Pulvis Nitri thebaicus;
ejus drachma dimidia continet
Opii granum dimidium.

Pulvis Rhei salinus;
ejus drachma dimidia continet
Rhei indici radicis grana quindecim.

Pulvis Scillæ boraxatus;
ejus drachma continet
Scillæ radicis granum dimidium,
Boracis grana quinque.

Pulvis Scillæ compositus;
ejus scrupulus continet
Scillæ radicis grana duo.

Pulvis Sennæ compositus;
ejus scrupulus continet
Sennæ alexandrinæ grana fere sex,
Scammonii aleppensis grana fere tria.

Solutio Acidi phosphorici;
ejus scrupulus dimidius continet
Acidi phosphorici grana duo & semis.

Solutio Camphoræ spirituoso-ætherea;
ejus grana septem (guttæ 12—20) *) continent
Camphoræ depuratæ granum.

Solutio Carbonatis kalici;
ejus grana quindecim continent
Carbonatis kalici puri grana quinque.

Solutio Fuliginis foetida;
ejus drachma continet
Assæ foetidæ grana sex et duas tertias partes (gr. $6\frac{2}{3}$).

---

*) Numeros guttarum tales apposuimus, quales variis experimentis invenimus, ut satis appareat, quam incertus hic quantitates liquidorum determinandi modus sit.

Solutio Gummi Guttæ alkalina;
ejus grana octodecim (guttæ 18—20) continent
Gummi Guttæ grana duo.

Solutio Superjodeti kalici;
ejus grana viginti quinque continent
Jodi grani tertiam partem (gr. ⅓),
Jodeti kalici duos grani trientes (gr. ⅔).

Syrupus Emetinæ;
ejus drachma continet
Emetinæ grani octavam partem (gr. ⅛).

Syrupus Hydrargyri;
ejus scrupulus continet
Hydrargyri granum fere dimidium.

Syrupus thebaicus;
ejus uncia continet
Tincturæ Opii grana quinque.

Theriaca;
ejus scrupuli quinque continent
Opii granum.

Tinctura Aloës composita;
ejus drachma dimidia (guttæ 80—110) continet
Aloës lucidæ grana fere duo.

Tinctura Aloës crocata;
ejus drachma dimidia (guttæ 80—110) continet
Aloës lucidæ granum fere unum et ejus quadrantem (gr. 1¼).

Tinctura Assæ foetidæ;
ejus drachma dimidia continet
Extractum spirituosum ex *Assæ foetidæ* granis quinque et semis.

Tinctura Cantharidum;
ejus grana quinque (guttæ 10—15) respondent
Cantharidum grani decimæ sextæ parti (gr. $\frac{1}{16}$).

Tinctura Castorei;
ejus drachma dimidia continet
Castorei grana fere quinque.

Tinctura Castorei thebaica;
ejus drachma dimidia (guttæ 50—60) continet
Opii fere granum dimidium.

Tinctura Colocynthidis composita;
ejus scrupulus dimidius (guttæ 20—25) respondet
Colocynthidis pulpæ grani duabus tertiis partibus (gr. $\frac{2}{3}$).

Tinctura Digitalis;
ejus grana quattuor (guttæ 8—12) continent
Solubile e *Digitalis foliorum* grano dimidio.

Tinctura Guajaci ammoniata;
ejus drachma (guttæ 80—100) continet
Guajaci resinæ grana fere novem.

Tinctura Guajaci foeniculata;
ejus scrupulus (guttæ 40—50) continet
Guajaci resinæ grana octo.

Tinctura Hellebori nigri;
ejus grana octo respondent
Hellebori nigri radicis grano.

Tinctura Hyoscyami;
ejus grana octo (guttæ 16—24) respondent
Hyoscyami foliorum grano.

Tinctura Lupuli;
ejus drachma dimidia (guttæ 50—80) continet
Extractum spirituosum e *Lupuli strobilorum* granis
fere quinque.

Tinctura Opii;
ejus grana decem (guttæ 15—20) respondent
Opii fere grano.

Tinctura Opii camphorata;
ejus scrupuli duo (guttæ 60—80) continent
Opii grani fere sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).

Tinctura scillitica;
ejus scrupulus (guttæ 40—50) continet
Solubile e *Scillæ radicis* granis tribus.

Tinctura Sennæ aromatica;
ejus drachmæ duæ respondent
Sennæ alexandrinæ granis decem.

Tinctura Stramonii;
ejus grana octo respondent
Stramonii seminum grano.

Tinctura Valerianæ;
ejus scrupulus (guttæ 40—50) respondet
Valerianæ radicis granis duobus et dimidio.

Tinctura Valerianæ ammoniata;
ejus drachma dimidia respondet
Valerianæ radicis granis fere quinque.

Trochisci Bicarbonatis natrici;
eorum unus continet
Bicarbonatis natrici granum.

Trochisci Ipecacuanhæ;
eorum unus continet
Ipecacuanhæ radicis grani decimam partem (gr. $\frac{1}{10}$).

Trochisci Liquiritiæ thebaici;
eorum unus continet
Opii grani sextam partem (gr. $\frac{1}{6}$).

Vinum Colchici;
ejus scrupulus continet
Extractum vinosum e *Colchici Seminum* granis quattuor.

Vinum Ipecacuanhæ;
ejus scrupuli duo respondent
Ipecacuanhæ radicis granis quinque.

Vinum Liquiritiæ thebaicum;
ejus grana quinquaginta (guttæ 40—60) continent
Opii fere granum.

Vinum Opii;
ejus grana septem (guttæ 10—15) continent
Opii depurati granum.

Vinum Opii crocatum;
ejus grana sex (guttæ 8—10) continent
Solubile ex *Opii* grano.

Vinum Rhei amarum;
ejus drachmæ duæ respondent
Extracto vinoso e *Rhei radicis* granis decem.

Vinum Rhei aromaticum;
ejus drachmæ duæ respondent
Extracto vinoso e *Rhei radicis* granis circiter decem.

Vinum Rhei dulce;
ejus drachmæ duæ respondent
Extracto vinoso e *Rhei radicis* scrupulo.

Vinum scilliticum;
ejus drachmae duæ continent
Solubile e *Scillæ radicis* granis quinque.

Vinum Sennæ compositum;
ejus drachmæ duæ continent
Extractum vinosum e *Sennæ alexandrinæ* granis sedecim.

Vinum stibiatum;
ejus drachmæ duæ continent
Tartratis stibico-kalici granum dimidium.

NOMINA ANTIQUATA et SYNONYMA.

Pag.

Corrigenda.

Pag. 7 lineâ 11 loco arboris lege ligni arboris
— 10 — 4 loco *Fibrillœ* lege *Fibrillæ*
— 16 — 19 loco ICHTYOCOLLA lege ICHTHYOCOLLA
— 22 — 5 loco ICHTYOCOLLA lege ICHTHYOCOLLA
— 23 — 15 loco frustulis lege frustula
— 27 — 13 loco *Macis* lege *Macidis*
— 28 — 6 loco MACIS lege MACIDIS
— 35 — 28 loco *Spermoëdia* lege *Spermoedia*
— 35 — 30 loco colligendis lege colligenda
— 36 — 9 loco præpondeat lege præponderet
— 44 — 7 loco *destillatœ* lege *destillatæ*
— 44 — 16 post verba: E *Strychnina* pulverata adde, additâ Aquâ destillatâ,
— 48 — 7 loco diminuuntur lege deminuuntur
— 50 — 16 loco 1.55 lege 1.51
— 60 — 24 loco *Amydalarum* lege *Amygdalarum*
— 67 — 5 loco *fontanœ* lege *fontanæ*
— 70 — 15 loco (verktum) lege (1 werktum)
— 72 — 10 loco kalicus purus lege kalicum purum
— 73 — 21 loco *Alkannœ* lege *Alcannæ*
— 80 — 22 loco immissis lege immissæ
— 80 — 27 loco teruntur lege teritur
— 80 — 30 loco servandæ lege servanda
— 86 — 2 loco *Residui* lege *Residuum*
— 87 — 15 loco tenerem lege tenerum
— 100 — 5 loco *destillatœ* lege *fluvialis*
— 111 — 24 loco *Hydragyri* lege *Hydrargyri*
— 131 — 15 loco caute defundendum lege colatione separandum
— 134 — 27 loco der lege per
— 143 — 2 loco rufi lege Rufi
— 143 — 12 loco hydragyrici lege hydrargyrici
— 149 — 9 loco fribrarum lege fibrarum
— 156 — 2 loco *lignei* lege *vegetabilis*
— 156 — 22 loco Doweri lege Doveri
— 169 — 24 loco *Gentianœ* lege *Gentianæ rubræ*
— 177 — 4 loco *e Cypro* lege *de Cypro*
— 180 — 12 loco Sodâ depuratâ lege Soda depurata
— 201 — 12 loco dimidam lege dimidiām
— 224 — 4 loco *Tincturœ* lege *Tinctura*
— 224 — 6 loco duabus lege duobus
— 225 — 5 loco quiquaginta lege quinquaginta

Rx. Juniperi Baccæ contus ℥ss
ad colatur ℥viij
adde
Tartar Boraxati ℥ss
Syrup Juniperi ℥j
āā Oxymell. Scillæ
Extr. Taraxaci
Æther. Spir. Nitr.
Fr. 1m. 2t.

Rec. Lactat ferros gr ij-iv
Lactucar. Angl. gr ij-iij
Rhei gr iij
M. f. pulv. Sr. 3 p. dd. Chloros men-
zerwas hjertklappning och hastig pu-

#

Rec. Lactucar angl. gr ij
Mag. Bismuth. gr iv
Elaeosacchar. Carvi gr viij
Sr 4 p. dd: Cardialgi

#

Rec. Lactucar gr β-j
Oxid. Zinc. gr j-iv
Sacchar. gr X.
Sr. 4 p. dd. Kikhosta Stad. Spas

#

Rec. Asae foetid ℥j
Castor.
Lactucar. angl. aa ℨβ
M. f. c. Balsam. Peruvian. q. s.
Pil. Nr. LX. Sr 4-6. p. 3-4 dd. (Hyst

#

Rec. Lactucar. angl. gr iij
Fol. Digital. pulv. gr ½.
Sacch. gr X.
Sr. 1. p. 2 t. i Hydrops Pericardii

#

Rec. Lactucar. angl. gr viij-xvj
Syrup. Althea ℥ij
Aqu. Am. Amar. conc. ℨj
Sr 1 th. 4-6 dd. Kikhosta Stad. ...

